



GIFT OF BERN DIBNER

#### The Dibner Library of the History of Science and Technology


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES











## IOACHIMI IVNGII

LVBECENSIS

MED. DOCT. ET GYMNASII HAMBURG. QVONDAM PROF.
PVBL. ATQVERECTORIS

# OPVSCVLA BOTANICO-PHYSICA

RECENSIONE ET DISTINCTIONE

MARTINI FOGELII

MED. D. IN GYMNAS, HAMB. P. P.

ET

IOH. VAGETII

LOG. ET METHAPH. P.P. IBID.

CVM EORVNDEM ANNOTATIONIBVS

ACCEDIT

IOSEPHI DE AROMATARIIS, ASSISINAT. FAVORINI FIL.

BARTHOLOMEVM NANTI EPISTOLA

DE

GENERATIONE PLANTARVM EX SEMINIBVS
OMNIA COLLECTA, RECOGNITA ET REVISA NOVISQUE
ANNOTATIVNOVLIS ILLUSTRATA

CVRA

IOH. SEBAST. ALBRECHT, M.D.

GYMNAS. CASIMIR. ACAD. QVOD COBVRGI FLORET PHILONAT. P.P.O. PHYSIC. DVCAL. PROVINC. ACAD. IMPER.
N. C. COLLEGAE.

CODVDCI

COBVRGI SVMTIBVS ET TYPIS GEORGII OTTONIS TYPOGR. DVCAL. PRIV. 1747.



REVERENDISSIMO,

PERILLVSTRI AC

DOCTISSIMO DOMINO,

# DOMINO STEPHANO,

SACRI ET EXEMPTI CISTERTIENS. ORDIN. ET MO-NASTERII B. V. M. DE LANGHEIM

ABBATI DIGNISSIMO SACR. CÆSAR.
MAI. SACELLANO INTIMO,


DOMINO MEO GRATIOSISSIMO.

and partners (NISA US

# REVERENDISSIME AC PERILLVSTRIS DO-MINE ABBAS

DOMINE GRATIOSISSIME!

SWORT-ELABERTH



buscunque curis auctiores, in tyronum usus recusas, sacras esse jubeo. Idem fecit ex Antecessoribus in muneribus meis, Vir quondam doctissimus GEORGIVS BERGNERVS Phil. & Med. Doctor, Gymnas. Casimir. eo tempore P. P. O. & Civitatis Coburg. Phys. Ordin. ubi sua de Peste aliisque morbis contagiosis, olim populariter hinc inde grassantibus confilia, anno superioris seculiquadragesimo primo, patrio i.e. Germanico stilo, Coburgi typis Ioh. Eyrich impressa Re.

Reverendissimo ac doctissimo olim Abbati Langheimensi DOMINO IO-HANNI dedicavit. Fuit enim Coburgenfium medicorum a longo jam tempore ea, raro interrupta, felicitas, ut reverendissimi domini abbates LANGHEIMENSES & propriæ personæ & R.R.D. D. P. P. in Monasterio illo Conventus sanitatem tam tuendam quam restituendam illis gratiose concredere nulli dubitaverint. Devinxit hæc gratia BERGNERVM nostrum, ut grati devotique animi monumen-

tum positum voluerit publice, per plures annos duraturum. Quod ille fecit, idem & a me faciendum animi gratissimi devinctissimique leges exigere mihi visæ sunt. Tvis enim inprimis Consiliis, GRATIOSISSIME DOMINE! quibus eo tempore reverendissimvs in tanta dignitate ANTECESSOR, pius ille DOMINVS ABBAS MARTI-NVS familiariter usus est, factum esse, ut anno hujus feculi xxxII. Perillustris & Reverendissimi illius Domini Abbatis personæ & R.R.D.D.P.P.Conven-

ventus cura fanitatis mihi concrederetur gratiose, gratissimo recordor animo. Quam provinciam officiose in me susceptam, ea qua par erat fide & industria, sub Tvo etiam, sapientisfimo syccessoris dignissimi regimine, cui ulterius benedicat illudque ad plures adhuc annos posteros felicissimum esse jubeat summum Numen, tuitus sum per aliquot annos feliciter. Quanquam vero post hæc & quidem anno xxxIV. Philos. Nat. P. P. in Illustri nostro Gymnas. Casimir.

& deinde anno XXXVII. Phys. Duc. provinc. munerum a Serenissimis eo tempore Principibus nostris, DO-MINO CHRISTIANO ERNE-STO & DOMINO FRANCI-SCO JOSIA Ducibus Sax. & reliqua, Fratribus, Dominis nostris Clementissimis, gratiosissime mihi demantatorum rationes ab ordinaria illa medica cura Monasterii Langheimensis vel invitum avocaverint, quod omnibus his officiis me imparem judicabam: TVA tamen gratia non inter-

termisit, me innumeris, quæ gratissimo pectore recolo, mactare beneficiis largissime. Quæ inter primum illud numero argumentum, quo magna TyA in me immeritum intemerata permanfit fiducia, qua in gravioribus corporis Tvi affectibus, quibus identidem illud fub curarum mole afficiebatur, mea qualiacunque confilia medica ad illos avertendos postulari gratiosissime voluisti, &, quod vehementer gaudeo, non infauste, quia semper adhuc illis Summum Numen benedixit copiose & benignissime.

Præ-

Præter has privatas & domesticas quasi rationes superfunt aliæ adhuc publicæ magis, quæ animum impulerunt, ut TIBI REVERENDISSIME DOMI-NE! hasceplagulas demississime dicatas voluerim. Tv enim non folum a teneris bonas litteras deamasti & admirabiles in illis fecisti progressus, specimina quoque plura limatisfima profundissimæ eruditionis, publici fecisti iuris, ut nunc inter eruditissimos huius seculi Abbates jure meritoque numerari dignus habearis, sed etiam b 2

fummus Musarum Mæcenas, quidquid ad studia litterarum excolenda augendaque pertinet, liberalissime confers adhuc TVIS, & alios eruditos TVA prosequeris gratia largissime.

Videri quidem poterit nonnullis, ejusmodi quid DE PLANTIS indignum esse Viro tanto, publicis Ecclesiæ & privatis Monasterii curis centumque aliis gravissimis negotiis obruto, atque sic me imprudentiæ accusari posse. Sed quia ego optime novi, quanta re-

rum physicarum consideratione & amore tenearis, qua ratione etiam a laboribus gravissimis curisque maximis defagitatus hortorum amœnifsimorum cultura delecteris, ut animus negotiis fessus jucunditate quadam honesta reficiatur, eumque in finem Hesperidum aliorumque exoticorum vegetabilium copiam, sumptibus non contemnendis, comparaveris & in ornatisfimis TVIS hortis ali colique volueris & adhuc velis: Facile a TE veniam audaciæ impetraturum fore b 3

confisus aliorum judicia nihili habenda esse censui.

Spero itaque fore, REVERENDISSI-ME DOMINE ABBAS! ut hoc qualecunque chartaceum munusculum, animi TIBI devinctissimi devotissimique monumentum, ex admiratione TVE eruditionis TVARVMQVE virtutum natum, a beneficiorum per plures annos in me collatorum copia altius enutritum serena & gratiosa fronte, TIBI quasi con-

connata, sis accepturus. Voti sic compos fummum precor Numen, velit illud te ordinis cistertiens. Decvs, ERVDITORVM ORNAMENTVM, MVSARVM MÆCENATEM, MONASTERH CELEBERR. LANGHEIMENSIS PATREM BENIGNISSIMVM INDVLGENTISSIMVM ad feros canosque annos servare falvum, incolumen & in gravissimis, quæ semper agis negotiis, fortem, intrepidum, sapientem, prudentem. His meis precibus si an. nuat Devs, non dubito quin & TVA gratia, quam devotissima mente a TE expeto,

peto, frui ulterius liceat largissime mihi

# PERILLVSTRIS & RE-VERENDISSIMI TVI NOMINIS

# TVARVMQVE EXIMIARVM VIRTVTVM

dabam e Museo a. d. tv.
Non. April. A.S.R.

Cultori devotissimo, Servo obsequentissimo

IOH. SEB. ALBRECHT. D.



### Præfatio.

B. L. S.

um animum induximus, ut Viri quondam do
étissimi, B. IOACHIMI IVNGII, Lubecensis, Med. Doct. & in aliquot Academiis olim
Matthes. nec non in celeberrimo Gymnasio, quod Hamburgi floret, Logices, Physices & Metaphysices Prof. Publ. & ultra viginti annos Rectoris meritissimi, cujus merita in emendanda Philosophia uniuersa
nemo non novit, (a) ISAGOGEN PHYTOSCOPICAM
una cum ejusdem doxoscopiis minoribvs, seu opinionibvs illis, quæ de plantis agunt, (b) denuo

(a) De Vita, meritis & scriptis Autoris nostri conf. I O H. B V R C H. M E N C K E N S Compendieus, gelehrt. Lexicon, edit. 1715. p. 1076. it. allgemeines shistorisches Lexicon, in fol. Lips. 1730. II. Theil p. 1117. porro MART. FOGELII Annotat. general. Ildam ad opiniones physicas, specialioribus præmissam.

(b) Doxoscopias physicas minores ex recensione MARTINI FOGELII cum hujus Annotationibus jam 1662. literis Pfeifferianis Hamburgi in 4to expressas refert IOH. ANT. SEGVI-ERIVS in Bibliothecæ botanic. Part. I. p. 93. Consentit celeberr. MAR-HOFIVS in Polyhist. Part. Il. Libr. Il. c. 2. quæ vero editio mihi nondum ad manus venit. Vsus itaque sum ea, quæ Hamburgi 1679. cura ejusdem FOGELII prodiit, ubi hæ de PLANTIS DOXOSCOPIÆ Partis secundæ sectionem tertiam constituunt opinionum physicarum.

in uno fasciculo ederemus, in usum quidem tyronum, seu ingeniorum ad studia academica præparandorum, non dubitamus quin & Virorum de Plantis optime jammeritorum desideriis (c) faciamus satis. Duæ autem fuere rationes, quæ ad hoc institutum animum impulerunt, opusculorum & Dignitas & Raritas. De illa nemo facile dubitabit, qui, perlustratis hisce paginis, perpenderit, Autorem nostrum aliorum quoque Virorum eruditissimorum judicio acutissimum, vel inter primos esse numerandum, qui nonfolum studii botanici nævos antiquos agnouerunt, sed etiam illis indicatis, observationibus, dubicationibus, meditationibus illud ulterius excolendum putarunt, & fic recentioris ævi fcriptoribus, in hoc studiorum genere celeberrimis ulterius proficiendi materiam suppeditarunt longe uberrimam, unde commodam naturæ vegetabilium copiosius & magis acurate explorandæ, tandemque firmiorum & certiorum ex fructificationis partibus essentialibus, (negle Etis accidentariis omnibus, desumtorum constituendorumque caracterum nacti sunt occasionem, ut tandem ad ambiguitatem omnem tollendam successive orta sit illa systematica methodus, qua plantarum innumeram copiam, in Classes, Ordines, Ge-

(c) Exempli loco sit Excel. quondam Viri, IOH. CHRISTIAN BENE-MANNI, Por. Reg. Pol. Maj. & Elect. Sax. a Consiliis Aulici desiderium, in seinen Gedaucken vom Reiche der Blumen. Dresd. 1740. in 8. p. 63. ubi sicinquit: "Jeh håtte wünschen mögen dasseusge "Jungische Werck zu sehen, wovon Herr "Host. Wolff, der sein Lob nicht zu verschwenden pfleget, in seiner Schrifft wom Gebrauch derer Theile p. 729. §.

nera
"259. ju rühmen weist Daß darinnen
"der scharffinnige Junge nicht alleine
"den Unterschied derer Pflangen, nach
"ihren verschiedenen Theilen bestimmet,
"sondern auch der Unterschied derer
"Blumen in Ordnung gebracht sen, und
"daß, wer solches Werck lese, sinden
"wurde, wie selbst der Unterscheid beson"derer Theise derer Blumen in gewisse
"Classen sich eintheilen lasse.

nera & Species dispositam observamus. Iure itaque & merito celeberr. LINNÆVS JVNGIO nostro primum -locum affignavit inter Institutores botanicos. (d) Et, ut de Methodo ejus nihil dicam, tanti Isagogen suam phytoscopicam ipse IVNGIVS noster fecit, licet ultimis curis non absolutam, ut ei edendæ de sumptibus tabulis supremæ voluntatis testibus prospexerit. (e) Mirati sumus sæpius, qui factum sit, ut in historicis de fatis & incrementis studii botanici scriptis, (f) multo minus vero in Isagogicis 6. Institutionibus nulla fere, vel saltem rarior Jungianis meritis, quæ sane in hac re magna sunt, digna legatur commemoratio. Quin ipse solertissimus & in persectiorem rei botanica emendationem natus LINNÆVS po x o-SCOPIARVM JVNGIANARVM nememinit quidem, licet Vir sit in bibliothecis botanicis versatissimus, atque 18 A-GOGES fecerit justam mentionem. Causam sane aliam suspicari non licet, nisi quod ad oculos tanti Viri illæ non pervenerint, alias enim integerrimum Virum JVNGIVM nostrum, nisi in Critica botanica socium sibi adjunxisse, certe tamen inter Philosophos æque primum locum illi affignaturum fuiffe non dubitamus. (g) Quanquam vero pro illorum temporum ratione CÆSALPINO coævus aut paulo posterior (b) MORISONIO tamen certe prior,

1736. in 8, p. 123.

(f) V. g. in IOS. PIT. TOVR-NEFORTII Isagoge in rem herbariam, Institut. botan. præmissa. In

(d) In Biblioth. botan. Amstelod. PETR. HOTTONS Oratione de rei herbariæ historia & fatis & ADR. ROYEN præfat. ad Floræ Leydensis prodromum.

(g) In Bibliothec. botan. 134. it.

p. 119. (h) CÆSALPINVS namque obiit Romæ 1603. IVNGIVS autem Hamburgi 1657. Quod vero hic Cæsalpi-

<sup>(</sup>e) Sic enim Tit. refert Isagoges: Hamburgi, typis Mich. Pfeifferi, sy M-PIIBVS TESTAMENTI IVNGIA-NI. 1679.

in arduo hoc opere, in quo desudavit Vir magno ingenii acumine præditus, primas hasce lineas non sine omni defectu duxit: attamen plures antecessorum errores & modeste indicavit & multos solide emendavit. Interim ramen non dubito fore plerosque, qui novam hanc opusculis Jungianis denuo edendis adhibitam curam fupervacaneam imo inutilem judicent, hac imprimis ætate, qua res herbaria ad altius fastigium evecta, totque excellentissimorum Virorum curis, observationibus, experimentis meditationibusque magis exculta, scriptis etiam pervulgata, ad virilem quasi ætatem pervenit. Sed hi erunt sere, qui, immemores, multum interesse reipublicæ literariæ, seriem nosse meritorum in quolibet scientiarum genere, & incrementorum ab incunabilis ad adultam usque ætatem progressum, non nisi nova & persectissima esse legenda putabunt. Hi si meminerint, nos multum etiam debere curis virorum, qui ante nostra tempora in emendandis erroribus pervulgatis fuerunt diligentes & industrii, magnæque insuper utilitatis in Scholis esse, studiosam juventutem jucunditate quadam ad evolvenda & legenda antiquiorum, tam Græcorum quam Romanorum Volumina tacite invitari, non admirabuntur, nos illorum sententiam esse sequutos, qui harum rerum æquiores sunt rstimatores.

Vt itaque L.B. habeat in uno fasciculo, quicquid superest meditationum Jungianarum de Plantis, ISAGOGI FHYTOSCOPICÆ, bono ut puto consilio, DOXOSCOPIA-RVM MINORYM, seu OPINIONVM PHYSICARVM illam

num diligenter legerit, testantur hæc de Plantis. opuscula, inprimis vero doxoscopiæ

lam sectionem, quæ Partis secundæ tertia est, subnectendam putavimus. Agit enim illa de Plantarum speciebus tam summis, quam inferioribus, vel, si mavis, Ordinibus, generibus, speciebus, porro de plantarum nominibus, de plantis perperam homonymis & heteronymis, denique de partibus quarundarum plantarum consuse cognitis, tandem de plantarum vita. Vtriusque autem sasciculi ea est affinitas, ut mentem autoris in altero obscuriorem ex altero optime interpretari possit industrius lector,

quod VAGETIVS jam annotavit. (i)

Quæ conditio prima fuerit opusculorum horum posthumorum, qua cura, qua diligentia & a quibus Viris illa successive sint in ordinem redacta, quibus fatis sæpe interruptus sit labor, non est ut repetam, quia harum rerum omnium rationes copiosas & sufficientes dederunt Viri doctiffimi, MARTINVS FOGELIVS & IOH. VA-GETIVS, quorum utrorumque Monita & Annotationes ante legisse juvabit, quam quis ad opusculorum ipsorum lectionem se accingat, vel eum quoque in finem, ut de improbis horum aliorumque virorum laboribus melius judicare & erroribus aut ambiguis nonnullis veniam æquius dare discat. Vtinam contigisset Viro eruditissimo longiori vita frui, ut perficere omnia ipse potuisset, tunc enim ea magis ordinata, recocta, limataque haberemus. Quod vero ad nostras pertinet curas, in Orthographianihil immutavimus temerarii, quia nec FOGELIVM nec VAGETIVM hac in re observavimus audaciores. (k) Cum vero assertionum plures sectiunculæ in uno paragraphro

<sup>(</sup>i) Vid. Ejusd. Monend. XXVI. ad (k) Conf. Monend. XX. p. 49. Ifagogen p. 59.

phro collectæ numerisque tantum margini appolitis notatæ, aliquid obscuritatis sæpius alere viderentur, quæ remorari poterat lectorem in evolvendis notandisque rebus notabilioribus, fingulas easdem separari curavimus, ut sic oculorum primo obtutu facilius reperiri queant. Quas Fogelianas annotationes generaliores Doxoscopiis physicis præfixas, his inspecie de Plantis, aliquid lucis fœnerari posse putavimus, specialioribus ejusdem præmitti voluimus, ne quidquam eorum æque defiderari possit, quæ ad majorem notitiam atque intelligentiam ullo modo facere queunt, Neque in ISAGOGE neque in DOXOSCOPIIS ullibi GEMMARYM factam esse mentionem observantes, quarum tamen cognitio & justa idea indeque formanda differentia tanto magis necessaria videbatur, quanto major est earum usus, huic defectui mederi voluimus brevisfimis ita, ut Cap. IV. ISAGOGES, DE CAVEE, in notula subjunxerimus ea, quæ recentiorum observauit circa GEMMAS industria, (1) ne tyronibus, quorum in gratiam

(1) Nam tantum non omnem gerationis & multiplicationis f. propagationis ejusdem Speciei plantæ rationem unice, vel immediate ex femine, vel mediate per gemmam fieri, immo in ipfis gemmis feminum primordia jam latitare, hodie compertum est. Et quod magis mirari licet, omnem multiplicationem, radicum bulbosarum, ut in Tulipis, squamofarum; ut in Liliis, tuberofarum, ut in Hyacintho Ind. tuber. flagellantium ex geniculis, ut in Fragaria, & reliquarum plantarum, quantum novi omnium, quæ radicibus multiplicantur & propagantur, uniformiter

fieri per gemmas, sub terra sepissime reconditas & a' visu nostro remotas, vel illa docet observatio, qua interdum ejusmodi bulbos, ut alias gemmas, extra terram, altius in foliorum alis natos videmus, vid. Cammere. lit. Nor. phys. techn. med. Ann. 1735. Hebd. XXVII. p. 212. Hebd. XLIX, p. 386. Hebd. Ll. p. 410. porro ibid. Ann. 1741. Hebd. XLIV. p. 347. nec non BENNEMANNS Beschreibung der Tulpe p. 36. Illustr. L. B. de WOLFF. Den der munderbaren Betwohler. Den der mehrung des Gestreydes Cap. II. und deren Erlänterung Cap. I. & II. Recte ita-

hæc recusa voluimus, ut supra jam indicatum est, aliquid deesse videatur eorum, quæ nosse multum interest. Quibus ut in reliquis etiam consulatur eo melius, identidem fub finem vel paginarum vel capitum illos indicavimus ex scriptoribus recentioris ævi, quorum major est autoritas, qui & familiariores apud nos funt, & ex parte non magno parabiles, fic enim habebunt, quos consulere ulterius posfint.

#### Tandem

itaque Celeberr. Ludwig in Institutionibus regni vegetabilis p. 223. S. 548. maximam effe radicum bulbofarum cum gemmis convenientiam affervit. Sæpius mihi nata est in mente dubitatio, annon vexatifimi illius naturæ phænomeni, quod hodie ingenia physicorum torquet, de propagatione & multiplicatione Zoophyrum peti possit. Tabercula enim copiosa in illius corpore conspicua mihi quidem videnturgemmulæ, ex quarum fingulis a corpore licet divisis, singula prodire possunt nova ejusmodi corpora organica ejusdem naturæ, quemadmodum in gemmis vegetabilium idem fieri observamus. Illud ipsum vero corpus organicum Polypi hujus forfan propius in hoc accedit ad Vegetabilium naturam, quam animalium. Id quod aliorum & illorum quidem maxime observationibus relinquo, quibus copia & facultas est observationum hac in re ulterius faciendarum: Ipfæ observationes Trembleyanæ de generatione hujus Polypi, in Memoire pour l'histoire de Polype Mem. Ill. p. m. 153. seqq. certe fuadent, ut credam easdem tu-

berculorum illorum ac gemmarum esse rationes, ut ita non opus habeamus illam ex partibus diuisis prodeuntem generationem aut multiplicationem, animæ cuidam nescio cui, corporis novi formatrici tribuere. Accedit, quod Cirri illi, ab extremitate corporis prodeuntes, magnam habere analogiam observentur, cum fiti Illius, Polypi nempe aquæ dulcis brillis radicum in vegetabilibus aquis Trembleyani ratio, ex idea gemma-, innatantibus. Est perquam disficile, fine sufficiente observationum copia res in limitibus politas ad justos referre terminos. Quemadmodum enim Lithchyta, v.gr. Corallia, multa habent cum regni mineralis corporibus communia, ita forsan ejusmodi Zoophyta inter animalia & vegetabilia ambiguæ funt naturæ, ut perquam difficile sit judicatu, cui ex his regnis potior pars debeat. Motum habere ejusmodi polypos observatum est, unde ad animalia referri queunt, sed si hanc generandi & multiplicandi rationem & in integro corpore & in partibus fingulis divifis confideramus, hac ipfa plantarum naturæ propius accedunr. In eo fane conveniunt utraque, quod habeant corpora organica.

Tandem ob rerum affinitatem Celeberr. & doctiff. quondam Viri IOSEPHI AB AROMATARIIS ad BAR-THOLOMEVM NANTI rariorem EPISTOLAM fubjungi non incongruum fore putavimus, quam DE GENE-RATIONE PLANTARVM EX SEMINIBVS, discursui suo de Rabie contagiosa, magni momenti affectu præfixit, qui primum Venetiis 1625.(m) proximo deinde anno 1626.0b dignitatem materiæ, etiam Francofurti denuo impressus est in forma, quam ob quaternarium plagellarum numerum quartam vocant. Hic enim celeberr. Autor primis merito annumeratur, qui observarunt & docuerunt, maximam inter SEMINA VEGETABILIVM & OVA ANI-MALIVM intercedere analogiam, utraque continere futuri fœtus rudimenta, neutra vero generari aut crescere a principio interno, nisi ante a principio quodam activo (semine virili) fœcunda fuerint reddita; licet, quantum ex thefibus judicare possumus, ante hos centum annos & quod excurrit, obscurior & confusa ex parte adhuc fuerit autoris hac de re idea. Atque hæc fere sunt B. L. de quibus monitum Te voluimus in limine. Vale & his utere nobiscum feliciter, nostrisque studiis fave.

(m) Vid. Ioh. Francisci Segvierii sumus edit. Francosurtense. Biblioth. botan. P. I. p. 3. seq. Nos usi

Scrib. Coburgi ipfis Cal. April. A. S. R. Clo lo CCXLVII.

IOH. SEB. ALBRECHT. D.

IOA-

### IOACHIMI IVNGII

Lubec. Med. D. & in Gymnaf. Hamb. Log. Phyf. & Meraphyf. P. P.

# ISAGOGE PHYTO-SCOPICA

IN COLLEGIIS PRIVATIS AB IPSO TRADI AVDITORIBVS SOLITA

AD EXEMPLARIA, QVAE IPSE AVTOR SVMMA DILIGENTIA DEPREHENDEBATVR REVIDISSE ET MVLTIS LOCIS SVA MANV LOCVPLETASSE ACCVRATE EXPRESSA

recensente

#### IOHANNE VAGETIO

Log. & Metaph. P. P.

Ioan. Ruell. praefat. in Comment. Valer. Cordi, fine.

Certent alii adiicere, quod huic deesse iudicauerint, id erit multo laudabilius, quam si bene meritum de communi hominum vita obtrectationibus impugnent.

### Matth. VI, 28. 29.

Καταμάθετε τα Κείνα τε άγρε, | Cognoscite Lilia agri, quomodo พิเม ลับรู้ส่งผ. Ou นอพเลี, ห่อ๊ะ หก่ยผ. crescant. Non laborant, neque nent. Λέγω δὲ τμῖι, ὅτι ἐδὲ Σολομών ἐν Dico tamen vobis, quod nec Saloπάση τη δόξη ἀυτέ περιεβάλετο mon in omni gloria sua amictus fue-ÓS ÊN TÉTON.

rit, vt vnum horum.

Solet commendatio libellis quaeri ab eruditorum encomiis, & apti ordinis laude. Encomiis omnibus huic opusculo maius est iudicium Clarissimi Viri Domini Guerneri Releuinckii, Med. D. & in celebratissima Salana P. P. suis meritis ita noti, vt quantumuis amplos titulos illa iampridem superarint. Is enim tractatam Isagoga hac materiam ita dignam iudicauit consideratione, ita tenebris indignam, vt plerorumque hic indagatorum summam Libri sui de Vegetabilibus Ildi anno 1670. editi (\*) Sectioni I Vtae putarit inser-ndam. (\*\*)

		_	( )
Proderit con	tulisse cum	Cap. X, 5,	VIII, 161. 32.
Iungii Isagoges R	olf. Veget. II, S. IV.	XI,1-4.	VI, 157. 28 - 33.
Cap. II, §. 2.	Cap. IV, lin. 1.	5-12.	34 - fin.
9.	VI, 155. 4.	&	158. 1 - 12.
III, 2.3.13.19.20	. VIII, 161. 1 - 18.	XII, 1 - 7.	VI, 158.13 - 18.
IV,1.3-6.	VI, 156. 1 - 11.	9. 10. 12 = 14.	19 - 23.
V, 3 - 6.	14-20.	15. 16.	26 - 28.
8.9.	21-23.	XIII, 7. 8.	VIII, 162. fine,
IQ. 12.	157, 1.2.	XIV, 2.5	XI, fine &
VI, 10. VI, 1-7.	156.24 - fin.		IX, 164. 20. 17.
VII, 1-4.	157.3-6.	XV,1-3	X, 165. 26. 27.
8	6-8		28-32,
19.	8.9.	XVIII, 1. 3. 7 - 9.	165.33.166.4.
VIII, 2-4.	10 - 16.	XIX, 1. 3. 4.8.7	X, 166. 5 - 10.
8.	16-17.		21,100.3 - 10,
9. 11.	17 - 22.		11-19.
IX,1-7.	23 - 27.		20 - fin,

Et loco quidem Vegetabilium vltimo exempla etiam adduntur, in Isagoge non comparentia; multis locis apte contrahuntur, quae in Isagoge sunt explicatiora, caput inprimis XXI; alicubi tamen sensus exigua est discrepantia, facta subdivisione, vbi in Isagoge erat condivisio. Pertinet vero adhanc contemplationem Sect. V. c. V. Haec pro encomiis valebunt.

Ordo capitum hic est:

ordo capit	citti ilio cit.
	Cap. VIII. Differentiae Caulis a foliis,
II. Plantae Partitio.	IX a germinatione.
III. De Folio simplici & composito.	X Plantae a duratione.
IV. Caulis distinctio.	XI Caulis a ramis &
V. Planta Mutila & Perfecta, di-	petiolis.
stinctae & confusae germi-	XII per se spectati.
nationis.	XIII. Floris definitio & diffinctio.
VI. Panta multiplex f. plurium	XIV: De Perianthio.
fundorum.	XV. Floris partes generatim.
VII. Planta Multicaulis.	XVI. Flos fimplex Vniformis.
•	

(\*) Ienae in 4to, 1. Alph. 7 und ein halber Bogen.

<sup>(\*\*)</sup> Ex recentioribus vnum Clarist Wolffum adducere licebit, qui iudicium exactissimum nostri Iungii admiratur in hoc opere praestitum. v. Ejus verninsstige Gedanken vom Gebrauch der Theile im Psianzen. cap. VII. §. 258.

Cap. XVII Difformis.  XVIII. Flos compositus secundum quid.  XIX absolute 1. Discus.  XXI absolute 1. Discus.  XXIV. Floris fitus respectu Caulis.  XXV 2. Capitulum.  3. Spica.  XXVI. Fructus definitio & diuisio.  XXVII. partitio.  XXVIII. Platarum foecunditas.	
Ordinis autem rationem seu capitum cohaerentiae exhibet haec tabella.	
agit Cap.	
De PLANTAE Partibus Effentialibus	
Integrantibus II.	
Foliis	
Caule IV.	
Speciebus secundum Partes V.	
Numerum Fundorum VI.	
Caulum VII.	
Caulum VII.  Locum foliorum generatim VIII.  fpeciatim in caule IX.  Durationem partium X.  Figuram caulis ratione partium XI.	
speciatim in caule IX.	
Durationem partium X.	
fui, fiue perimetri XII.	
Effectis, Flore, in genere XIII.	
Floris Perianthio XIV.	
Partibus generation XV.	
Speciatim, floris simplicis vniformis XVI.	
difformis XVII.	
Compositi sec. quid XVIII.	
Flosculis, compositiabsolute.	
i.Difci XIX.	
I. Disci XIX. 2. Capituli, 3. Spicae XX.	
3. Spicae XX.	
Compositi per accidens seu	
Multipice XXI.	
Situ respectu Caulis XXIII.	
Fructus XXV.	
Fructus Natura & Speciebus generatim XXVI.	
Partibus XXVII.	
Producendi facultate sc. foecunditate XXVIII.	
roducendi facultate ic. foecunquate AA viii.	

Nihil praeloquii amplius. Vale Benev. Lector, utere, fruere.



### ISAGOGE PHYTOSCOPICA.

#### CAPVT I.

Plantae Definitio & Distinctio.

ı.

Janta, Φυλον, est corpus viuum non sentiens; siue est corpus certo loco, aut certae sedi affixum, vnde Nutriri, Augeri, denique se Propagare potest.

2. Nutriri dicitur, quod alimentum attractum in partium suarum substantiam transmutat, ad supplendum id, quod a calore natiuo, siue

flammula insita dissipatum est.

3. Augeri, siue augmentari planta dicitur, quae plus substantiae sibi restituit quam dissipatum est, ideoque non solum secundum omnes, non satis adultas partes, in omnes dimensiones, maior redditur; verum etiam nouas insuper partes sibi aggenerat.

4. Differt igitur augmentatio plantarum ab aucta animalium.

1. Quod non omnes partes simul augentur. Nam folium arboris v. g. vbi satis expansum est, atque ita satis adultum, non amplius crescit; item

Surculus, aut ramulus, vbi fufficienter extensus est, non amplius in longum exporrigitur.

2. Quod nouae partes, videlicet noua folia, noui surculi, pediculi, flores aggenerantur:

ς. Propagare se planta dicitur, vbi aliam sibi specie similem gignit.

Propagandi igitur vocabulum hic late fumitur.

6. Planta

6. Planta alia est proprie dicta:

alia Rudimentum potius plantae, aut deficientis caussae generantis Abortus.

Vti sunt Fungi, Tubera, Musci, Lenticulae &c. quorum considerationem ad finem huius speculationis (a) reiicimus.

(a) Appictum hic est ab auctore in B. signum addendorum. Nimirum de Abortibus in hac Isagoge nihil traditur. Monere ergo se ipsum voluit, vt aut adderet, quod hic promittit, aut mutaret verba ex (ad finem &c. in: hic omittimus, vel: alteri speculationi reservamus, Vaget. (\*)

#### CAPVT II.

Plantae Partitio, & Definitio partium immediatarum.
Radicis
Supernae partis
Fundi
ex mediatis etiam Caulis
Caudicis
Culmi
& Scapi caulis.

I.

Planta proprie dicta duabus constat partibus, radice & superficie siue

parte superna.

2. Radix est pars inferior, quae intra corpus solidius, quod plantae sedem praebet, abdita, (siue illud sit terra, vt plerumque, siue saxum, siue calx, siue arena, siue lignum, siue quodcunque aliud) & alimento attrahendo destinata est. (\*\*)

(\*) Fungos & Muscos non esse abortiuos plantarum foetus, recentiorum imprimis celeberr. Florentini Medici Petri Antonii Michellii detexit solertia. vid. Linuaei Observationes in Regn. vegetabile n. 1. Eiusd. Class. plantar. p. 601. 602. Cl. Ant. Gvil. Plaxii Progr. de Seminibus plantar. Lips. 1736. p. 2. nec non Exc. Iob. Ad. Wedelii Diss. de Fungis, Ienae 1744. p. 12. Contrarium licer asserate celeb. Iob. Maria Lancisius in Disseratione, quae cum eiusdem eruditissiins operibus prodiit Geneuae 1718. in 8v. Aborttus autem ideam à plantis plane, vna cum aliis eiusmodi metaphoricis loquendi formulis, remoueri vult, Linnaeus in Critica botanica §. 269. p. 219.

(\*\*) Consule si placet, Iob. Gesneri Diss. physicam de Vegetabilibus p. m. 62. seqq. Vberius autem Celeb. Plazii Histor. Radic. Lips. 1733. & Cl. Ludwigii Institut. regni vegetab. Lips. 1742. p. 156. Ill. Wolfsi Wärkungen der Natur cap. X. §. 388. und vom Gebrauch

der Theile in Pflanzen cap. III.

3. Pars superna est, quae supra sedem plantae in liquido corpore (aëre vel aqua) exstat, & speciei eminus propagandae praecipue inseruit.

4. Limes communis, in quo duae istae partes cohaerent, Fundus

plantae dicitur, Graecis no 9 μήν.

5. Pars superna, aut pars partis supernae est vel Caulis, vel Folium, vel Flos, vel Fructus, vel minus secundaria aliqua pars v. g. Villus aut Spina.

6. Caulis est pars superna, in altitudinem ita exporrecta, vt ante-

ciora a posterioribus, vel dextra sinistris non differant.

7. Caulis in Arboribus & Fruticibus Caudex,

In Frumentis Culmus dicitur.

8. Caulis est vel simplex vel ramosus.

9. Scapus caulis est pars caulis ramosi, quae a fundo ad cacumen summum vna quasi linea extenditur, cui rami vtrinque adhaerent. (\*)

# CAPVT III.

Folii Definitio 1. 2.
Divifio 3.
Folii Simplicis Definitio 4.
Divifio 5-12.
Folii Compositi Definitio 13-17Divisio 18. 21. 24.
Foliatura Digitata 19.
Pennata 20-26.
Triangulata 27-30.
Planta difformiter foliata 31.

I,

CLIVM est, quod a sede, cui adhaeret, ita in altitudinem, siue longitudinem, & latitudinem extenditur, vt tertiae dimensionis termini inter se differant, h. e. Superficies solii interna ab externa.

2. SVPERFICIES FOLII INTERNA, quae & fuperior, item supina dicitur, est quae caulem respicit, ideoque vel cauitatis ali-

quid

<sup>(\*)</sup> De Caulis natura pluribus vid. Gesnerum 1. c. pag. 66. it. Celeb. Plazii Dist. de Caule Plantar. Lips. 1743. & Cl., Ludwigii Institut. regni vegetab. p. 19. & 163. Illustr. Wolff. von Würkungen der Natur cap. XI. Idem, vom Gebrauch der Theile in Pflanzen cap. XV.

quid obtinet, vel minus convexa est, quam altera exterior siue inferior, siue prona superficies.

3. Folium aliud est fimplex, siue stricte dictum, aliud compositum.

4, FOLIVM SIMPLEX est, quod in alia folia non diuiditur. Vt in Ceraso, Fago, Malo, Pyro, Quercu, Vite, Auena, Hordeo, Gramine, Lilio, Tulipa, Roremarino, Saluia, Vrtica.

Estque margine vel integro vel scisso;

Item sinuato, vel absque sinubus, Denique planum vel concauum.

5. Scissi marginis folium vel est laciniatum, vel serratum, sine crenatum, vel dentatum (denticulatum.)

6. Folium sinuatum, vel angulatum est, vel absque angulis.

7. Angulatum folium, inter integri & scissi marginis folium quasi ambigit, vt Hederae adultae, Bryoniae.

8. Absque angulis, vt Smilacis asperae.

9. Lacinia est portio folii inter fissuras aut sinus &c. (alia incertum quae deliberauit adiicere) inclusa.

10. Fissura est profundior scissura.

II. FOLIVM CONCAVVM, quod fistulae instar teres, & intus vacuum est, ita, vt insima pars, & cauli proxima plana sit; vt in Allio, tam Satiuo, quam Syluestri, Caepa, Porro.

12. Circumscriptio folii est perimeter folii absque scissuris conside-

rata (per mentis scil. abstractionem.)

v. g. Folium Hederae terrestris, item Geranii columbini, Gir-cumscriptione circulare est.

13. FOLIVM COMPOSITVM est, quod ex Petiolo, siue

Neruo, fiue Costa, & Foliis simplicibus constat.

14. PETIOLVS, fiue Pediculus folii, est pars in longitudinem extensa, quae folium sustinet, & cauli connectit.

15. Petiolus stricte dictus a caule vsque ad folii initium intelligitur;
Id, quod inter folia est, NERVVS saepius, aut COSTA dicitur.

observantibus pro Ramo aut Surculo habetur, sed discernitur facile, 1. Quod superficiem habet internam & externam, vt & folium simplex. 2. Quia totum autumno decidit, vt & simplex folium.

17. Ad

17. Ad homonymiam Folii, quod etiam in flore est, euitandam, dicimus etiam Foliaturam vel Simplicem, vel Compositam.

18. Foliatura Composita est vel Digitata, vel Pennata, vel Trian-

gulata.

19. FOLIATURA DIGITATA est, vbi plura simplicia folia, quasi ad vnum petioli punctum, siue terminum aptata sunt,

vt in Trifoliis & Pentaphyllis, Fragaria, Lupino.

Fog. Digitatam Helleboro & Aconito Scaliger tribuit in r. de plantis p. 69. a. C.

20. PENNATA est, vbi bina folia e regione sibi ad idem quasi Costae punctum (fiue ad eandem Costae distinctionem) opponuntur.

21. Est vel parifolia vel imparifolia.

Siue vel pariter pennata, vel impariter pennata.

22. PARITER pennata, vt in Faba, Pilo, Vicia.

Vna arborum Lentiscus pariter pennatam foliaturam gerit.

23. IMPARITER pennata, vbi vltimus costae terminus singulari folio clauditur, quod imparem numerum foliaturae tribuit.

Vt in Rosa, Iuglande, Fraximo, Sorbo, Potentilla. Dolicho. (\*)

24. Pennata foliatura porro vel vniformis est, vel diformis.

25. Vniformis, si folia circa eandem costam haerentia magnitudine fere aequalia funt.

26. Difformis, si vel maioribus minora sunt interposita, vt in VI-

maria, Agrimonia, Filipendula, vel succedant.

27. TRIANGVLATA foliatura est cuius costa ita ramosa estvt bini rami ex eadem distinctione primario sibi oppositi tot soliis vestiamar, vel in tot ramos findantur, quot reliqua exterior costae primariae portio obtinet. Talis est in Leuistico, Apio hortensi, Aquilegia, Paeonia.

Dicitur etiam Ala foliorum; Ala foliosa; Folium ramosum.

28. Primaria triangulatae foliaturae costa etiam Scapus costae dici Costa foliaturae etiam Neruus dicitur. potest.

(\*) Vox recentioribus Botanicis rarius vsitata, Phaseoli speciem esse apud Theophr. putat Iob. Bodaeus a Stapel in Not. & Commentar, ad Theophr. Erefii Hist. Plantar. Libr. VIII. c. 3. p. m. 926. consentit Cl. Linnaeus in Critic. Botan. p. m. 121. Qui tamen nouum hoc nomine genus infignivit, carina non spirali a Phaseolo distinctum, Gener. Plant. B. 588.

20. Trian-

29. Triangulatae foliarurae costam interdum etiam Ramastrum appellamus, quia Ramum, h. e. partem caulis quasi simulat; a ramo tamen discernitur, quod interdum superficiem exteriori dissimilem sigura obtineat.

30. In foliatura triangulata vnum folium particulare, latere pro-

suberans, aut fissum, interdum loco duorum est.

31. PLANTA DIFFORMITER FOLIATA est, cuius folia in imo caule, aut circa radicem sita ab iis, quae reliquo cauli adhaerent, notabiliter discrepant, ita, vt non paulatim mutetur figura.

Ita in Smyrnio circa radicem foliatura est triangulata e foliis particularibus fissi marginis, instar Apii; in caule folia simplicia margine

integro caulem absque petiolo amplectentia.

In Campanula minima, folia circa imum caulem lata; reliqua ob-

Jonga & angusta.

In Ranunculo fluuiatili, folia sub aquis capillacea, extra aquam sotunda.

ASSERTIO,

Foliatura digitata in arboribus rara est, sed triangulata rarior, vtraque in herbis frequens, triangulata frequentior. (\*)

# CAPVT-IV.

Caulis Distinctio 1-4-Ala 5. 6.

¥.

Distinctio caulis, est pars caulis, vnde vel Ramas, vel Folium, vel Pediculus folii; vel Flos, vel Pediculus floris, fructusue, vel plura horum simul prodeunt.

2. Si caulis, aut ramus caulis, quasi prismaticum corpus considegetur, distinctio haec est quasi transuersa sectio basi prismatis parallela.

3. Distinctio haec, si protuberat, Geniculum, aut Nodus dicirur.

Item Iunctura, si pars superior inferiori pyxidatim inferatur, ve in Cannabina, Persicaria.

g°) De foliorum structura disterentia vsu vid. Gesnerum I. c. p. 72. sepq. Plazzi Histor. folior. in plantis. Lips. 1740. Ludwigi Institut. regni vegetab. pag. 175. Cl. Ludwig Phil. Thunigs Versuche Iltes Stück n. V. Ill. Wolssum vom Gebrauch der Theile bey des sep Phonaen cap. V. Id. von Wärkungen der Natur cap. XI. §. 394.

4. Pars

4. Pars caulis, aut rami caulis inter duas distinctiones Articulus, item Internodium dicitur.

5. Ala caulis est angulus, quem cum caule vel ramus, vel folium, vel pediculus folii constituit, qui semper fere acutus est, vel rectus saltem, quia rami & pediculi sursum enituntur.

6. Cum caule dico constitui illum angulum, sine cum scapo, sine

cum ramo caulis constituatur. (\*)

# CAPVT V.

Plantae species vulgares 1. 2.
Mutila 5. carens caule 6.
radice 7-9.
Persecta 4. 10. Germinationis confusae 11. 12.
ambiguae 13.

Ľ.

Planta proprie dicta communi sententia in arborem, fruticem, suffruticem & herbam diuiditur;

Verum non ab omnibus eodem sensu membra divisionis expli-

cantur.

2. Conemur, quantum fieri potest, distinctas adserre notiones:

Quantum fieri potest, inquam, quia partim appellationes, partim observationes in nonnullis nos deficient.

3. Planta vel perfecta, vel mutila est.

4. Perfecta est, quae tum radice, tum caule praedita est.

5. Mutila est, quae vel caule caret, vel radice.

6. Quae excaulis est, eius supernam partem folia constituunt, quae semen etiam in auersa, siue exteriore superficie ferre solent, atque ita caulis vices supplere.

(\*) Ex alis Gemmae plerumque praerumpunt steriles, ex quibus surculus nouus oritur. Sunt enim Gemmae secundum Gesner. l. c. pag. 72. Folia nondum explicata in nodulis convoluta existumt in arberibus of frusticibus. Docet id autopsa. Aliæ sunt ab his diuersæ fertiles, frustiserae vel storiserae, quae plerumque in summitate caulis & ramusculorum crescunt & praeter folia etiam stores of post horum destuum strustus proserunt. Germanis hanc ob causam vocantur Tragkuospen, & quia turgidiores prioribus, facile ab illis oignosci possunt. Conf. Chr. Gottl. Ludwigii Institutiones histor. phys. regni vegetabil. p. m. 219. seqq. Idem in Aphorism botanic. pag. 68. Ill. Christ. Wolssi vernüsstige Ged. vom Gebrauch der Theile in denen Pstanzen cap. VI. p. m. 716. Idem vora Würkungen der Natur cap. 4. Cl. Ludw. Phil. Thämmigs Versuche lites Stück n. V. von den Bäumen, welche aus Blättern ausserwogen worden. Gemmae sub sundo in terra reconditae nouas radicum producunt propagines.

Tales funt: Filix, tam fimplici folio, quam ramoso; Not.contra Dodon. Adiantum, Phyllitis, siue Lingua ceruina, Scolopendrium, & similes.

7. Vtrum autem omnes semen gerant, adhuc controversum est, & observatione vlteriore indiget.

Nos speramus, naturam quoque hic analogiae studiosam, ideoque nullam plantam semine destituitam. (\*)

8. Quae radice destituuntur, si qua talis est, loco radicis tamen sibras quosdam & processus habeat necesse est, quibus sedi sua affigatur, quamuis iis in attrahendo alimento non vtatur, sed supernae partis poris alimentum acquirat.

9. Tales esse feruntur, quae saxis adhaerent,

Vt Quercus marina, Lichen marinus.

Vel aliarum plantarum cauli, aut caudici;

Vt Cuscuta, Epithymum, & secundum quosdam Viscum:

Verum haec necdum satis observata sunt.

10. Perfecta planta vel caulem a folio distinctum gerit vel confufum cum eo.

11. Quae confusum gerit, ea est, quae folium e folio producit, atque ita ex meris foliis caulem quasi quendam ramosum componit, qui eo

DISCREPAT A NATVRA caulis, quod PARTES prismatis figuram non referunt, sed crassitiem latitudine minorem habent, h. e. IN LATITVDINEM EXPANSAE SVNT, ideoque etiam folia dicuntur.

Rursus in eo CAVLIS INDOLEM EXPRIMIT hoc folium, quia SE PROPAGAT, quod folio proprie dicto

non competit.

Differt etiam id, quod folium dicitur in his plantis a folio proprie dicto, quod SVPERFICIES latiores, figura non diuersas, h. e. INTERIOREM AC EXTERIORE NON DIFFERENTEM obtinet.

Ex quibus constat, folium hoc magis ad caulis, quam foliaturae indolem accedere.

(\*) Multa detexit Petri Ant. Michellii industria in Muscis, Lichenibus, Fungis & similibus, in Non Plant. Gener Florent. 1729. nec de reliquis dubitandum est. conf. Carol. Linnaei genera Plantar. Class. XXIV. Cryptogamia vocata.

12. Ra-

12. Rarae admodum funt plantae haec confusae germinationis, inter eas autem eminet Ficus Indica, siue Tune, siue Opuntia, quae & slorem & fructum in supremis foliis siue ramis gerit.

Talis quoque est Sertularia Imperati, siue Lichen marinus Clusii,

Item plantula in Varno crescens, quam saepe remis erutam όλο-Φύλλιδα vocitabam, quod meris quasi foliis constaret: qua radice nitatur, item, utrum slores, fructusue ferat, nondum mihi compettum.

13. Est forsan & alius modus plantae consus germinis, vbi quae e caulis geniculis enascuntur, vtrum rami caulis, an folia dicenda sint, ambigi potest, vt in Equisetis, siue Hippuridibus. Nam prismatica forma, qua scapo similia sunt haec germina, caulis partes esse arguit: at quod (si potest tollere fassistatem) slore & fructu destituta reperiuntur, foliaturae esse potius accensenda ostendit.

# CAPVT VI.

De planta multiplici, siue plurium fundorum.

ī.

Perfecta & distinctae germinationis planta vel simplex est vel multiplex.
2. Simplex est, quae vnius est sundi: multiplex, quae plurium.

3. Plures habere fundos (Vitruu. c. de org hydr. habet fundulos)

dicitur planta, vel ob caulis, vel radicis fœcunditatem.

4. Ob caulis facunditatem, si caulis aliqua pars terram, aliamue plantae sedem attingens nouus fundus siat, & radices deorsum, caulem sursum emittat

5. Tales funt in humili plantarum genere Fragaria, Anserina, Pilo-

fella, Chamedrys, Peruinca;

item in grandiore, siue robustiore, Rubus,

& fi ars accedat, vt in Rofa, Vite. Amygdalo, Punica.

6. Ob radicis facunditatem fundi plures sunt, si radicis aliqua portio, terrae superficiei vicinior nouum caulem sursum, nouas sibras siue radiculas deorsum essundat.

7. Id autem fit dupliciter;

vel enim radix fursum ramosa, & quasi πολυκέφαλος, sine multorum capitum, vt in Taraxico, Imperatoria, Eryngio marino, Bellide;

8. Vel radix transuersum scrpens, aut ramus aliquis radicis transuersus e pluribus geniculis siue oculis caules & radiculas producit.

9. Et

- 9. Et hic multiplicis plantae modus frequentior est, vt in Gramine canino, Harundine, Hedera terrestri, Lilio conuallium, Polygono, Mentha, Menthastro, Sisymbrio, Equiseto, Vacciniis, Pyrola, Populo Libyca siue tremula;
  - vel a natura; ut: Rubus vterque, Pyrola fruticans; vel arte adiuuante, ut: Vitis, Rosa.

II. Fieri potest, vt planta pro diversa origine sine nativitate, vel vnius, vel plurium sit fundorum,

vt Vitis e semine, h. e. Gigarto uvae, simplex;

Quae vero ex malleolo, multiplex sit; Quod viteriori observationi committimus.

12. Planta plurium fundorum plurium instar plantarum est, ideoque differentiae reliquae plantarum non minus plantae, quae multipli-

cis plantae pars est, quam simplici plantae conueniunt.

13. Cum planta dividitur in simplicem & multiplicem, vt in species, non actu, sed potentia simplex, & multiplex intelligenda est, hoc est, planta cuius haec est natura, ac facultas, vt vel simplex sit vel multiplex.

#### CAPVT VIL

Planta vnicaulis 2. 4. Multicaulis 3. biformiter 6. 7. fimpliciter 8. Multicaulem fimulans 9. 10.

I. It autem porro perfecta planta vel vnicaulis, vel multicaulis.

2. Vnicaulis est, quae ex vno fundo vnum caulem, siue caudicem profere.

3. Multicaulis est, quae ex eodem fundo plures caules fundit.

4. Vnicaules sunt Brassica, Lactuca, Lupinus, Faba, Beta, Atriplex, Ferula, Ferulago & omnes arbores:

5. Multicaulium alia biformiter multicaulis, alia simpliciter multi-

caulis est.

6. Biformiter multicaulis, quae diuersae indolis caules profert, quorum vnus nudus, & slori tantum, ac semini gerendis inseruit, ac interdum,

terdum, vbi breuior est, cauliculi, aut petioli tantum nomen meretur; Alter foliiis amicius per terram serpit, & sicubi radices agit, nouum germen etiam sursum effert, quod cum priore plantam plurium sundorum constituit.

7. Plures utriusque generis caules promunt Viola martia, Viola canina, Pilosella serpens: At Fragaria caule vno folioso & ramoso slorem & fructum gerit, reliquis prolixis solio raro amictis serpit, & radices agit.

8. Simpliciter multicaulis est, quae plures vno eiusdem indolis

fert caules,

Et foliosos quidem, vt Artemisia, Echium, Filipendula, Geranium, Filiago, siue Gnaphalium, Marrubium, Millesolium, Paeonia.

Nudos vero: plantago.

Secundum quid nudos vid. c. 8. 8.

9. Multicaulem plantam saepe simulat vnicaulis,

Si vel non longe a fundo ramosa sit (praesertim si coniugatim germinet) vt in Alsine, Conyza,

vel in radice transuersa fundi sibi inuicem sint propinqui.

10. Fruticosa planta dicitur, quae caulem habet ab imo ramosum, praesertim si perennis sit:

Caulem ab imo ramosum habent Satureia, Saluia, Ruta, Mercu-

rialis.

(Scholion ex scheda quadam in B. hic reperta.)

Helenium siue Inula vastos facit frutices colum. spatio se fruticat Plin. (h.e. planta ramosa est,) utrum sit πολύκαυλος observandum, Forsan plures profert caules ex diuersis radicis oculis.

Nam oculis e radice excisis feritur, teste Colum. Plin. Pallad.

e propaginibus radicis Liliorum aut Ari modo seritur, Diosc. 1, 26.

#### CAPVT VIII.

De differentia caulis a foliis.

Î,

Planta cauligera vel foliis est vestita, vel iis omnino destituta.

2. Foliis omnino destitutam noui nullam. Nam Dentaria, αφυλλος quae dicitur, imo Limodorum & Orobanche caulem habent foliolis amicum.

3. Quae foliis est amicia, vel folo caule, vel fola radice, vel viroque

modo est foliosa.

4. Quae SOLA RADICE foliata est, h. e. ex solo fundo folia profert, nudicaulis planta dicitur, vti sunt Taraxicum, Plantago, Pilos fella, Bellis, Nymphaea, Sedum aquatile, Arum, Ranunculus Lusitanicus, Gramen polyanthemum, Plantago aquatica.

5. Maior pars plantarum VTROQVE MODO folia producit, veruntamen quaedam earum *fecundo* vel *tertio* demum aetatis *anno caulem* faciunt, vti Cynoglosium, Apium hostense, Verbascum, Sclarea, siue

Horminum fyluestre.

6. Eae, quae radice sunt foliosae, caulem plerumque post folia ista radicis proferunt,

Idque vel eodem anno, vt Lapathum, Taraxicum, Plantago;

Vel anno sequenti proximo, ve Pastinaca, tam tenuisolia, quam latisolia; Buglossum Italicum, Anchusa, Cynoglossum;

Vel tertio demum, vt Apium hortense, (vulgo petroselinum.)

- 7. Paucis quibusdam caulis ante ima haec folia enascitur, imo marescit rursus, antequam folia ista prodeant, vt in Tussilagine, Petasite, & Scilla.
- 8. Caulis secundum quid nudus dici potest, qui foliis admodum est exilibus, & a caule non satis distinctis est amicius, vt in Tussilagine, Petasite, Dentaria ἀ ζύλλω, Cotyledone prima, Pyrola vulgari.

9. Caulis determinate foliatus est, qui ex certa distinctione tantum

folia profert,

Et ex vnica quidem in Anemone, Pulsatilla, Herba paride, Aconito hyemali;

Ex duabus, in Phthora (quae vulgo Thora dicitur,) Cotyledone altera, Auricula vrsi, Vnisolio.

10. Ophioglossum quoque caule est nudo, licet caulis partem vagina folii inclusam habeat, quia folium non e caule, sed fundo enascitur.

11. Lunaria SOLO CAVLE folium, idque vnicum & pennatum quasi gerit.

# CAPVT IX.

De differentia caulis a germinatione.

Singulari 1, 2, 11.

Coniugata 3. &c.

Y.

Caulis vel sigillatim profert folia (sub quibus etiam ramastros complector) vel coniugatim.

z. Sigillatim, si e singulis caulis distinctionibus singula prodeant

folia, itemque rami. W de desser le sa coince e

3. Coniugatim, si e singulis caulis distinctionibus vel bina, vel terana, vel quaterna, vel sena, vel plura prodeant folia.

4. Bina, vt in Saluia, Vrtica, Valeriana, Fraxino, & in quam plu-

rimis.

5. Terna, vt in Pseudolysimachia-caerulea, item purpurea, item in Lysimachia vera, id est lutea.

6. Quaterna, vt in Cruciata.

7. Sena, vt in Galio, Rubia, Aparine, Mollugine, quo etiam videntur pertinere Iuniperus, Abies, Picea, Pinus, Pinaster.

# THEOREMATA.

- 8. I. Plantae quadrato caule praeditae omnes coniugatim, & biiugo ordine, & quidem alternatim proferunt folia, itemque ramos ex alis fiue finubus, fiue angulis, quos folium, aut pediculus folii cum caule constituit.
- 9. Alternatim dicuntur pronasci folia, aut germina, ve rami, petioli: si superioris paris oppositio, decusse quasi, aut ad angulos rectos secet inferioris paris oppositionem.

10. Il. Multae etiam plantae teretis & non quadrati caulis biiuga

habent folia & germina, vt: Bugula, Brunella, Argemone.

11. III. Quae sigillatim folia proferunt, ramos etiam sigillatim

promunt.

12. IV. Quae biiugam habent foliaturam, biiuga quoque germinatione fruuntur, hoc est; ramos biiugo situ ex eadem distinctione stipitis sibi oppositos proferunt,

Excepta herba, quae Tabernaemontano Lactuca agnina, Dodo-

naeo Olus album dicitur.

Ea enim, cum bina e regione sibi opposita producat solia, singulares tamen ramos emittit, simulque ita circa soliorum sedem inste-stit scapum, ve sibilitati de la circa soliorum sedem inste-stit scapum, ve sibilitati de la circa soliorum sedem inste-stit scapum, ve sibilitati de la circa soliorum sedem inste-stitus soliorum sedem instella solio s

nescias germen utrum ramus, an scapi continuatio dicenda sit,

Nisi mauis dicere, herbam hanc ad primum foliorum e cau-

le exortum terminare caulem, atque ita fine scapo esse,

quod vlteriori vel observationi, vel meditationi committimus.

Nonnullis herba ramea, quasi dichotomiae studiosa appellatur.

12. Admirabilis - Peruana biiugo quidem situ gerit folia, sed ramos fingulares, idque alternatim, profert, h. e. ita, vt qui ordine funt impares (puta primus, fiue infimus, tertius, quintus, feptimus) in eandem stipitis partem spectent, & rursus qui ordine pares (videlicet secundus, quartus, fextus) ex eiusdem lateris alis enascantur.

14. V. Quae plura folia ex eadem stipidis distinctione producunt, eaedem plures quoque ramos inde proferunt sed non semper aeque numerofos, aeque inquam, tum foliorum, tum distinctionum respectu; ta-

les sunt Abies, Pinus, Pinaster, Iuniperus, Rubia, Aparine.

15. Spergula quamuis videatur vel dena ex eadem distinctione effundere folia, tamen reuera, vt binos ramos, ita bina quoque folia, fed in quinas inaequales lacinias profundit scissa.

#### CAPVT X.

Differentiae plantarum a duratione radicis 1.4. Stipitis 3. 6. Foliorum 2. 5.

Restibilis planta est, cuius radix perennis est, h. e. per plures annos viuit, vt: Cynoglossum, Vrtica maior, Corylus, Fagus, Filix, Acanthus,

2. Quaedam etiam folia fundi, siue radicis per hyemem retinent,

vt: Pyrola, Cotyledon.

Item, quae caule carent, vt: Phyllitis, Polypodium, Scolopendrium, Adiantum.

3. Perennis planta est, cuius caulis siue stipes perennis est, vt: Ruta, Saluia, Quercus.

4. Non est autem perennis stipes, nisi radix quoque perennet.

5. Semper virens planta dicitur, quae folia caulis per hyemem retinet, vti sunt: Barbarea, Peruinca, Aquifolia, Buxus, Abies, Laurus, Ilex.

6. Planta

6. Planta perennis solo stipite folia gerens, si singulari sit stipite, arbor,

Si multicaulis, siue multistipes sit, frutex dicitur.

#### CAPVT XI.

De differentiis caulis a ramis & petiolis.

Caulis simplex 2. ramosus 3.

ambigens 4.

Determinatus 5. capitulo 6.

fpica 7. 8.
panicula 9.
umbella 10. 12. 15. 19.
corymbo 11. 16.

Indeterminatus 17. Racemus 18.

I.

Caulis porto vel simplex est, vel in ramos divisus.

2. Simplex, vt in Taraxico, Bellide, Plantagine, Pulfatilla, Anemone, Nymphaea, Bistorta, Vincetoxico, Pyrola vulgari, Gramine Polyanthemo siue Pseudomolye.

3. Ramosus, vt in plerisque.

4. Inter simplicem & ramosum ambigit caulis in umbellam sparsus, vt in Primula veris, Auricula-vrsi; in quibus tamen caulis petiolis po-

tius, quam ramis est diffusus.

- 5. Caulis determinatus est, qui extremitatibus, siue fastigiis stipitis slores & semina producit, ideoque vel in capitulum, vel in spicam siue thyrsum, vel paniculam, vel vmbellam, vel corymbum terminatur.
- 6. Capitulum est, quod constat ex pluribus storibus & seminibus arcte in globosam, aut circularem siue disci figuram congestis.

Globosam, vt in Cyano, Scabiosa, Iacea, Carduis &c.

In disci figuram, vt Bellis.

7. Spica est, quod ex floribus vel seminibus spisse compositum est, ita, ut conus erectus, sed oblongus, siue admodum acutus inde euadat, vt in Lysimachia purpurea, Verbasco, Plantagine, Luteola, Reseda, Bistorta, Secali, Hordeo, &c.

8. Peculiaris spica est in Hyacintho, qui comosus dicitur, inferiori parte laxe sitis slosculis, vt vix spicae nomen mereatur, media parte artissime & petiolis non apparentibus, suprema denique in cristam quasi dispansis, & petiolis quidem caeruleo colore, obsoleti coloris slosculos, antecellentibus.

9. Panicula, item Iuba, est spica laxe diffusa, praesertim propen-

dentibus petiolis, vt in Panico, Milio.

10. Vinbella est extremitas caulis per multas subdivissiones in coni inversi figuram aptata, vt in Apio, Anetho, Fæniculo, & reliquis vmbelliferis,

11. Corymbus est extremitas caulis ita subdiuisa, & sloribus, aut frastibus onusta, ve sphaerica sigura oriatur, ve in Hedera arborea, Sambuco aquatica, Cepa, Porro.

12. In quibusdam vinbella terminatur capitulis vt in Matricaria,

Tanaceto.

13. Aliarum vmbellae terminantur fingulis vel binis floribus.

14. Quasi-vmbella, siue impersecta vmbella dicitur, vbi coni inuersi basis non est satis plana, vt in Centaurio magno.

15. Vmbella plerumque est erecta, sed interdum pendula, aut nu-

tans, vt in Sambuco, Valeriana rubra.

16. Corymbus etiam pendulus in Sambuco aquatica.

17. Caulis indeterminatus est, qui petiolis a latere caulis prognatis flores & semen gerit, ideoque nullum extensionis habet terminum, nisi quem hybernum frigus imponit.

18. Racemus est petiolus floribus aut fructibus ita onustus, vt spi-

cam aliquam imitetur.

19. Ex vmbelliferis plantis paucae sunt ex toto biiugae germinationis, vt Valerianae proprie dictae, Centaurium minus, siue Fel terrae,

Ebulus, & Sambucus, quae pendulam proferant vmbellam.

Relique fere omnes inferiore caulis parte fingulatim proferunt folia & ramos; fuperiore deinde caulis parte primum biugos proferunt furculos, tandem numerosos ex eadem distinctione ramulos, h. e. vmbellas, quibus flores, & ad singulos flores bina semina inhaerent, vt in Elaphobosco, siue Pastinaca latifolia, Leuistico, Apio, Ferula, &c.

#### CAPVT XII.

Sequentur differentiae caulis per le spectati:
Angulosus 1-7.
Striatus 8.
Teres 9. 10.
Solidus, cauus 11-14.
Caudicis partitio 15. 16.

1.

aulis vel angulosus est, vel teres.

2. Angulosus vel triquetrus est, vel quadrangulus, vel saepius angulosus.

3. Triquetrus est in Plantagine aquatica, Cypero, Gramine cyperoide, Papyro, Sanguisorba, Cirsio Dioscoridis, Moly triangulari.

4. Ad tringulum caulem etiam referri potest caulis, qui ternis foliorum processibus, praesertim spinosis distinguitur, vt: Carduus-Chryfanthemus.

5. Quadrangulus caulis est in Saluia, Mentha, Lamio, Marrubio, Rubia, Cruciata, & sexcentis aliis.

6. Quinquangulus, in Campanula, Polyacantha vulgari.
7. Sexangulus, vt in Pfeudolyfimachia purpurea trifolia.

8. Inter angulatos, & teretes caules ambigunt striati, vt in Siciliana.

9. Caulis teres siue rotundus, vt in Anagallide aquatica, Nummula-ria, & infinitis aliis.

Praesertim in bulbosis;

10. Caulis teres inferiore parte euidenter crassior est in Cepa.

11. Caulis item vel solidus est vel cauus,

& si cauus, vel medulla repletus, vel inanis,

& si inanis, vel totus inanis, vel in geniculis, siue nodis consolidatus.

12. Caules caui absque nodis funt in Iunco, Gladiolo palustri siue Iunco florido, Papyro Nilorica.

13. Caules inanes sed geniculati sunt in Arundine, Fœniculo, Gentiana, Filipendula aquatica, Frumentis, Graminibus.

14. Caulis medulla repletus, vt in Sambuco, Papyro.

15. In arboribus, & fruticibus caudex in corticem, alburnum, lignum stricte dictum, & medullam dividuur.

16. Medulla, quae & cor dicitur, fere solidior est ligno, & lignum

alburno, interdum contra se habet.

#### CAPVT XIII.

Floris definitio 1. 2. 3. Et distinctio a perianthio 3. flore apparente 4-9.

ī.

los est pars plantae tenerior, colore, vel figura, vel vtroque insignis, rudimento fructus cohaerens. (\*)

2. Fructus autem dicitur vel semen vel theca seminis.

3. Perianthium est, quod florem tegit, ideoque crassius est, minus

infigne flore ipfo. Dicitur etiam calyx.

4. Definitioni huic videtur obstare Frumentum Turcicum, quod flores a fructu prorsus disiunctos habet, nisi forsan flores fructui insident sed immaturo, quod amplius observandum; imo iam deprehendi flori fructum nonnunquam proxime subiectum, sed minus vberem eo, qui caulis inferioribus inhaeret partibus.

5. Obstar & Iuglans, nam iulus eius (siue amentum) slos magis

videtur, quam crista illa gemina quae fructus vmbilico insidet.

6. Corylus, vti & Quercus flores profert purpureos.

Sed de arborum fructibus alias.

7. Cymae quaedam herbarum h. e. summi caulis folia colore quoque conspicua sunt, vt videantur huiusmodi plantae gemino se ostentare flore, verum folia haec flores non sunt,

tum quia reliquis foliis figura, & situ respondent,

tum quia fruclui non cohaerent.

8. Cymae huiusmodi coloratae sunt in Hormino satiuo siue Cretico, item in Milio syluatico, siue Pseudoparietaria.

(\*) De florum structura, partibus, differentiis & vsu conf. pluribus Linnaei fundamenta botanica. IV. Ludwigii Institut. regni vegetab. p. 132. & 187. imprimis vero, qui copiosis de hac plantae parte egerunt, Iul. Pontederam in Anthologia, & Sebast. Vaillant. de structura florum. Ill. Wolff. von den Theilen der Pflanzen c. VII. vbi §. 258. azelsiav nostri autoris laudat.

9. Item

9. Item e spica Stoechadis suprema folia quaedam purpurea aut caerulea eriguntur, quae ligulas vocat Clusius.

# CAPVT XIV.

De Perianthio.

Flos nudus 1. 2.

Munitus perianthio quod vel 3. 4.

I. Initio clausum 5.

Semper apertum 6.

II. Proprium flori cuique 7. p.

Commune floribus pluribus explicatis, nudis 7. f. vestitis 8.

ventins 8.

nondum explicatis 9.

III. Proprium flori

Commune cum fructu (II.) flori cauo labiato II. m.

vniformi II.f.

IV. Simplex 13. Margine fecto laciniis I. acutis 16. p. obtufis 16. f.

II. prolixis 17. p. breuiculis 17. f.

Compositum 14. ex foliis iuxta se positis 14. p.

fibi arcte infidentibus, vel squamis 14. f. imo cuspide tantum disiunctis 15.

V. Inferiore parte strictius 19. p.

turgidum - fimplex 18. m.

compositum 18. f.

VI. Rotundum & teres 19. p.

Striatum s. sulcatum 19. f.

VII. Magnum 20. p.

Paruum 20. m.

Mediocre 20. f.

Ambiguus imitantibus perianthium neruis ar.

(Ambigui fimul staminis ac styli 22.) 1

foliis exterioribus 23.

L

los vel nudus est, vel perianthio munitus.

2. Flòres nudi, vt: Tulipae, Lilii, Martagi, Colchici, Croci, Polygonati, Sambuci, Fagopyri.

3. Perianthio muniti, vt Borraginis, Buglossae, Papaueris &c.

- 4. Perianthium h. e. tegumentum floris aliud est ab initio clausum, aliud semper apertum. (\*)
- 5. Ab initio clausum est, quod florem nondum explicatum totum inuoluit, & dehiscens deinde eundem retegit, vt in Papauere tam vulgari quam corniculato, Capparide, Palma proprie dicta siue dactylisera, Lauro, Paeonia.

6. Semper apertum, yt in plerisque aliis.

7. Perianthium plerumque suum cuique flori proprium est. Interdum etiam pluribus floribus idem commune, quod dupliciter fir.

Primum, si plures flosculi in vnum caput sint compacti, vt in

Cyanis, Iaceis, Carduis & discissoris.

- 8. Scabiosa hoc habet peculiare, quod praeter commune capituli perianthium quilibet flosculus suo perianthio, vtriculo scilicet crenato, est vestitus.
- 9. Deinde commune est pluribus floribus perianthium, videlicet nondum explicatis, vt in Palma dactylifera, & Lauro.
- 10. Perianthium aliud flori cum fructu commune, aliud flori pro-

prium.

- 11. Commune, vt in iis omnibus plantis, quarum flos fructum complectitur, (fiue quarum flos fedi fructus affigitur,) vt in Spergula, item in cauis floribus, quibus nuda fubfunt femina, fiue labiatis, vt in Saluia, Marubio; fiue vniformibus, vt in Buglosso, Lithospermo.
  - 12. Perianthium est vel simplex, vel compositum.
- 13. Simplex, quod vtriculus est sola lamina constans, vt in Saluia, Marubio, Lamio, Hyosciamo, Nicotiana, Lychnidibus, Caryophillis, Geraniis, item perianthium cuiusque slosculi in Scabiosa.
- 14. Compositum, quod vel foliis pluribus iuxta se positis constat, vt in Cunigundina tam perfoliata, quam verbenisolia, item in Scabiosis, capituli perianthium

Vel ex foliis aut squamis, sibi inuicem arte, & imbricatim insidentibus est compactum, vt in Cyanis, Iaceis, Cinara & aliis Carduis.

(\*) De Perianthio & Calyce vid. Cl. Ludwigii Institut. regni vegetab. pag. 34. §. 99. Cl. Linnaei Element. botan. IV. Class. Plantar. pag. 375. seqq. & laudatos de slorum structura in antecedente capite autores.

- 15. Folia ista interdum dimidia sui parte, inferiore scilicet, sibi inuicem incumbunt, cuspide vero a capitulo, & a se inuicem sunt disiuncta, ve in Cnico, Carduo benedicto, Carduo lanceolato.
- 16. Perianthium simplex plerumque in margine est in lucinias sectum.

Vel acutas, vt in Saluia, Lamio,

Vel obtusas, vt in Nicotiana minore fiue vulgari.

17. Perianthium vel profunde sectum est, in prolixas scilicet lacinias,

Vel minus profunde, in breuiculas, vt in Othonna, siue slore Tunetano.

18. Perianthium plerumque inferiore parte strictius,

Interdum etiam ventrosum quasi, & turgidum, quale est simplex perianthium in Geraniis, Ocymoide, Vaccaria:

Compositum in Cnico, Carduo benedicto, Carduo lacteo siue

Mariae.

19. Perianthium aliud rotundum, & teres, vt in Caryophillis, Narcissis:

Aliud ftriatum, fine sulcatum, vt in Othonna, fine flore Tunetano.

20. Perianthium aliud magnum floris respectu, vr Nicotiana minore, Saluia;

Aliud paruum, vt in Digitali, Nicotiana maiore;

Aliud mediocre, ve in Othonna: De ingri in ale

21. Internudos & perianthio vestitos flores ambigunt flores Cucurbitarum, & Peponum:

Viridibus enim quibusdam siue neruis (siue dorsis, siue strigibus) a fundo ad marginem tendentibus variantur, quorum nonnulli (nerui) infra mediam storis partem a store quasi auulsi speciem perianthii angustifolii exhibent.

- 22. (Peculiare quid etiam in iisdem floribus observatur, quod inferiores partes aliquid inter stamen & stilum ambigens, vel ex stamine, & stilo confusum obtinent.)
- 23. Ambigunt etiam inter nudos & vestitos, Ficus Indicae (Tunae) stores; nam exteriora folia tribus quasi ordinibus, tum obsoleto colore,

tum paruitate a genuinis foliis floris differunt. Extima enim funt admodum parua, & exteriore praesertim superficie obsolete - purpurea, siue ferruginea; proxima plus citrini coloris admixtum habent, & maiora sunt; quae tertia in serie, parum de ferrugineo colore retinent & ad magnitudinem genuinorum propius accedunt.

# CAPVT XV.

Flos perfectus 2.
licet stamineus dicatur 6.
Imperfectus 3.
Stamineus 4.
Iulus quercus & iuglandis 5.
Stilo carens 7.

I.

Flos alius perfectus est, alius imperfectus.

2. Flos perfectus est, qui folio, staminibus, & stilo constat, quamuis stilus rudimento fructus cohaeret.

3. Flos imperfectus est, qui harum partium aliqua caret.

4. Flores staminei dicuntur, qui solis staminibus constant, aut staminibus & stilo. Tales slores sunt in Vlmo, Typha, Gramine typhino, Secali, Populo nigra, Sanguisorba, Cirsiis Clusii.

5. In Quercu iulus (Dresp:) staminibus constans antecedit floscu-

lum purpureum, qui rudimento fructus coniungitur.

In Iuglande quoque iulus, nihil est, nisi slorum stamineorum series;

Tres arcuatae cuspides, quae rudimento fructus inhaerent,


colore titulum floris non merentur.

6. Sunt quidam flores fulso staminei dicti, vti Iaceae, siue Aphyllanthis, Scabiosae, Matricariae, Chrysantemi; capitula enim, & disci harum plantarum sistulosis sloribus sunt confarcti.

7. In nonnullis quoque stilus deest, vt: in Iride, Tulipa, Papaue-

re; habent tamen hae succedaneum aliquid stili.

# CAPVT XVI.



I.

Los perfectus alius fimplex est, alius compositus.

2. Simplex est, qui vnica lamina, siue bractea, siue folio contiguo (annon? continuo) constat, quod fere semper cauum, aut sistulare est.

Eius inferior pars, qua perianthio affigitur, quae angustior fere

est & albida, vnguis dicitur.

3. Flos simplex alius vniformis est, alius difformis.

4. Vniformis est, qui terminos duarum dimensionum inter se similes habet; siue, qui dextrum sinistro, & anterius posteriori simile, superius vero inferiori dissimile obtinet; siue qui figura quasi tornatilis est.

#### Definitio Geometrical V A A

ç. Tornatilis autem figura est, quae oritur plana figura super vno latere recilineo quiescente in orbem mota, sine recilinea sit mota figura, sine mixtilinea.

6. Dixi quasi Tornatilis sigura, quia si plicae, striae & sissurae ac-

cedant, figura tornatilis esse definit.

7. Vniformes simplices flores sunt in Conucliudo, Buglosso, Borragine, Hyoscyamo, Tabaco &c.

8. Flos vniformis margine superiore vel integro est, vel in lacinias

fisfo;

Integro, vt in Convoluulis; Fiffo, vt in Buglosso, Tabaco.

9. Si profundae sint fissurae, saepe compositum florem simulat, sed discernitur ab eo, quod totus decidit, vti flores Borraginis, Buglossi, Sambuci, Cyclaminis.

13. Fieri potest, vt flos simplex scissus, sensim auda figura in com-

positum degeneret.

II. Fissi flores vel numero laciniarum differunt, vel figura.

12. Numero, vt tribus laciniis fissi sunt pauciores, vt in Casia Poëtica, Phalangio Virginiano, Sedo-aquatico:

Quatuor laciniis plures secti sunt, vt flores Leucoii, Brassiacae,

Rapistri;

Quinque & sex laciniis distinctum marginem habet maior sto-

An e quatuor, quinque, sex foliis compositi?

13. Ob figuram laciniae funt vel angulo terminatae vel rotundae.

14. Angulo terminatae vel acutae, vt in Borragine; vel obtusae, vt in Hyoscyamo.

15. Rotundae vel fimpliciter conuexae, vt in Buglossa; vel finuatae, vt in Primula veris, Cisto; vel fissae, vt in Alsine.

16. Porro flos vniformis tunica est vel vniformiter tereti, vel pli-

cis aut striis variata.

17. Plicis, vt flos Conuoluoli; striis, vt in Campanula.

18. Plicae porro vel angulofae funt, vt in Conuoluolo; vel rotundae, vt in aliis,

CAPVT

#### CAPVT XVII.ov . eng left

Flos simplex disformis §. 1. 2.

Fistulatus 3. 6, 13. 14. Semifistularis 3.

- Labiatus 4. Labio.

I. Vno, inferiore 6. p. fuperiore 6. f.

Vtroque 7.

II. 8. Superiore repando 9. Idicitur galeatus, cucullatus, galericulatus.

III. n. Integro

Scisso in lacinias I. Conuexas

Repandas tres 12.

II. Sinuofas Angulatas

Corniculatus 13.

Aliter difformis 2. Considerandae enim & aliae partes 14. Alae Cristae

Brachia Fimbriae

Plane singularis 15.

Partes habet peculiares labiatus, labia.

galeatus, galeam 10. corniculatus, corniculum 13.

alias, alas, cristas &c. 14.

Ţ,

I los simplex difformis est, qui vnius tantum dimensionis terminos inter se similes habet, h. e. cuius non superiora tantum ab inferioribus, sed & anteriora a posticis discrepant, vti sunt: Lamii, Marrubii, Saluiae.

2. Flos simplex difformis est vel semissifularis, vel labiatus, vel

corniculatus, vel aliter difformis.

3. Semififularis est, qui fistula superius oblique resecta constat, ve in Aristolochia, item in simplicibus sloribus, ex quibus capitulum Cardui chrysanthemi constat.

4. Labiatus est, cuius fistulae superior pars in labia quasi ter-

D3

minatur.

5. Labiatus flos vel vno labio constat, vel duobus.

6. Qui

6. Qui vno, vel inferiore siue exteriore tantum praeditus est, ve in Chamaepity altera Dodonaei, siue Chamaedry laciniata Lobelii; Teucrio vero tam communi, quam Baetico: (Teucrium prateuse non est Teucrium, sed Veronicis potius annumerandum.)

vel superiore, fine interiore tantum labio constat, vt in Acan-

tho fatiuo.

- 7. Vtroque labio constat maior pars florum labiatorum, vt in Lamio, Saluia, Napello, Delphinio &c.
- 8. Deinde labium superius sine interius vel repandum est, vel deorsum restexum, sine connexum.
- 9. Repandum, fiue sursum restexum est, quod conuexam faciem, siue superficiem alteri labio obuertit, vt in Chamaecisso, Lamio tertio Pannonico Clusii; item in Lamio primo Pannonico Clusii, h.e. Lamio melissisolio Casparis Bauhini.
- 10. Labium deorsum reflexum, hoc est: cauitatem inferiori siue exteriori labio obuertens frequentius est; vnde labium huiusmodi galea, cucullus, galericulus, & flos ipse galeatus, cucullatus & galericulatus dicitur.
- 11. Tertio labium aliud integrum est, aliud scissum in lacinias, easque vel conuexas, vel sinuosas, vel angulatas.
- 12. Labium Acanthi in tres conuexas (repandas an potius, considerandum ponit margo A.) scissum est.
- 13. Corniculatus flos est flos cauus, qui partem aliquam corniculo similem superiori parti sistulae suae annexam habet, h. e. cauam & rotundam partem, quae in cuspidem non peruiam definit, vt in Linaria, tam communi, quam valentina, in Delphinio siue slore regio, in Impatiente, in Balsamina faemina.
- 14. Sunt & aliae partes fistulatorum difformium florum, vt alae, cristae, brachia, fimbriae, cirri, quae in Delphiniis, Orchibus, Satyriis, Aconitis porro considerandae sunt.
- 15. Inter difformes simplices plane singularis est, qui Calceolus Mariae dicitur.

#### CAPVT XVIII.

Flos compositus

fecundum quid 2. ex foliis quafi planis 4.
figura ac fitu fimilibus 3. tribus 5.
quatuor 6.

diuersis 7.

foliis & corniculis 8. calice 9.

absolute ex flosculis cap. XIX.

r.

Plos compositus alius secundum quid, alius absolute compositus est.

2. Flos secundum quid compositus est, qui folium, siue ambitum tantum habet compositum, ideoque saepe a flore simplici laciniato non ita prompte discernitur.

3. Flos fecundum quid compositus,

Vel ex meris planis foliis, figura ac fitu similibus (simillimis habet B,) est compositus, vti flos Tulipae, Llii, Rosae simplicis side non plenae, siue syluestris; Alsines, Leucoii, Rapistri.

4. Folia plana hic voco, quae non sunt fistulosa, aut concaua, plerumque autem folia haec plana non nibil cauata sunt; saepe extror-

sum reflexa.

5. Foliis tribus constant flores Plantaginis aquaticae, Morsus ranae.

Confer fissos flores c. 14. (XVI,12.)

- 6. Foliis quatuor, flores Rapistri, Violae matronalis, Chamaedryos syluestris, siue Teucrii pratensis, Teucrii quarti Clusii, Veronicae fruticaulis Clusii.
- 7. Ex foliis planis, meris, sed figura ac situ diuersis compositus est, slos vt Iridum, Gladioli, Genistae, Arboris Iudae, Pisorum, aliorum, que leguminum.

Item in vmbelliferis plantis, saepe exteriora folia storum interio-

ribus maiora.

8. Ex foliis quasi planis, & corniculis, vt in Aquilegia, Consolida regali siue Delphinio, Nasturtio Indico, Aconito corniculato, &c.

9. Ex foliis quasi planis, & calice, vt: Narcissi.

# CAPVT XIX.

Flos absolute, i. e. ex flosculis compositus est vel discus 9. f. I. ex flosculis 2. perianthio vestitis 5. nudis 6.

II. Radiatus, foliis marginalibus 9. p. 10.
planis, 11. frontatis, quafi parallelogrammis 12.
cufpidatis 13.

nudus (nudo margine) 8.
capitulum oblongius cap. XX, 1-12.
Spica compressior cap. XX, 13.

1.

Los absolute compositus est, qui ex pluribus stosculis est compositus.

2. Ex flosculis, inquam, qui non tantum folio, siue bractea colorata, verum etiam vel staminibus, vel stylo saltem constant, ut singuli

fingulis fere seminibus cohaereant.

3. Flos absolute compositus vel Discus est,

vel capitulum oblongum, vel fpica compressior.

4. Discus vel ex nudis siue solis flosculis constat, vel ex flosculis perianthio vestitis.

5. Ex vestitis flosculis constans discus non, nisi in Scabiosis, (complectimur sub his etiam Succisam sine Admorsam) quod sciam hactenus est repertus.

6. Ex nudis flosculis reliquorum disci fere omnes.

7. Deinde discus vel nudus est, vel radiatus.

8. Discus nudus, vt in Tanaceto, Abrotano fœmina.

9. Discus radiatus, cuius exteriora folia, quae marginem quasi floris constituunt, prolixiora, & dispersiora sunt reliquis, quae discum efformant. Discus enim est, quod ex slosculis pluribus compressis & confertis ita componitur, ve vnam quasi apparentem superficiem constituat.

10. Margo ille constat foliis vel quasi planis vel concauis.

11. Folia quasi plana marginis, sunt vel frontata & quasi parallelogramma, vel cuspidata.

12. Frontata vel sunt integra; vel crenata fronte, vt in Chrysantemo latifolio Dodonaei.

13. Folia

13. Folia marginalia plana, cuspidata, vt in Ptarmica Austriaca Clu-

fii; Asterè primo Clusii.

14. Folia marginalia concaua, vt in Cyano, Staebe Salamantica se-

# CAPVT XX.

Capitulum oblongius, fiue flos natura (fiue fecundum speciem) plenus 1.2. ex flosculis, foliaceus, planis 4-6.

fistularis, fistularibus solis 10. similibus

dissimilibus 2.

& planis marginalibus flosculis 11. 2. foliis 12.

Partes capituli verae, flosculi meditullii,

plani 5. & horum stilus 5. frons 6.

fistulares 8. & horum pediculus, crater, stilus, stilicornua, ligula, seu sistula stili.

Spica arcte compressa 13.

I.

Capitulum oblongius etiam flos natura plenus, siue secundum speciem plenus dici potest, h. e. qui (annon? cuius meditullium) ex eiusdem sigurae slosculis constat.

- 2. Dico flosculis eiusdem figurae constare meditullium capituli, excludens nimirum marginales, vt in Cyano maiore marginales flosculi duplo longiores sunt, interioribus & caerulei & (a) concaui, cum interiores purpurei, & stamina in fistulam coalita, & intra eam fistulam stilum contineant.
  - (a) vide Monend. n. XXV, 6.

3. Estque vel foliaceus, vel fistularis.

4. Foliaceus, siue planifolius est, qui ex flosculis quasi planis, in

aliquot gyros dispositis confarctus est.

5. Flosculi hi plerumque sunt folia oblonga, frontata, stilo bicorni assixa, singulis seminibus insidentia; ita, vt interiora exterioribus semper sint breuiora.

6. Frons autem horum foliolorum plerumque crenata est, ve in Taraxico, Sonchis, Cichoreis, Hieraciis, Scorzonera, Tragopogone.

7. Fiftularis flos natura plenus est, qui ex pluribus concauis flosculis similibus, siue eiusdem figurae, siue similiter figuratis constipatus est.

8. Flosculi illi, qui perperam a nonnullis stamina dicuntur, (b) inferiori parte in prolixum, candidum quasi pediculum definunt, quo seminibus fingulis cohaerent, habentque plerumque oram supremam, sine craterem, in lacinias aliquot sectum; E singulis quoque prominet stilus aliquis, (bisidus plerumque) qui peculiari sistula colorata, quam ligulam quidam vocant, vsque ad apicem, fiue cornua vestitus est,

(b) fupra XV, 6.

- 9 Fistularis flos, sine fistulaceum capitulum, vel solis concauis, sine fistularibus flosculis constat, vel insuper marginalibus.
- 10. Ex solis fistularibus; ita florent jaceae, & Cardui plerique, ve Lanceolatus; item Petafites.
- II. Simul & discum, sine meditullium ex fistularibus, & marginem ex planis foliolis (annon? Flosculis? ita enim § 9. postulat, etiam § 4. item 2. adstipulantibus) compositum habent, vt Carlina, tam humilis, quam cauligera, item Carlina filuestris, item Chamaeleon albus.
- 12. Reliqui marginalia folia habent plana, vt Iacobaea, Virga aurea, Helenium, Calendula. Num. ii. & 12. Si marginalia folia, qui flosculi non fint, nulli inueniuntur, vt de Iacobaea Schedae auctoris iam observarunt, facile emendaueris ita: 11. Reliqui marginalia folia habent plana, h. e. Simul & discum sive medicullium ex fistularibus, & marginem ex planis fiosculis com-12. Vt Carlina &c. usque ad-albus. Item Iacobaea &c. positum habent. usque ad Calendula.
- 13. Spica arcte compressa etiam flori absolute composito accenseri potest, qualis est in Bistorta.

# CAPVT XXL

DE FLORE PER ACCIDENS PLENO SEV MVLTIPLICE Flos multiplex, fiue per accidens plenus fieri

nequit ex quibusdam 4. Nudis floribus Labiatis floribus

Leguminaribus, I. Multiplicans floris non absolute compositi laminam 2. Fistulatam

Corniculatam. Calycaram

Foliorum ambitum 3 absolute compositi folia marginalia, fistularia bus disci obliteratis 4.

II. Habet interiora communiter minora peculiariter non minora 7.

III. Caulem qui floris vmbilicum non transit,

transit. Proliger 6.

τ.

Flos per accidens plenus est, cujus pars soliacea ob culturam, vbertatem soli, aliudue accidens multiplicata, vnde flos vel duplex, vel triplex, vel saepius multiplex, respectu naturalis sine simplicis floris dicitur. (\*)

Quod si lamina vnica flos non plenus (annon? aut pars eius) constet, in pleno lamina aliquoties iterata est, ita, vt prima secundam, secunda

tertiam, includat; vti fit in floribus

vel Fistulatis, vt Stramoniae,

vel Corniculatis, vt Aquilegiae.

vel Calicatis, vt Narcissi;

2. Sin ex pluribus foliis compositus sit storis ambitus, gyri foliorum repetuntur, vt in Rosa, Ranunculo, Anemone, Papauere, Caryophyllo, Leucoio, Paeonia, Colchico, Croco, Caltha, Melanthio.

3. Si discisormes stores siant pleni, solia quali plana, siue Marginalia multiplicata expellunt quasi, & obliterant stores sistulares medii disci siue Vmbonis, atque ita similes reddantur hi stores storibus mere Foliaceis, ve in Matricaria, Calendula.

#### THEOREMA.

4. Quidam flores ad plenitudinem cultura perduci nequeunt, vt: Tulipae, Lilia, Hyacinthi, Irides, qui omnes funt nudi flores. Item Labiati flores, item Leguminares. (\*\*)

5. Flos proliger dicitur, vbi Caulis umbiculum floris transit, & alium florem minorem gerit, vt in Ranunculis, Calendulis, Leucoiis; (\*\*\*)

Plantago alio sensu prolifera dicitur.

6. Melanthium plenissorum hoc peculiare habet, quod interiora, siue superiora Folia non sunt minora, aut breuiora, exterioribus siue inferioribus.

(\*) Hosce flores recentiores monstrosos dici malunt. Linnaens Fundament. botan. IX. 309. VI.121. Royen Flor. Leyd. Prodr. qui peculiarem inde hortum constituit.

(\*\*) Habemus tamen exemplum in Genista Hispan, iunc. flor. luteo, pleno. De Tulipis, Liliis, etiam aliis aliud docer experientia recentior.

(\*\*\*) Scabiosam etiam peregrinam, capitulo oblongo, variegalo H. R. P. aluimus proliferam in nostro hortulo, hoc ipso anno.

# CAPVT XXII.

De Staminibus floris.

Floris partes interiores 1. 18 of the and that the

STAMINA,

Vere talia, quae funt I. ratione partium Pediculo Libero 3. I. tereti 5. I. tenui

crassiusculo.

II. Recto

curuo, latente fc. in labio floris vnifolii fuperiore 6. f. compositi inferiore 7.

III. 8. Glabro Hirfuto 8. IV. 10. Simplice 10.

Ramofo

Latiusculo 4. f.

II. Infistente floris foliosae parti 3. 21. p. Fructus rudimento 21.. f.

Annexo ad floris ambitum I. (23. 2. f.) Imum.

Medium.

II. Se toto 3. p. denticulis inter capitula 3. f. Sui parte 21. m.

Capitulo I. croceo

nigricante 7. &c.

II. aptato ad pediculum longitudinis parte (18.) media

quali media extrema.

Situ transuerso angulis 17. p. rectis

directo 19. p.

libero constituente fistulam stili cum re-

liquis 19.m.

in Simplicibus

Compositis Capitulatis 19. Discifloris 19. f.

magnitudinis Æqualia 9.p. Inaequalia 9. f.

III.

ratione numeri

ratione

Foliis (11.) paria, quinque 13. imparia, multipla, dupla, octona 12.

pluries quam tripla flos staminosus 16.

Submultipla. Subdupla. Tria 15. (19) 21 Subtripla. Tria 14.

Staminum vicarium Foliolum stilum inuoluens 20.

STILVS cap. XXIII.

1. Re-

Restant partes floris interiores, Stamina (\*) scilicet & Stilus.

2. Stamina pediculo constant & capitulo.

3. Pediculi Staminum liberi plerumque sunt, & ima tantum sui extremitate folioso ambitui floris adnati: (a)

(a) Repeirtur hoc 21. p.

Interdum toti eidem affixi fiue cohaerentes, vt in Symphyto maiore, Lithospermo, Polygonato;

Et dum Denticuli quidam albidi luteis stamiuum Capitulis quan-

doque interponuntur, vt in Symphyto maiore. (b)

(b) Sequantur ex §. 21. cetera: vel parte aliqua &c. vsque ad finem.

4. Pediculi Staminum liberi plerumque teretes sunt, Raro latiusculi, vt in Ornithogalo albo maiore.

5. Pediculus teres vel tenuis vel crassiusculus est.

6. Pediculus item alius rectus,

alius curuus, vt in Labiatis floribus.

Latent enim Stamina in labiis florum Labiatorum, ideoque curnitatem eorum imitantur,

Et in superiore quidem labio latent, si flores sint Labiati vni-

folii, siue incompositi, vt in Saluia, Lamio, Sclarea.

7. In inferiore autem labio latent, si flos sit Labiatus compositus, h. e. Leguminaris, vt in Piso, Faba, Galega, Colutea tam Vesicaria, quam Scorpioide, Arbore Iudae.

8. Staminum pediculi porro plerumque glabri sunt;

Interdum birsuti, vt in Blattaria.

9. Stamina fere inter se aequalia sunt; Interdum inaequalia, vt in Napello, Colutea-Scorpioide.

10. Staminum pediculi fere semper simplices sunt;

In Lauro ramosi.

11. Staminum numerus plerumque foliis aut laciniis ambitus respondet, ita vt vel aequalis sit, vel multiplus, vel submultiplus.

12. In Rutae flore quaterna folia, octona stamina:

13. In Ceruicariae flore campaniformi quinque laciniae, fiue cuspides, intus in fundo quina stamina.

· (\*) De staminibus conf recentiores, Pontederam in Anthologia Libr. I. c. 28 seqq. Ludwigium in Institut. regn. vegetab. P. I. c. 2. p. 3. P. II. c. 6. §. 468. p. 193. seq. Item Linnaeum in Methodo sexuali s. Gener. plant.

E 3

14. In Iride ter tria sunt folia, tria item stamina: conf. XXIII. 8.

15. In Gladiolo Italico terna stamina, folia sena, quorum terna sibi inuicem similia.

16. Staminosus Flos dicitur, qui stamina habet copiosa, qualis est in Fragaria, Ranunculo, Cappare.

17. Capitula staminum fere crocea funt,

Interdum nigricantia, vt in Borragine, Tulipa.

18. Eadem vel ex medio longitudinis suae aptata sunt pediculo suo, vel quasi medio,

rarius extremo, vt in Tulipis, Iridibus.

19. Staminum capitula plerumque ita sita sunt, vt longitudo cuiusque ad longitudinem pediculi sui sit transuersa, h. e. angulos cum ea vel rectos vel obliquos constituat.

20. Est & vbi longitudo capituli, longitudini pediculi directim

quasi sita est, vt in Tulipis.

21. Imo sunt flores in quibus staminum capitula pediculis directim sita lateribus inter se coëunt, vt fistulam quandam constituant, in qua stilus ita includatur, vt extima tantum parte promineat,

vt in Borragine, Solano, Dulcamara:

Denique in omnibus flosculis capitula florea constituentibus, vt in Eupatorio vulgari, siue Cunigundina prima Tabernaemontani, Eupatorio aquatico tam perfoliato, quam Verbenisolio, Agerato, Centaurio maiore, Scabiosis, Cyanis, Iaceis, Stoebis, Carduis;

Item in flosculis discos floreos constituentibus, vt in Flore So-

lis, Enula siue Helenio, Ptarmica, Millefolio, Tanaceto, Absinthio,

22. Interdum loco staminum est foliolum aliquod oblongum fronte in aliquot quasi staminum petiolos scissa, quod complicatum sistulae instar, stilum inuoluit.

Tale foliolum, staminum vices gerens, later in inferiore, siue

carinato labio floris Galegae.

23. Staminum petioli vel ima extremitate sua cohaerent fundo floris,

Vel parte, aliqua sui interiori superficiei foliosae parti sunt an-

nexi, vt in Digitali, & Lamiis nonnullis.

Quidam etiam protuberanti fructus rudimento, diuerfa eius altitudine, infiftunt, vt in Ranunculis, Anemonis, item Maluis aliquo modo.

CAPVT

# CAPVT XXIII

De stilo floris.

Vere talis 9. 1. 9. Etymologia 1. f. Sedes 3. alia quam Foliorum 2. p. Staminum 2: 16

I. Est flori vnus 4. p. Sunt plures. bini g. terni 6. quini 7.

II. Terminatur 9. cuspide 10. p. cono lo. m. globulo 10. f.

> cornibus II. Breuibus II. p. prolixis II. f. plurium specie 12. p.

duorum 12. f.

II. Binis 13. p. conf. 18. p.

rectis

crassiusculis 14. f.

Inaequalibus 19. f.

quaternis 13. f.

IV. Aequalibus.

ternis 13. m. conf. 21. f. 18. f.

recuruis 15. 20.

III. Figura vulgari fingulari . breuis ac crassus, · aliter, maluae, modiolus.

IV. Bifidus 18. p. conf. 13. p. III. Subtilibus 14. p. i. e. ligulis trifidus 19. f. conf. 21. f. 13. m.

Stili fuccedaneum folia 8. p.

orbiculus radiofus 8. m. oblongius 8.f.

crista 21. p.

purpurea 21. f. breuicula 21. m.

Cilus est pars floris medium eius occupans, & rudimento fructus, aut seminis inhaerens; (\*)

Dicitur stilus, quia in longitudinem tenuem plerumque extenditur.

2. Foliosa pars floris modo apici, modo sedi fructus, seminisue inhaeret: Stamina vel imo, vel medio foliosae.

3. Stilus semper apici fructus, seminisue cohaeret, ideoque reliquis floris partibus defluentibus in planta remanet.

4. Stilus plerumque vnicus adest, saepe plures,

5. Et bini,

6. Terni, in gramine Leucanthemo, item in Sanguisorba;

(\*) Conf. praeter laudatos in anteriori capite autores Marc. Malpighium in Anatom. plantar. p. m. 62. seqq.

7. Quini

7. Quini in Aquilegia, nam & rudimentum fructus in quinas maturatur filiquas.

8. Flores nonnulli silo carent,

vel succedaneum eius aliquod obtinent, vt in Iride loco stili sunt tria interna folia eresta, sub quibus stamina occultantur. conf. XXII. 14.

In Papauere est orbiculus radiis quibusdam decussatus, in latitudinem magis quam longitudinem extensus in Papauere Spinoso. conf. §. 21.

9. Stilus proprie diclus terminatur vel Cuspide, vel Globulo, vel

Cono, vel Cornibus.

10. Cuspide, vt in digitali, Symphyto maiore; Cono, vt in Liliis nonnullis; Globulo, vt in Conueluulo peregrino, purpureo.

II. Cornua vel breuia funt vel prolixa:

Breuia, vt in Conuoluuli vulgaris campaniformi flore,

Prolixa, vt in Eupatorio vulgari.

12. Interdum adeo prolixa vt plures adesse videantur stili.
Ita duo stili in Staphylodendro, siue Pistacio syluestri.

13. Cornua vel bina, vt in Cichorio; vel terna, vt in Ceruicaria; vel quod rarius, quaterna, vt in Lysimachia Virginiana.

14. Cornua stili vel subtilia sunt, vt plerumque, vel crassiuscula, vt in Conuoluulo vulgari campanisero, Lysimachia Virginiana.

15. Cornua subtilia, quae etiam ligulae dicuntur, interdum recta, Saepius reflexa siue recurua sunt, vt in Cichorio, Ceruicaria.

16. Stilus interdum ita crassus, ac breuis est, vt nomen aliud videatur requiri, vt in Nymphaea ac Tulipis.

17. Stilus quoque in Malua a vulgari forma discrepat, ideoque

modiolus dicitur.

18. Bifidus stilus in Saluia, Othonna: Trifidus in Croco, Dente canino, Ceruicaria.

19. Cornua si li plerumque aequalia sunt, Interdum inaequalis longitudinis, vt in Saluia, & Aethiopide.

20. Cornua stili sa pe sunt reflexa, vt in Ceruicaria.

21. Loco stili quandoque crista semini inhaerens, ve in Scabiosa; In Papauere spinoso crista purpurea breuicula;

In

In Sanguisorba crista purpurea, vel tres stili purpurei trisidi, latentes inter purpureos staminum petiolos.

#### CAPVT XXIV.

De situ floris respectu caulis.

SITV r. ratione CAVLIS 2. est

flos I. solitarius 3. adhaerens cauli 6.

sigillatim 7.

sociatim 8. in eadem distinctione bini 8. p.

coacernatus 4.

vere caulem aut ramum

feni 8. f.

extremum terminans spica

corolla 4. m.

capitule oblongiore

medium cingens verticillo 4. f. apparenter, vmbella denfa 5.

II. Spectar partem caulis diversam a caeteris 9. p.

eandem cum caeteris simplicibus 9. m. galericulatis 9. m.

de bie o mierr absolute composi-

FRVCTVS cap. XXV.

T.

Hactenus florum differentiae secundum partes sloris sunt expositae; sequentur eae, quae a situ floris desumuntur, qui duplex est, alius respectu caulis, alius respectu fructus.

2. Caulis respectu flos aut solitarius est, aut coacernatus.

3. Solitarius est qui, ita, in caule dispositus est, ve alium proxime non tangat;

4. Coacernatus qui vel in spicam,

vel verticillum,

vel corollam, vt in Meliloto vulgari.

F

vel discum,

vel oblongius capitulum dispositus est, atque

ita caulem & ramulos caulis terminat,

vel etiam in verticillum circa medias rami,

& furculorum partes.

s.Ad

5. Ad coaceruatum florem etiam referri potest vmbella densa, qualis est, v. g. in Draba, siue Thlaspi cretico.

6. Solitarius flos aut figillatim, aut sociatim cauli adhaeret.

7. Sigillatim, si vnus ex vna caulis, aut rami distinctione prodeat.

8. Socialiter, fi aut bini, vt in multis;

aut tergemini, vt in Sagittali,

aut seni, vt in Fœniculo aquatico, siue Viola

A britished & the 1820

aquatili.

9. Porro caulis respectu flores plerumque in diuersas caulis par-

tes, siue plagas spectant;

Nonnunquam in vnum latus, siue plagam caulis vergunt, vt slores in Digitali; item biiugi slores in Pseudolysimachia galericulata, item capitulo siue disco slorum in Absinthio vulgari.

#### CAPVT XXV.

De fitu floris respectu fructus.

\$ITV, FLOS FRVCTVS 1.

femini nudo, quidam fimplex 2. p.

omnis flosculus 2. m. capituli

Pericarpio 2. f.
Sedi cohaeret, quidam simplex 3. p.
omnis leguminum 3. m.

Pappus non fit 4.

1 1717 31 10 短月

ï.

Respectu fructus aut rudimenti fructus ssos aut insidet summo fructui, aut sedi fructus cohaeret.

2. Qui summo fructui insidet, aut nudo semini insidet, vt in store Valerianae, item in omnibus stosculis capitulum aut discum constituentibus:

Aut pericarpio siue folliculo siue vasculo seminis, vt in Cucurbita, Cucumere, Melopepone, Bryonia, Periclymeno, Aristolochia, Onagra siue Pseudolysimachia siliquosa, Ligustro, Rosa, Rubo, Ceraso, Malo, Pyro.

3. Flos

3. Flos sedi fructus haeret, ideoque fructus rudimentum quasi includit, in Solanis, Dulcamara, Capfico, Geraniis, Chelidonio maiore, Cassia fistulari; Leguminibus & Siliquosis omnibus, excepta Onagra, Lychnidibus, Ocymoide, Nigella, Ranunculo, Nymphæa, Malua, Papauere vulgari & Corniculato, Vite, Arbuto, Tulipa.

4. Flores dicuntur in pappum mutari, sed reuera nullus flos in pappum mutatur, sed pappus inhaeret apici fructus, cui & flos inhaeret, flore autem fensim marcescente, arescente, defluente, fructus cum pappo suo crescit, atque ita pappus, qui ante flore tegebatur, conspe-

dior redditur.

Ita pappus ex flore fit, ficut ex pomeridiano tempore vespera.

## STALL SO THE STATE OF A POVETE XXVI TO LOND OF SELECTION

Definitur i les noivemn de le année de le le sur les des les de l fuccedit flori, inchoatione, perfectione, defluxione 2. p. separatur 2. f. perfectione mile medier do del trett these aliae partes corruptione.

L Est vel semen

feminis conceptaculum 4.

Ei tegendo 4. 5. m. & tuendo 5. f. natum vasculum. folliculus AL THE TYPAD capfula theca PARS SEWINES

inuolucrum.

Non; vt apertum labiatorum perianthium, tantum id retinens s. p. II. Gignitur I. ad vnum florem 6. p. vnus chalde rando plures. I AC. A

II. (6.f.) fub flore intra florem.

Fructus dicitur pars plantae annua, flori cohaerens & fuccedens, qui vbi maturuerit, id est, ad perfectionem suam peruenerit, sponte a planta abscedit, & terra, aliane commoda nutrice exceptus nouae plantae fit initium. (\*)

(\*) Conf. Ludwigii Institut. regni vegetab. p. 44. seqq. & 201. Inc. Loyan experimenta de plantar. generatione. Cl. Plaz. de plantar feminibus. Linnaei fundamenta botan. V. Illustr. Wolff. von Würkungen der Natur cap. XII. 6. 407. Idem, von denen Theilen der Pflanzen cap. VII. 6. 260. leqq. Marc. Malpighium 1. c. p. 71. leqq. De differentiis autem Fructicistas omnes à Linnao p. 127. Biblioth. botanic. enumeratos. J. Me.

2. Succedere dicitur flori fructus; quod floris inchoatio, perfectio, defluxio, fructus inchoationem, perfectionem, defluxionem antecedat.

Fructus igitur a reliquis plantae annuae partibus differt, quod cum primum absolutus est, siue ad perfectionem deuenit, pars esse desinit, cum reliquae (vti folia, flores, & in nonnullis surculi vel etiam integri stipites) tum demum vbi marcescere, putrescere, aliterue corrumpi incipiunt a planta sua separentur.

3 Fructus vel semen est, vel seminis conceptaculum, vasculum,

folliculus, capfula, theca, inuolucrum feminis.

4. Conceptaculum est, quod semini ad tempus vndique tegendo

peculiariter destinatum est.

5 Excluduntur igitur huius appellationis ambitu perianthia illa, in quibus, flore iam dilapso semina latitant, vti sit in Saluia, & aliis labiati floris plantis:

Nam nec vndique tegunt semina, cum superiori parte hient, neque peculiariter seminis tutelae seruiunt, sed slori potissimum muniendo destinata sunt.

6. Ad vnum florem fructus vel vnus vel plures gignitur, si vel sub vel intra florem vnum, vnus vel plures fructus gignantur.

Conf. XXII. 4. f.

#### CAPVT XXVII.

PARS SEMINIS.

Cuiuslibet I. Extremitas 2. interior sine inferior 3.

exterior sine superior.

II. COR I. in extremitate 2. interiore

II. inter

valuas duas 5.

Biualuis, valuae duae 5.

2, 11%

L

Cor feminis est portiuncula seminis, vnde tum radix, tum germen enascitur.

2. Cor seminis, vel in interiore siue inferiore, vel superiore, siue exteriore seminis extremitate situm est.

3. Interiorem voco, quae cauli, aut petiolo proxima.

4. Me-

4. Medulla seminis dicitur intima & similaris pars seminis, quae cortice vndique vestitur.

5. Semen biualue dicitur, quod in duas valuas, h. e. quasi dimidiatas partes quasi duo hemisphaeria diuiduum est, inter quas suturae plantae rudimentum saepe est conspicuum; vt in Piso, Faba, Dolicho. (\*)

## CAPVT XXVIII.

De plantarum FOECVNDITATE.

FOECVNDA natura I. ita credita nonnullis, omnis etiam excaulis 6. f.

pluribus, fola cauligera 7. m. non credita vulgo, deprehenía tamen, cauligera 7. m. excaulis 7. p.

II. Individuo quolihet
fexus tantum faeminei, i. e. femen ferentis fine flore 5.

STERILIS natura, vere talis quomodo agnoscenda 2.
opinione plurium, quae excaulis 6. p.
quorundam, nulla 6. f.
per accidens 3. ob ineptum locum seu clima
anni tempestatem

morbum floris luxuriam ortum non e femine fed tales 7. f. ramo 4. fexum masculum, i. e. florentem sine semine 5.

I.

Diantarum aliae natura foecundae, aliae natura steriles sunt.

2. Natura sterilis dicitur planta, quae semen serre natura non estapta, quod inde agnoscitur, si nullum certae speciei singulare in vllo loco semen serre deprehendatur;

3. Per accidens sterilis dicitur planta, si vel ob locum siue clima minus aptum, vel ob anni tempestatem, vel incommodum aut mor-F 3 bum,

(\*) Conf. Wolff. vom Gebrauch der Theile der Pflanzen cap. VII. §. 262. Cl. Ludwigii Instit. regn. vegerab. Part. II. Cap. VI. Sect. III. §. 523. seqq. Secundinas recentiores vocant cum Malpighio 1. c. 87. & Cotyledones plerumque constituum, in Methodo plantar. Jeb. Raii. p. 1.

#### 46 D. IOACH. IVNGII ISAGOGE PHYTOSCOPICA.

bum, aut floris (a) luxuriam, aut ortus sui modum semine destituatur.

- (a) Fog. Radicis adderem. v. de Colocas. Alpin. & de Sedo, quod Iouis barba.
- 4. Ob ortus sui modum sterilis est, vt Sabina e ramo sata.
- 5. Ob sexum sterilis planta dicitur, si ex eiusdem plantae semine diuersae plantae producantur, ita, vt aliae semen absque store, aliae slorem absque semine producant, quarum illae forminae, & foecundae, hae mares, & steriles appellantur.

Tales sunt in arborum genere, Palmae dactyliferae:

Inter herbas; Mercurialis, Phyllum, Lupulus & Sesamoides Clusii.

6. Steriles natura communiter feruntur, quae caule carent, vti sunt Filix tam ramosa, quam non ramosa, Phyllitis, Scolopendrium, Adiantum, & similes.

Quanquam sunt, qui & has in auersa foliorum parte semen producere perhibeant. (\*)

7. Hieronymus Tragus in Filice ramosa semen accurata observatione invenit: idem in Salice latifolia semen prolificum se reperisse testatur, quamuis Salix vel ideo etiam natura faecunda praesumi debebat, quia stipite non caret, qui semini potissimum ferendo destinatur, semine autem plerumque secundo destituitur, quia non e semine, sed e taleis prognata est,

Caesalp. I. 16. c. 2. de Filice.

In aduería parte furfuracea quaedam lanugo est, copiosior in tenellis. Nam procedente tempore decidit, renascique compertum est ex ea lanugine. Nam proiectis Filicibus vbi antea non fuerint, oritur copiose.

(\*) An globuli illi in dorsis foliorum reperiundi seminibus sint pleni, an farina genitali, dubitat adhuc *Linnaus* in Gener. Plantar. Class. XXIV. p. 320.

#### ISAGOGES PHYTOSCOPICAE FINIS.

# MONENDA VAGETIANA.

Í.

ytoscopicae huius Isagoges autographon haud occurrit, dictatam enim eam esse, non perscriptam ab auctore, multis indiciis sit verisimile. Videantur V, 2. 1. 8. IX, 8. 1. 2. XVII, 7. XVIII, 5. 7. 1. 2. Addatur perpetua auctoris emendatio litterarum initialium ex paruis in maiusculas, in herbarum nominibus, contra in aliis vocibus, per totum apographon A omnibus paginis conspicua. Denique dubitationem omnem tollit IV, 5. eriguntur. al enituntur, in A, 106, a, in B. 130, a, vbi autographa etiam est horum emendatio, in impressis spectanda.

2. A schedis ergo vbi praecepta haec discrepant, considerandum erit, an inter distandum emendata sit in his praeceptis scheda, an pro dubiis schedarum annotatis, huc destinata sint, quamuis pauciora, minus etiam determinata, certa tamen, saltem vsque dum observationibus confirmarentur, emen-

darenturue annotata caetera.

3. Apographa ab auctore recognita, emendata, aucta exstant tria, quae

litteris A, B, C, designare iam placuit.

Primum horum siue Ainter schedas Iungianas exhibet fascis (122.) foliis 193-124. diligentissime ab auctore ad ipsius palatum emendatum; & luculen-

tis additionibus autographis auctum.

4. Secundo (B.) exhiberi voluit auctor ipsum primum A cum emendationibus suis & adiectionibus. Idque caetera quidem pleraque feliciter est praestitum, at in annotationibus inserendis a loco cui destinatae erant illae, aut (nullo licet signo monstrante) debebantur, non semel est aberratum.

5. Vsus deinde auctor est secundo hoc (B.) vt lectu commodiori, vnde
1. Adiecta ipsius manu etiam huic sunt nonnulla, pauca etiam emendata, sed haud quaquam eadem, quae in A adhibita conspicitur, diligentia.

2. Describendum etiam hoc dedit auditoribus, quo factum est, vt quicquid est corrupti in apographo B, id in omnibus in vniuersum insequentibus haeserit, ipso etiam Bunkiano & Fogeliano, & editoris, mox memorandis.

Exhibetur apographon B, fascis Iungianarum (122.) foliis 125-161.

6. Tertium (C.) exhibere iam debuerat IIdi textum & annotationes; fed natum est illud corruptissimum omnium. Quare nec adiestum quicquam reperitur, nec mutatum (totupliciter scilicet austa emendandi molessia) praeterquam in vitima sola pagina. Sparsim hoc reperitur inter lungianas, fascis (122.) fol. 214. 262. 211. 223. 169 - 185.

Hactenus cura Isagoges Tungiana.

7. Locupletare Hagogen istam, & aliter digerere, appictis etiam iconibus partium descriptarum, instituit vir Clarifs. Christianus Bunkius Med. D. Reip. Hamb. Physicus, sed morte immatura rebus human s ereptus caeptum non perfecit.

3. Ini-

8. Initio ille ipfi Isagoge a se in quarta descriptae interiecit chartas solii integri sigura, & Isagoges quidem margini summam textus adscripsit chartis intersertis vero additamenta. Comprehenduntur haec inter schedas sungianas sasce (122.) sol. 224-274.

9. Aliis curis capita plura, libros etiam diuerfos Ifagoges fecit & praeceptorum Ifagoges cuique fua additamenta fubiecit, appictis etiam iconum, ea quae describuntur repraesentantium rudimentis. Conatum illum exhi-

bent schedae *Iungianae* fascis (122.) foliis integrae formae 265-355.

10. Quia vero radicum differentias nullas Isagoge complectitur, tertia Bunkii cura fuit, etiam illas conquirere. Huc quae spectabant in quarta perscripta exhibentur sch. Iung. fasce (122.) foliis 1-22.

Huc vsque cura Phytoscopiae Bunkiana.

II. Excepit Bunkianam diligentia Viri Clariss Mart. Fogel. Med. D. & tandem Gymn. Hamb. Log. et Metaph. P. P. Is ut dignum auctore splendorem, & persectionem absolutam, pro animi & ingenii nunquam satis laudata magnitudine, in omnibus eius scriptis concinnandis affectabat, ita manuscripti C (in quo scilicet nulla erat iactura) dissecti singula solia, singulis ex charta, cucullo insignitarum, meliore soliis integris mediis, ita agglutinauerat, vt mediae chartae apertura vtramque apographi faciem legenti exhiberet. Marginibus vero quos ita lucrabatur amplis, imagines rerum in textu descriptarum, natiuae quoque magnitudini respondentes, affigere sinistra, notas quae addendae viderentur, extra textum dextra instituit adscribere. Sed ad duo tantum solia perducta res conspicitur sascis sung. (122.) soliis 210. 211. 222. 223. Imaginum schedae exstant praeter affixas duas septem aliae soliis 215-221. quibus quo referendae viderentur, adscrips, coniectura tamen non voique mihi satisfaciente. Huic rei expetiuisse credi potest hortum Eichstetensem magno sane sibi comparatum.

12. Nouissima eius cura Matth. Paisenius & ipse Med. D. apographon aliquod procul dubio ex B. natum in schedarum solam anteriorem faciem descripsit, atque Doxoscopiarum Phys. Min. seruato more, summam quidem dextus ductis subrus rubris lineis, notauit; quae primariorum praeceptorum explicationi in textu videbantur inseruire, iis rubrica praesixi voces: SCHOLION. NOTA, I. II. &c. Adiecit etiam permulta ex Bunkianis n. 8.9. memoratis, multa consimiles in schedas congessit, deliberaturus vtique quorsum essentia, multa consimiles in schedas congessit, deliberaturus vtique quorsum essentia. Haec domo sua post Fogelii mortem asseruata, Vir Clariss. Michael Kirstenius Med. D. & in Gymn. Hamb. Mathem. Poess. & Physices P.P. paucis ante quam mortalitati subducebatur diebus cum plerisque aliis penes Fogelium ante, tum penes se reliquis schedis Iungianis bibliothecae

publicae intulit. Suntque fascis 167. folia 1 - 186.

13. Succedunt eodem fasce (167.) foliis 187 - 2:4. (sequentibus etiam pro alia materia inanibus foliis vsque ad 276.) Phytoscopica in libros digesta duos, primum quidem de plantis folii simplicis, partium quatuor, vt prima excaules habeat, secunda nudicaules; ast ex cauligeris tertia sigillatim, quarta conjugatim germinantes: Secundum de plantis foliaturae compositae. Credo historiae plantarum schedas Iungianas, Bunkianas, suas hoc ordine digerere

voluit

voluit Fog. & ci operi Hagogen praefigere, quod institutum, si vita diuturnior & plusculum otii obtigisset, Viro excitatissimae industriae, & peritiae rerum harum locupletissimae, inque schedis istis per tot annos familiarissimo non potuisset longam moram nectere. Tantum etiam de Phytoscopicis Fogelii & Paisenii conatibus.

14. Botanicorum (inter schedas Iungianas nouissime in bibliothecam publicam, vt n. 12. diximus, translatas) fasces lustrandi restant integri 20, numero 235 - 254. Sparsa eiusdem generis etiam per fasces alios sunt multa.

15. Cum ergo & Fogelius antequam caepta egregia perficeret, morte bonis omnibus & veri amantibus dolenda fit raptus, in tanta schedarum lungianarum mole coaptandi studium ita moderandum tandem aliquando est vifum, vt a blattarum arbitrio & mille cafuum, folutis fchedis imminentium periculo ante omnia viri labores erepti vsibus publicis quantocius ipsius auctoris nomine, si nequeunt quo obtabatur, saltem quo possunt, eo exhibeantur ordine.

16. Quare numeris placuit notare Iungianos fasces & fascium schedas omnes, fiti illi, fitae haec inueniuntur, ita enim facile erit, quicunque probabilis videtur ordo, eum numeris istis exigua in charta notare, & si morte praeuentus aliquis alteri inchoati quid relinquit, numeri in charta confignati certe manent, potestque suum ordinem suis numeris quilibet alius itidem in charta notare.

17. Placuit deinde inscriptiones manipulorum in libellum describere, vt vbi, quae cognatae materiae funt, inueniri queant etiam quietis schedis, di-Ipicere liceat, ne ante, vfu crebro conterantur illae aut lacerentur, quam edi

possunt.

18. Haec vero dum fiunt, interea consultissimum visum est, quae Iungius ipse concinnauit compendia, & iuuentuti putauit apta, ea, vt relicta ab ipfius manu funt, ita in lucem emittere. Praecessit paucis retro hebdomadi-

bus harmonica. Sequitur nunc Isagoge Phytoscopica.

- 19. Expressa vero est ea ad apographon A, & ad autographa caeteris, B, scilicet & C, adiecta additamenta. Fogelianne prioris curae (vid. n. 15.) quia per pauca reperiebantur ad III. & IV. caput pertinentia, & vbi tam multa restabant agenda, eriam acta saepius agendi relinqui non debebat occasio; non ea tantum adiecta funt, minore tamen litterarum charactere; sed per duo illa capita, (relicto tantisper editionis tenore,) quae Fogelius voluerat definita maiusculis sunt expressa, obliquum v. characterem solis his verbis ille chartarum d. l. tribuerat III. 2. Superior. Supina. 12. Circumscriptio folii, 13. Pediculus. 15. Costa. 27. Ala foliorum. 29. Ramastrum.
  - 20. Reliquam varietatem litterarum quod attinet,

I. IVNGIANA, FOGELIANA, editoris, ita, vt hic vides, perpetivo dignosces, the pione no a tilis franci

2. Herbarum omnium maiusculae initiales Iungiana sunt ab emendatione in A. aut B. ex cognominibustvero non nisi a propriis nominibus denominantium: caeteris locis omnibus ex maiusculis etiam studiose minuscu-

Iis ille fecit initiales, continuationis tamen lineolis denominatiua ad nomina fua annexuit.

Virgulas enim distinctiuas particularum quidem simplices, ablatiuorum autem primae circumslexus vt vocant, studiose *lungius* effectavit, nimirum, ne rudioribus quidem aberrandi occasionem, quae tolli posset, vsquam relicturus, esset quod raro observatum a nobis est, ne molestia

in re non maioris momenti, typothetae crearetur nimia.

21. Quicquid ab his diuersum occurrit, id recensitori imputandum est. Is obliquis litreris definita: maiusculis initialibus textus summam voluit exhibere prompte inueniendam, solo cap. V. maiusculis totas voces; Rarissime nec nisi in theorematis, textus summam obliqua scriptura expressit. Cum enim definita hic occurrant prolixa, dum loco definitionum sunt exhibitiones sensibus factae, nec maiusculae tot vacarent typothetae quae tam multis exscribendis sufficerent, summa textus obliquis notari, quippe ad definita significanda destinatis, non poterat.

N. Definita illa saepe concinanda sunt ex diversis paragraphis vt XX, 5. (stosculi hi) sc. foliacci floris, §. 4. (plani) constituunt definitum (flosculi

plani floris foliacei.)

22. Versum initia in A reperta numeris ille, signauit; factis tamen aliis etiam initiis vbi continuatio erat prolixior cognitionem legentium putauit auuandam. Capitum numeri sunt auctoris in A vsque ad XIII. XIV. quod est eius 1-3. erat pars XIIIrii caetera fuerant caput XXIV. caput XV, pars fuerat postrema capitis XIII. Vnde editorum capitum numerus inde a XV. ad XXV, binario, in sequentibus vnitate maior est quam in Mtis. Mutationem hanc auctoris consilio congruere, schedarum (122) folium 113, a. docere potest. Post impressi n. XIIItii sinem, caput ordiri voluit post XIV. 3. caput XXIV. subiungi & deinde nouum caput incipere: id quod lineis distinctiuis capitum vtrobique, de priore etiam litteris CAP. margini adscriptis reliquit indicatum.

23. In orthographia nusquam a manu auctoris animus fuit abire. Hinc initio inuenies: caepa, post: cepa. Kõzes quis ignorat? H autem esse Elongum argumentis certissimum est omnino sufficientibus. Quis tamen vetabit humani arbitratus libertatem respicere aliquando aut requirere, aut possibilem credere scaturiginem vocis aliam? Iucundum est etiam spectare, quomodo prosecerint sensim summa eriam ingenia. (Sic faec. Fecund. conquoluoli vuli.) &c.

24. Porro vt tria illa apographa; Bunkiani item Fogeliani et Paiseni. labores separati manerent ab omni mixtura alieni, suum apographon ita, vt editionem comparare publico optabat, aptauit editor. Sicubi tamen collatio notari in Mstis aliquid postulauit, id geminatae parenthes, inclusum eius

manum in ils fatebitur.

25. Satis iam verborum de characteribus et fignis. În verbis ipfis, quia excipienti ex dictantis ore facillima est hallucinutio: En exhibita (nede sphalmute excipientis frustra veniat suspicio, vbi scripsit ipse auctor) ordine.

# VERBA AVTOGRAPHA.

Impressa	Scripta in fasce 122. Apogr. fol. pag.	Impressa Scripta in S. lin. A	n falce 122. 2 pogr. f. p.
	Grand B. 127, a.	Cap. VIII.	B. 136, a.
n, and a	Cap. III.	4.5. Gra-tica J V, 3.41 Ap-tense ?	**
A V 9 L. La La	Supina Prona OL - ditur A. 105, a. Est-nubus	IX, 4. Ac mali XI, 1.2. & quafi Cap. IX.	A. 110) B.
V-IX, I. S	Den-vum B. 129, a.	IV, 1.2. In falv-mis V, 2. Id est.	A. 109, a.
IX, 2. X. I XI, 1-3. I XII, 1-4. (	Foi-Porro B. 129, b. Circ-re est. A. 104, b.	Cap. X.  I, 2. Maior  3. Fil-thus	A. 110, a.
XXII, 1. I 2.3, XXIII, 4.5. I	Vna - gerit	V, 1, Quaed-ntum Caulis Cap. XI.	24, 110, 4,
XXIV-XXV	l. Penn-dula Dic-mofum	De diff-tiolis Bellide	A. 110, b. B. 137, a.
XXX, 1. 1 XXXI,1-12.1	Particulare 7 A 106 a	3. Vulgari Gram-1ye	A. 110, b. B. 137, a.
V, 3.4.1	Cap. IV.	VI, 5. Ind-Ilis VIII, 1-6. Pec-ntibus	B. 137, b.
XII, 9.	Cap. V. Qua - tatur A. 107, b.	Xl, 2. aut 3. Sam-orro	A. m, a.
1 ( La . E	GI-tatem B. 131, b. Cap. VI.	XIII, i. Al-binis XVI, Cor-tica	B. 138, a. A. 111, a.
III, 1.2. \	Depl-dorum A. 107, b. Vitr-los Robus, & B. 132, a.	Cap. XII.	
IX, 2. I	Har B. 132, b.	2. Cirsio 3. Moly trian- lari	B. 139, a.
4. S	iue - mula B. 132, b.	XVI, 1. quae-citur	A. 112, a. A. 112, b.
	implex A. 108, a, Cap. VII.	Cap, XIII.  IV, 4. V, 1. Imo - stat & V, 2. Fructus	A. 112, b.
W7111 6 3	Multicauli- B. 133, um-dem ut a.b.	Cap. XIV. De Perianthio	Å. 120, a.
1X, 3.4. I	Nud-tago B. 133, b. nrad-qui A. 108. b. Cau-alis A. 108. b.	11, 2. gi Fagopyri	А. 113, а.
6-и. І	Hel-ofc. 134. a.	V, 4. Paeonia VII, 5. Primum	B. 153. b.
•		. •	4446

			To Comment Continue !	. C.C
Impressa.	Scripta	in faice 122.	Impreiia Scripta i	a raice 122.
6 lin.		Apogr. f. p.	§. lin. A	pogr. t. p.
VI	We- mile		VII, 2.5. Gen-iora	Sec \$2.50
ماء ج	floribus		margine 4. NB.	A. 115, b.
10.	for atic	A. 120, b.	VIII. 2. fine-nio	
4.	floribus fiue-atis fiue Vn-in	6 444	Impressa Scripta in Scripta in A VII, 2.5. Gen-iora margine 4. NB. VIII, 2. siue-nio Cap. XIX.	· aVI
4.5	mue vii - i		Cup	
XIV, I.	foliis	U D	11, 3. reant	B. 145, h.
$XV_{1}$ _1.	F 3,132 - 1	B. 155, D.	Ill, 4.5. Vel Sp - fior	A. 115, b.
3.	Cneco		V, 2. fiue	3,1
XVIII, 2.	trof-	B. 156, a.	V, 2. fiue XI, 1. vel XII, 1. 2. frontevel f. i. v. cr. vt-næi XIV, 2. Scabiofa	B. 146, a.
4.	-uo-icto		XII, 1.2. fronte vel f.	
XIX, 2.	Narciflis	A. 121. a.	i.v.cr. vt-næi	
3.	Narcissis Othonna	[ *** ****	XIV, 2. Scabiofa	A. 110, a
XXI. 5.	nerui .	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cap. XX.	* 1 m + 2 +
XXIII. 1-8.	Am-dunt	A. 121, bi	11. 1-6. Dico-tineant	3 4 1 1 1 2
4.	funt	<b>B</b> . 156, b.	Cap. XX.  11, 1-6. Dico-tineant  2. concaut	B. 146, b.
	Cap. XV.	1.1	vide mox Notas buius mon.	
	Cap. Av.	No. of the last of	IV. 1 fine-lius 7	
IV, 2	aut-Stilo	А. 113, а.	IV, 1. fiue-lius 7	A. 120, a,
3.	Sanguiforba	3	Vill, r. qui-cuntur	
3.4.	Cyr-Clusii est	B. 141, 2.	6.7. quam - cant	A. 116. b.
V, 4	eit	A. 113, a.	I IV WIII - TOOL: Annual to .	
1-7	. In Queteneur	A. 113, a.	in-zin, Filt-torta	July 1
	Cap XVI.	A STATE OF THE STA	Lap. AAI.	
1X. 9.	Cyclamini	А. 113, а.	De-plici I, 1. cea 1V, 3. medii	A. 116. b.
X11.7 2. A:	n\A.\e	B. 142, b.	I, I. cea	
onatuo	r /114 / qui-lex_	D. 142, 0.	1V, 3 medii	A. 117. 1
4	fol - liti	A. 114, a.	V, Gag	2 2 2 2 3 a
	Can XVII		Vis George 3. di fl.	B. 148, 2,
	Cap. XVII. Vel - mis		Can XXII	
11, 2.	Vel-mis Chamæp-lii; fed	А. 114, b.	De floris	A. 117, 2.
V1, 2.3	Chamep-m,	B. 143, b.	Ill, 1.2. Pednati	Programme To
. 4			4-7 Int-iore	A. 117, a.
•	Cap. XVII.		4-7. Int-iore IV, 1 liberi	
V111, 2.	vel	A. 114, b.	Vl, of the al-Rectus	B. 140, 2.
XII. I.	repandas		XII.XIII, In Ru-quina sta-	197
XV, 1.2.	Int-citur	A. 115, a.	Mixin, in the quint in	A. 117. b.
	Cap. XVIII.	235 3155 45	XVI, 1.2. Staminos - pare	
1. 1.2.	Flos-tus est	J	AVI, i. 2. Stammos-pare	
TV. 2.	1aep - xa	A. 115, b.	XVII, 2. Tulipa XVIII, 4. rarius	D - 1 - 2
		1	XVIII, 4. rarius	F. D. 149, 2.
2.	Conf-14	B. 145, a.	vt in-dibus	A 110 W.F
		D. 14), d.	XX, 2. vt-pis	A. 118, a.
<b>V</b> II. 1.	vel	J	XXI, 3 inter	B. 150, a.
7.47	vel Planis	A. 115, b.	8. Stoebis	A. 118, a
2.	vt Ela	B. 145, a.	XXII, I. foliol-	D. 150, a.
1 :		\$ 4.		Im-

Impressa Scripta in fasce 122,	Impressa Scripta in fasce 122.  §. lin. Apogr. f. p.
§. lin. Cap. XXIII. Apogr. f. p.	V, 1 lue
IV-VII, Stil-liquas A. 118, b.	Valuas - fi
XII, 2. Sta-cio A.119, a.B. 151, b.	2. Diuiduum 3. 4. ut - licho 🙀 A. 122, a.
XIII, 1. vt-reo	Cap. XXVIII.
2. Vt - r1a	Ill, 2. nus apt
XV, 3.4. Vt-ria	4.5. aut Or-dum
XVIII, I. Othonna 2. Den-ria	1V, Ob-fata J A. 122, b. V, 3-5. quar-borum J
VV VVI I og log	6. Mercurialis B. 158, b.
Cap. XXIV.	Lupulus, B. ib.?
121, 3. Città Gai	V1, 1, 3t
Cap. XXV.  1V, 1-7. Fl-fpera, scheda in B. 154.	3. les: A. 122, b. 4. funt B. 158, b.
Cap. XXVI.	5. pro C. 184, b.
I, 2. id est A. 121, b.	VII, 1. Hieronymus A. 122, b.
Cap, XXVII.  I, I. Portiuncula	3. cum fe C. 184, b. 4. quia A. 122, b.
11, 111, Cor-xima J A. 122. a.	5-7. Semine-eft. C. 184, b.

Sunt vero in his nonnulla consideratione quadam digna. Et generatim 3 quidem, cum alicubi emendatio corrupti B abeat ab A, sieri poterit, vt apographon A autographae re B emendationi sit praeferendum. Coniectura quippe certitudine autopsian non aequat. Divinandus autem sensus erat in corrupto B, quem A, vt mente auctoris conceptus suerat, vel exceptum auditori, vel auctoris manu perscriptum, si ad manum suisset, requirenti suerat exhibiturum.

Hinc I. Apographon A, c. XIII. §. IX. lin. I. (e fpica,) malui sequi, quam 4 Autographon B (in spica,) emendatio enim erat haec, cum scriptum esset nullo sensu: & spica.

Item 2. cap. XIV. §. XXIII. lin. 6. Autographon A (citrini coloris) fequi 5 malui, quam emendationem, quamuis & ipsam autographam B (citrini in colore.) Nam (citri in colore) corruptela habebat, emendatione illa vicunque fanata.

Etiam 3. cap. XX. §. II. lin. 4. Autographon A, 116. a. (canitate vacua,) 6 fequendum potius fuerat, quam emendatio, licet etiam ipfa autographa in B. (concaui.) Corruperat enim scriptura sensum, dum (canitate vacui) exhibebat. Certe sequentia dum non mutantur, etiam hic siue (vacua) siue (vacui) retinendum est, id enim oppositio sequentium omnino requirit. Nam concauos slores non omnes esse vacuos, paragraphus 7. & 8. docent. Res ergo si emendationem postularet, in sequentibus ea simul foret suscipienda. At Iaceae sane & vacuos habent marginales, & semini nulli, quod quidem

adolescat, aut apareat oculis inhaerentes. Vnde ex A, istud (caustate va-

cua) omnino videtur restituendum.

Speciatim vero 1. cap. II. G. V. (minus.) Fortasse inter distandum voluit adiicere principalis, & mox consideranti magis placuit secundaria, vt (minus) delere liceat, aut (magis secundaria) legere. Minus enim principales partes h. e. sine quibus totum esse potest iam commemoratae erant complures, a quibus has vt viliores, & minus etiam necessarias distinguere voce aliqua voluit.

2. Cap. III. quae §. IV - XI. impressa sunt, signo nullo monstrant locum quo sint referenda. Sequendum ergo id fuit, quod & legentium cognitionem & memoriam requirentium inprimis iuuaret. Quamuis ergo apographa omnia in calcem capitis haec reiiciant, composito tamen folio, Fogelii etiam iudicio erant praemittenda. Suprema nimirum lex est ordinis didascaliri, facilioris nostrae cognitionis habendam esse rationem. Hanc ita seruare in omnibus disciplinis, quas conscripsit, studet austor, vt in nulla, quae ad vnam obiesti partem pertinent, coniuugat, si ordo cognoscendi aliud postulet: Etiam hoc ergo austoris institutum in opere eius placuit relinquere conspiciendum potius, quam alia consilia praeserre. Maxime cum pagina MSti, cui isthaec subiciuntur, ad initium tantum paragraphi XVII, pertingat, vnde liquidum videtur, nequaquam autorem ea integro folio, iis quae pagina continebat, voluisse esse posteriora.

3. Eiusdem capitis III. paragraphus XII. etiam paginae, modo memoratam antecedentis, calcem occapat, nimirum post impletum spatium omne istius paginae demum scriptus. Coniunctus ergo est modo memoratis, quia ad diuidendi folii modos circumscriptio etiam folii pertinet; subiecta vero istis, quia circumscriptionis respectu species nullae ab auctore sunt constitutae. Sussiciebat enim sontem ostendisse, in sigurarum tanta varietate & tam

obuia notitia,

A ergo postrema auctoris cura est reuersa; & ex B apographa alia nata sunt omnia, adeoque recte apographon A, cereris in editione praelatum est.

Cur enim inter tam multa Graecae nationis vocabula feripturae peregrinitas huic foli adhaereat? Indicio est accentus non suo loco positus, quem ipsam illam ob causam non placuit mutare, & in Paisenii schedis, fascis sungiani (167) fol. 34. eandem forte ob çausam ita reperitur scripta haec vox, ve

in apographis A. B. C. etiam omnibus.

12 6. Capitis VI. paragraphi III. lin. 2. Citatum Vitruuii caput de hydraulicis machinis, quibus organa perficiuntur, est libri X. 13 um. Philandri editio
Argent. 550. in IVta, p. 466, 5.8. habet fundos. 465. 8. autem fundulis, quod
in indice ex fundulae Philander deducit, & p. 42, 18. Varronis aliquam vocis istius ponit interpretationem, quae an citato etiam loco sit conueniens,
considerabunt, qui volent, aut ex perito Architectonicae quaerent, apographi quidem A prima scriptura fuit §. III. lin. 1. & §. VI. lin. 1. Plura funda,
item §. IV. lin. 2. nouam fundum, vtique ex dictantis ore, cui neutrum vt mi-

nus

nus viiratum genus, ab aequiuocatione tutius fuit viium. Emendatio postea, credo, auctoris, (potest tamen esse alterius) viitato a genere satius duxit haud abire.

7. Capite XI. paragrapho XII. in A. in. a. voci (capitulis) adscripserat au-13

Ror, sed postea deleuerat (nimirum vel discis;) adscripsit vero etiam voci (tamaceto) & non deleuit dictionem (vel,) quae delenda fuerat vtique simul cum
istis, ideoque in impressis est omissa. Voluit sortasse autor adjicere (globulis,)
sed, quod certum exemplum non succurrebat, sub divisionis vlterioris diligentiam, observandi occasione tunc destitutam, in eos rejicere, quibus obseruandi sieret copia.

8. Cap. XIII. § IV. lin.1. in A. 112, b. legitur, (videntur) scilicet, subiun-14. An fuerant haec (Frumentum turcic. etc. Deinde inglans.) Cum ergo haec mutata essent in (obstat & inglans) simul ex (videntur) feciendum erat

(videtur.)

9. Cap. XVIII. foli totius opusculi paragraphi 1. 2. 3. numeros habentis

autographos in A. 115. a.

10. Ibid. paragraph. V. & VI. ita funt autographi in B. 145. a, vt figno 16 nullo monstretur locus, vbi inseri illi debeant. Habet autem A. 115. b. post §. IV. fignum addendorum, & idem calci paginae eiusdem subiectam, vnde plura esse ea, quam quae margo capiat, apparet. Huc ergo, cum res ipsa idem quod indicia haec, suaderet, ista relata sunt & exempla aliquot, ne dubia res videretur, paragrapho V. adjecta.

II. In A. folii 16. faciei a calce, feriplit auctor. Spica racemus ambella.17 Continetur vero ea pagina capitis XIX, §, 8. & feqq. & capitis XX, §, 1 - - 6. Fortasse deliberauit de fpica, &c. ex compositis slosculis, constituenda & per

exempla: oftendenda.

figno, quorsum referri debeat, moneatur. Res tamen docet, recte eum hic

13. Cap. XXII. §. XVIII. lin. 4. vtrobique & in A, 118. a. & in B, 149. b, scri-19 ptum fuerat (nunquam quod sciam.) Autographa emendatio in B deletis his substituit (rarius) Nimirum vniuersales propositiones, quae quidem experientia sola cognitae sunt, eum debent cuiuis vnione vel minimae instantiae honorem, vt iure vniversalitatis illico cedant.

14. Eodem cap. XXII. §. XIX, inter 3. & 4. fignum addendorum est in A,20
118, a. Spatium ergo relinqui placuit, quod & rectorum angulorum exempla

capiat & obliquorum, quae natura ipsam exspectanti nemini inuidubit.

Porro 15. capite XXIII. cum paragrapho XVIII. in stilo saluiae & ceruica-21 riae fissuras tantum agnoscente, pugnare videntur paragraphus XIX, & XX, speciatim cornua tribuentes stilo Saluiae & Ceruicariae, cui XIII, quoque ea tribuit & XV.

Hic ergo, bifidum, trifidum stilum s. XVIII, si tollis, cogeris sissuras omnes appellare cornua; Ar paragraphis caeteris divisionem stili a cornibus desumptam si tollis, iam eodem loco habere crederis sissuras omnes, nec in vila agnoscere peculiari appellatione quicquam dignum. Omnino ergo prae-

stat, utrumque auctori, ut posuit, ita relinquere, intactum, ut non liquere, credatur, pronunciasse, sed, vt saepe in schedis monet, amplius esse quærendum, observandum, deliberandum. Sane contradictoria simul eodem loco possuisse is nequaquam videtur credi debere, qui quantum posset, (vid. cap. V. §. ll.) conabatur distinctas afferre notiones. Sed vbi illa videntur occurrere, nondum constitutum habuisse potius erit existimandus, utrum praeser-

ret, imo annon secundum quid utrumque retineret.

Hoc quidem loco deliberasse auctorem potius de exemplis apte digerendis & praeceptis dextre constituendis, quam liquido constituta iam habuisse omnia, indicio est I, quod paragraphum XX. sua manu scripsit, cum is tamen eadem pag. S. XV, lin, 2.3. iam contineretur, & idem cum XXmo exemplum ipsius auctoris manu haberet adscriptum. Indicio est 2, quod binorum cornuum pro exemplo cum posuisse olim Saluiam §. XIII, lin, 1, deleuit vocem & Cichoreo substituit, scilicet in Saluia simul cum numero etiam inaequalitatem cornuum ostensurus §. XIX, 2. Item 3, cum Crocum pro ternorum cornuum exemplo posuisset S. XIII, lin, 2, delata etiam illa voce, substituit Ceruicariam & Crocum ad trisidorum classem reiecit.

Quare, si inspectio tandem euincit, vel Ceruicariae vel Saluiae vel vtrique cornua non satis recte tribui, delendae erunt hae voces ex s. XIII, XV, XIX, XX, atque auctoris oculos inter mutandum eae fefellisse recte existimabuntur, occursurae illius vtique, & loco non suo, iubente ipso, cessurae, si editio ab ipsius cura potuisset venire. Contra, si qua harum cornua vere habere deprehende-

tur, delenda erit illa ex §. XVIII.

Conspiciuntur autem immutationes istae in A. 119, a.

Denique 16. Capitis XXV, paragraphus IV, in qua scheda scriptus est, ea est in B. 154, sita inter 153, b. & 155, a. quibus paginis de Perianthio, hoc est capite XIV, comprehenduntur paragraphi I-XIII. Deliberet qui vult, an pappus vice Perianthii stori proprii queat haberi, adeoque capitis XIV paragraphis X & XI vel tota haec scheda vel eius aliquid veniat addicendum. Hic ea posita est, quia post sloris interitum, imo post ipsius causis mortem semini interdum haeret pappus, & ventis ablatus secum illud rapit, vbi tandem commodae sedi applicatur, illud nouae plantae in spem seminaturus. Conf. Dox. Ph. min. P. 2,

Sect. 3, Fragm. 4, Cap. 4, Aff. 1, Sectiunc. 7.

NOTA I. Fieri potest, vt recognoscentis auctoris diligentiam alibi quoque apex vnus atque alter subterfugerit, qui relictus tamen sensum alium efficit scripturae, quam dictantis suerat. Monent tale quid alicubi insertae textui impresso minutissimorum characterum parentheses. Moneri similiter poterat capite IX, §. 1, lin. 3, fortasse dictatum esse (ramos,) cum scriptum sit (ramus). Nam §. VIII, lin. 3, IX, lin. 1, X, lin. 2. & per totum caput, rami & (sub quibus eos paragraphus IX comprehendit) germina simul cum foliis vt productum non vt producens considerantur, situsque eorum perinde vt foliorum ad caulem expenditur, nullibi foliorum ad ramos aut germina. Erit proinde etiam paragraphi II linea 2 vox (rami) non Genitiuus, sed in Plurali numero nominandi casus.

NOTA II. Quia nec frustra solirus est siue Iungias side Fogelias lineola subtus ducta voces notare in opere inprimis olim edendo, sed considerandum in verbis ita notatis restare, aliquid se ipsos potius voluerunt monere, ecce consignata hic quia pauca sunt verba ista omnia.

S. lin. Apogr. fol. pag.	§. lin. Apogr. f. p.
Cap. III.	XVI, 2. vel plicis aut striis
XIII, 1. Folium compositum A. 105, a.	variata A. 114, a.
Cap. IV.	Cap. XVIII.
V, I. Ala caulis A. 106, a.	Ill, 2. Figura (notav. Fog.)
Cap. Value of All Cap. Value of the All Cap.	Simillimis J B. 145, 2.
XIII, 3. ambigi A. 107, b.	IV, I. Folia plana 2. Concaua A. 115, b.
6. flore fructu destitu-	2. Concaua A. 115, b.
ta reperiuntur B. 131, b.	VIII, r. Corniculis : j
Cap. VIII.	Cap. XX.
IV, 2. Nudicaulis A. no, a.	I, I. Flos natura plenus A. 116, a.
Nudic-planta B. 136, a.	11, 4.5. Stamina in fistulam
Cap.IX.	V, 1, 2, Stilo bicorni A. 116, a.
VIII, 2. Biiugo ordine XII, 4. excepta herba  B.134, b,1.	VIII, 2. pediculum
(baec rubrica notauit Fogelius,	4. Craterem 5. Stilus A. 116, by
vid. Monend. 26. num. 2. 4-7.)	6. fiftula colora-
XV, I. Spergula B. 135, a.	ta J
Gap. XI.	
IV, r. Ambigit A. 110, b.	Cap. XXI.
IV, 1. Ambigit A. 110, b. XIX. 3. pendulam profe-	I, I. Flos per accidens plenus A. 116, b.
runt A. III, b.	dens plenus
Cap. XV.	Cap. XXII.
IV, 3.4. Cirfiis (notauit Fog.	XI, 1.2. ambitus A. 117, b.
vid.monend. 26. n.8.	XIX, 7. lateribus inter se
Quint.) B. 141, 2.	A. 118, 3.
Cap. XVI.	Cap. XXV.
VIII, 1.2. in lacinias fisso XVI, 1. tunica A. 114, a.	111, 3.4. Siliquosis omnibus
XVI, 1. tunica j A. 114, a.	excepta Onagra A. 120, 2.

Tantum de Autographis Iungianis, quae, quia separanda saltem numeto ab aliis videbantur, Monendum XXV pepererunt tam vastum & tam multimembre.

#### MONENDVM XXVI.

Fogeliana a	manu iunt	
Fogeliana a  Impress Scripta in Apogr. fol. pag.  Cap. III.  1V, 3.4. vrin-tica, C. 223, a. Conf. B. 129, a. XVI, 1.4. Notplex Folium, C. 211, a. Conf. B. 128, a. XIX, 5.6. DigC.  B. 128, a.	Impress	f. p. , b. , b.
XXVII, 6. Talis-Paeonia C. 211, b.	Cap. XXVIII.  111, 3. 4. Rad-barba B. 158	
Conf. B. 129, b.	'VII, 8-12. Caef ofe B. 158	, b.

Nimirum quae dictis locis in C adiecit, ea adiicienda effe, in B monuerat, dum ablegabat ad ea, quae ipfe ad Excerpta Log. Hamb. lib. I. cap. vlt. annotaffet.

Adiecit vero & alia quaedam, quae, (quod vel respiciebant sequentia ante quam suis numeris citari possent cum iis imprimenda; vel indigebant admonitione, quae textui inserta, simul cum disulsis nimium textus verbis, eius quoque sensum erat obscuratura) huc iusta de causa dum resiciuntur, etiam alia nonnulla textui satis apta eodem rapuerunt. Sunt v. haec:

1. Cap. III. paragrapho XVII praescripsit: (NOTA) & minutis literis eum C, 211, a. 222, b. voluit inprimi 2. Ad Cap. IX & VIII vocem (omnes,) adscripfit (excipe Galium & fimiles. Conf. Cluf. Rar. pl. hift. 1. 4. c. 32. . B, 134, b. facit 1. XIII, II. adscripsit (repetit C. 25.) B, 140, a. XV, IV, 2. Vlmo) adscripsit: (qui tamen habent Calycem fine Perianthium, Lapatho.) B, 141, a. XV, 3. 4. Cyr. (Lege Cirsiis) adscripsit: Dubitat alibi de bis wide Doxosc. min. B, 141, a. XV, 6.) adscripsit: v. c. 18. B, 141. b.

Horum ergo primum quod attinet, ab instituto huius editionis id erat alienum, quippe vbi minores typi Non-Iungianis erant destinati, & Iungiana relinquebantur, qualia ab auctoris venerant manu, qui distinctionem in Notas. Scholia hic non erat molitus. Poterat praeterea paragraphus hic ideo haberi contextui non extraneus, quia Synonymon folii in sequentibus frequentatum ille tradit.

Secundum, id est capitis IX paragraphum VIII quod spectat; falsum sane est, quod textus videtur velle, quadrati caulis germinationem omnem esto biiugam, nisi biiugam ita late capias, vt coniugatae aequipolleat quod nec au-Roris ingenium aequiuocationum haudquaquam patiens, nec sequentia theo-

rema-

remata pro sola duorum coniugata germinatione vocem constanter accipientia permittunt. Quare, si textus retinendus erat, de exceptione qualem Fog. ad-

ficere caepit, omnino fuit cogitandum.

Cum vero fieri non potuerit, vt ipso eo loco, vbi lineas immediate antecedentibus germinationem senariam & quaternariam descripserat auctor, caulisque de figura meditabatur theorema, considerare caules ipsarum illarum herbarum quas pro exemplo ponebat Par. VII, praecipue semper obuiarum, qualis Galium est, ita negligeret, vt statim Par. VIII, vel de caulis earum figura falsum proderet, vel de germinatione earundem, id quod simul falsum esset, & paragrapho VIImo contradiceret, corruptam esse scripturam omnino est vero similius.

Emendabitur illa facillime, fola voce (G,) vocem (quidem) proxime quae 6 antecedit, delata. Verissimus enim ita erit fensus, (G biiugo ordine quidem,) intellige, quae germinant ex quadraticaulibus, (alternatim proferunt folia.)

Nihil inter dictandum frequentius accidit, quam vt vox aliqua in scriptu- 7

ram irrepat repetita, quam repeti nequaquam qui dictabat, voluerat.

Sequentia 3-6. adicribi textui possunt, perpaucasi mutes. Tertium quidem ad Cap. XIII, Par. II. ita: (repetit C. XXVI, Par. III.) & rursus ad Cap.
XXVI, III. adiiciatur (vid. Cap. XIII, Par. II.) Quartum, vt scriptum est, ita retineatur. Quintum, ad Cap. XV, Par. IV. lin. 3. vocem (Cyrsis) locum suum in
Doxoscopiis Phys. min. habet Part. 2. Sect. 3. Frag. 4. c. 5. Assert. 3. sectium e. 2. quo
adiecto textum illud illustrabit. Sextum ad Cap. XV, Par. VI. immutandum
ita est. (Vid. C. XX, Par. VIII.) Pertinet vero huc Assertio tertia loci ex Doxoscopiis modo citatis tota dignissima quae conferatur. Et poterant permulta ex
Doxoscopiarum illarum Partis secundae Sectione tertia ad Isagoges praecepta
illustranda citari; Quia autem illae editae sunt, legentis industriae relinqui
ista opera potuit.

De Capitibus aliter ordinandis cogitatum fuisse D. Fogelio, indicant haec

quae in fronte B id est fascis 122, fol. 125, b. leguntur:

De PLANTA IN GENERE c. I.

SECTIO

De Plantae Partibus Supernis I. de FOLIO in genere

Composito c. 3.

II. de CAVLE c. 2. 4 - 5.

III.de FLORE. Partes Floris Interiores - STAMEN. c. 20.

STILVS c. 21,

de Flore Simplici Vniformi c. 14. Difformi c. 15.

Composito Secundum quid c. 16. absolute Composito c. 17.

de Floris Situ c. 22.

IV. de FRVCTV c. 25.

De Plantae Partibus Infernis-de Radice c. 5. c. 10.

Volue --

Voluerat nimirum Capitis adi Par. 6.7.9. transferre ad Cap. 41 vt de caule quae agunt vno loco coniuncta legerentur. Sed reuocauerat ipfe fe. Subiecerat n. hac: (Sed Cap. stium praerequirit definitionem Caulis in Folii definitione) & quanquam, foluturus a pari hanc obiectionem, adiecerat (de Flore etiam ante definitionem Floris) Retinuerant tamen schedae vltimae fascis scil. 167. id est. Paifeniange auctoris dispositionem, quam solam venata est haec editio, & seruatam esse, Monenda haec passim iam confirmarunt.

Tantum de adscriptisa D. Fogelio.

#### MONENDVM XXVII.

🐧 rgumenta postremis Capitibus ideo praefiguntur prolixa, quia 1. subdiuiniones in illis cumulantur; 2. Membra pleraque exemplis potius quam definitionibus explicantur; 3 posterioribus membris priorum subdivisiones saepe fubilciuntur; 4. quaedam etiam diuerfis locis vel repetuntur vel difperguntur. Nata enim his ex rebus aliqua obscuritas, verbis auctoris haud mutaris, Argumenti dispositione ordinata optime poterat emendari.

#### MONENDVM XXVIII.

Penique, de herba qualibet in hac Isagoge quod notatur observatum, id requirenti ve sit in promptu, en exhibetur Index Alphabeticus herbarum omnium hic commemoratarum cum adferipto numero capitis, paragraphi, & lineae y bi reperire de ea liceat. Inferta eidem Indici funt etiam alia pauca, quae non fuo loco ab Auctore tradita poffunt videri, vt argumentis capitum cum indice coniunctis totius operis materia fit confpicua. In indice tamen hoc Synonyma coniungere nunc non licuit. Reperientur ergo faepe obferuationes diuerfae de eadem planta ad dinerfa eius nomina. v. g. Eiusdem Plantae alia monstrabit Equifeti, alia Hippuridis vocabulum. Quod vni appellationi Au-Etor non inhaesit, voluit ille procul dubio plura appellamina vsu auditoribus reddere familiaria.

Abies 1x, 7, 2. 14, 4. x, 5, 2. Abrotonum foemina xix, 8. Abfinthium xxII, 19, 18. vulgare xxiv, 9,6. Acanthus x, 1, 3. xvII, 12, I. fatiuus xvii, 6, 7. Aconita xvii, 14, 3. Aconitum III, 19, 5. corniculatum xxvIII, 8, 2.) hyemale viii, 9, 4. Techno Adiantum v, 6, 2. x, 2, 4. xxvIII, 6, 3.4. Admirabilis Peruana 1x, 13, 1. Admorfa XIX, 5, 2.

Æthiopis xxIII, 19,2. Ageratum xxII, 19, 14. Agrimonia III, 26, 2. Alfine vii, 9, 3. xvi, 15, 3. xviii, 3, 4. Amygdalus vi, 5, 4. Anagallis aquatica xII, 9, 1. Anchufa viii, 6, 6. Anemonae xxII, 21, 6. Anemone viii, 9,3. XI, 2, 2. XXI, 2, 2. Anethum XI, 10, 2. Anserina v1,5,2. Aparine 1x, 7, 1. 14, 4. Apium XI, 10, 2. 19, 10. Apium hortense viii, 5, 3, 6, 8. Aphyl-

Aphyllanthes xv, 6, 2. Aquifolia x, 5, 2. Aquilegia xvIII, 8, 1. xxI, 1, 9. xxIII, 7. Arbor VH, 7, 4. X, 6, 2. Arbores II, 7, L. XII, 15, I. Arbor Iudae xviii, 7, 3. xxii, 7,3. Arbutus xxv, 3, 6. Argemone IX, 10, 22 Aristolachia xvii, 3, 2. xxv, 2, 6. Artemelia VII, 8,3. Arum vIII, 4, 3. Arundo xii, i3, i. After I Clufii xix, 13, 2. Atriplex vii, 4, 2. Auena 111, 4, 3. Auricula vrsi viii, 9, 6. xi, 4, 2,

Bugula 1x, 10, 2. Buxus x, 5, 2.

C.
Caepa III, II, 2. (B. 129, b.) XII, II, 3.
(B. 138, a.)
Calceolus Mariae xvII, 15, I.
Calendula xx, 12, 2. XXI, 3, 3.
ae xXI, 6, 3.
Caltha xXI, 2, 4.

Campanula x11,5,1. xv1,17. minima 111, 31,9.

Cannabina 1v, 3, 4.

Capparis xiv, 5, 3. xxii, 16, 2. Capficum xxv, 3, 2. Cardui xi, 6, 4. xiv, 7, 5. 14, 6. xx, 10, 1.

Carduus benedictus xiv, 15, 4. 18, 4.
Chryfanthemus xii, 4, 3. xvii, 3, 3.
lacteus xiv, 18, 4.
lanceolatus xiv, 15, 4. xx, 10, 2.
Mariae xiv, 18, 5.

Carolina cauligera xx, 11, 4. humilis xx, 11, 3. fyluestris xx, 11, 4.

Caryophylli xiv,13,3. 19,1.
Caryophyllis xxi, 2,3.
Caña poëtica xvi,12,1. xviii,5,2.
Caffia fiftularis xxv,3,3.
Cavatum quid xviii,4.
Centaurium magnum xi,1,14. 4, 2,

maius XXII, 19, 14. minus XI, 19, 2,

Cepa xi, ii, 3. (A, iii, a.) xii, 10, i. Cerafus iii, 4, 3. xxv, 2, 7. Ceruicaria xxii, 13, i. xxiii, 13, 2. 15, 3.

Chamaeciffus xvII, 9, 2. Chamaedrys vI, 5, 2.

laciniata Lobelii xvII, 6, 2. filuestris xvIII, 6, 1.

18, 2, 20.

Chamaeleon albus xxIII, 4. Chamaepyris II. Dodonaei xvIII. 6, 2. Chelidonium maius xxv, 3, 3.

Chryfanthemum xv, 6, 2.
latifolium Dodonaei xix, 12, 2.
Cichorea xx, 6, 2.
Cichoreum xxiii, 13, 1. 15, 3.
Cinara xiv, 14, 6.
Cirfia Clufii xv, 4, 3.

Cirsium Discoridis xII, 3, 2. Cistus xVI, 15, 2. Cnecus XIV, 15, 3. Cnicus XIV, 18, 4. Colchium XIV, 2, 1. XXI, 2, 3. Colutea Scorpioides XXII, 9, 2.

veficaria xxII, 7, 2.
Concauum quid xvIII, 4.
H 3

Con-

Confolida regalis xviu, 8,2. Conuoluuli xvi, 8, 3. olus xvi, 17, 1. 8, 1.

Conuoluulus xvi, 7, 1.

o peregrinus purpureus XXIII, 10, 3.

vulgaris xxIII, II, 2. campanifer xxIII, 41, 1.

Conyza vii, 9, 3. Corylus x, 1, 2. xiii, 6, 1. Cotyledon x, 2, 2. Cotyledon prima viii, 8, 3. secunda viii, 9, 6. Crocus xiv, 2, 1. XXI, 2, 3. XXIII, 18, 2. Cruciata IX, 6, I. XII, 5, 2. Cucumis xxv, 2, 5. Cucurbita xxv, 2, 4. tae xiv, 21, 2. Cunigundina perfoliata xiv, 14, 2.

> Tabernaemontani prima XXII, 19, 12.

verbenifolia xıv, 14, 2.

Cuscuta v, 9,3. Cyani xiv, 14,5, xxii, 19,5. Cyanus xi, 6, 4. xiv, 7,5. xix, 14, 1. maior xx, 2, 2. Cyclaminum xvi, 9, 3. Cymae x111, 7, 8. Cynogloffum viii, 5, 3. 6, 6. x, 1, 2. Cyperus x11, 3, 1. Cyrsium vide Cirsium.

D.

Delphinia xvII, 14, 2. Delphinium xvII, 7, 2. 13,5. XVIII, 8, 2. Dens caninus xxIII, 18, 2. Dentaria adunos vIII, 2, 1. 8, 3. Digitalis xiv, 20, 3. xxii, 21,4. xxiii, 10, 1. XXIV, 9, 4.

Dolichum 111, 23, 4. xxv11, 5, 4. Draba xxiv, 5, 2. Dulcamara xxII, 19, 10, xxv, 3,2. Dulchinum x11,3,1.

E.

Ebulus x1, 19, 3. Echium v11, 8, 3. Elaphoboscum x1,19,9. Enula xxII, 19, 17. Epithymum v, 9, 3. Equisetum v, 13, 3. v1, 9, 4. Eryngium Marinum v1, 7, 2. Eupatorium vulgare xxII, 19, 12. XXIII,

Faba 111,22, 1. VII, 4, 1. XXII, 7, 2. XXVII, 5,4. Fagus 111, 4, 3. x, 1, 3. Fegopyrum xiv, 2, 2, Fel terrae x1, 19, 3. Ferula VII, 4, 2. X, 19, 10. Ferulago v11,4,2. Ficus Indica v, 12, 2. XIV, 23, 1. Filago v11, 8.4. Filipendula 111,26,2. V11,8,3. aquatica XII, 13, 2.

Filix x, 1, 3. xxvIII, 7, 8. non ramofa xxviii, 6, 2. 4. ramosa xxvIII, 6, 2. 4, 7. Filix folio ramoso v, 6, 4.

fimplice v, 6, 4. Flores Labiati XXI, 4, 3. XXII, 6, 2, 3.

XXVI, 5, 3. Compositi xxii, 7, 2. Incompositi xx11, 6, 6. Flosculi capitulorum xxII, 19, 11. discorum xxII, 19, 16.

Flos Leguminaris xxII, 7. xvIII, 7. xxI,

Regius xvII, 13, 5. Solis xxII, 19, 17. Tunetanus xIV, 17, 4. 19, 4. Foemina Planta xxviii, 5, 4. Foeniculum x1, 10,3. X11,13,1. aquaticum xxiv, 8,3.

Fragaria 111, 19, 4. VI, 5, 1. VII, 7, 2. XXII, 16, I.

Fraxinus 111,23,4. 1x,4.1. Frumenta 11, 7, 2. X11, 13, 2. tum Turcicum x111,4,1. Frutex x, 6, 4. x11, 15, 1. Frutices 11, 7, 1.

Fungi 1, 6, 4.

G. Ga-

G. Galega xxII, 7, 2. 20,5. Galium 1x, 7, 1. Genista xv111,7,2. Gentiana XII, 13, 2. Gerania xIV, 13, 3. XXV, 3, 2. Geranium v11, 8,3. x1v, 18, 3. Gladiolus xv111, 7,2. palustris XII, 12, 1, Italicus x x 1 1, 15, 1. Gnaphalium v11, 8, 4. Gramen caninum VI, 9, 2. cyporoides x11,3,2. leucanthemum xx111, 6. polyanthemum vIII,4,4. XI,2,3. typhinum xv, 4,3. Gramina XII, 13, 2. Harundo v1, 9, 2. Hedera adulta 111, 7, 2. arborea XI, II, 3. , terrestris v.1, 9, 2. Helenium y11, 10, 6. xx, 12,2. xx11, 19, 17. Helleborus 111, 19,5. Hepatorium aquaticum perfoliatum XXII, 19, 13. verbenifolium xxII,19,14. Herba Paris VIII, 9,3. Ramaea 1x, 12, 17. Hieracia xx, 6, 2, Hippuris v, 13, 3. Holophyllis Iungii v, 12, 8. Hordeum 111, 4,3. XI, 7, 4. Horminum creticum x111, 8, 2. fariuum x111,8,1. fyluestre vill, 5, 4. Hyacinthus comofus x1,8, 1. Hyacinthi xx1,4, 2. Hyofeyamus x18, 13, 2. xv1, 7, 2. 14, 2. Tacea x1, 6, 4. X1V, 7,5. XV, 6, 11. Iaceaexiv, 14, 6 xx, 10,1. xx11, 19, 15. lacobaea xx, 12, 1. Hex x, 5, 3. Impatiens xví í, í j, j. Împeratoria v 1, 7, 2,

Irides x v111, 7, 2. XXI, 4, 2. XXII, 18, 4. Iris xv, 7, 1. xx11, 14, 1. xx111, 8, 2. Iuglans 111, 23, 4. XIII, 4, 7. XV, 5, 4. Iuncus XII, 12, 1. floridus x11, 12, 2, Iuniperus 1x, 7, 2. 14, 4. Lactuca vii, 4, 1. agnina 1x, 12, 4. Lamia XIV, 13, 2. quaedam xx11, 21, 4. Lamium x11,5, 1. x1v, 16, 3. xv11, 1, 4. XVII, 7, 2. XXII, 6, 6. Meliffifolium Bauhini xvii,9,3. Pannonicum Clusii 1. xv11,9.3. Lapathum vIII, 6. (III,xvII,9,2. Laurus x, 5, 3. x 1 v, 5, 4. 9, 3. x x 1 1, 10, 3. Legumina xv 1 1 1, 7, 3. xxv, 3, 3. Leguminares xx1, 4, 3. Lenticula 1, 6, 4. Lentiscus 111, 22, 2. Leucoia x x 1, 6, 3. Leucoium xvī,12,3. xv111,3,4.5,2. xx1,2,3. Leuisticum x1, 19, 10. Lichen marinus v, 9, 2. Clufii v, 12, 5. Ligustrum xxv, 2, 6. Lilia xx1, 4, 2, quaedam xx111,10 Lilium 111, 4, 4, XIV, 2, 1. XVIII, 3,3, Conuallum v1, 9, 2. Limodorum v111, 2, 2. Linaria communis xv11, 13, 4. Valentina xvII, 13, 4. Lingua Ceruina v, 6, 5. Lithospermum xIV, II,5. XXII, 3,5. Lunaria vIII, II, I. Lupinus 111, 19,4. v11, 4,1. Lupulus xxviii, 5, 6. Luteola x1,7,4. Lychnides x1v, 13, 2, xxv, 3, 4. Lysimachia lutea 1x, 5, 2. purpurea x1,7,3. Vera 1x. 5, 2. virginiana xx1 1 1, 13,3. 14, 2. . M. Malta propriet in M. 48° Li Malua xx111, 17, 1. xxv, 3, 5. Maluae xx11, 21, 7. Malus 111,4,3. xxv, 2,7. Marrubium vii, 8,4. xii,5, 1. xiv, 11,4. 13,2. XVII, 1,4. Mas Planta xxvIII, 5, 4. Martagon XIV, 2, F. Matricaria x1, 12, 1. xv, 6, 2. xx1, 3, 3. Melanthium xxi, 2, 4. pleniflorum xxi, 6, 1. Melilotus vulgaris xxIV, 4, 3. Melopepo xxv, 2, 5. Mentha v1, 9, 3. X11, 5, 1. Menthastrum v1, 9,3. Mercurialis v11, 10,4. xxv111,5,6. Milium XI, 9, 2. syluaticum xIII, 8, 2. Millefolium v11, 8, 4. XXII, 19, 17. Modiolus xxIII, 17, 2. Mollugo IX, 7, I. Morfus ranae x v 111, 5, 1. Musci 1, 6, 4. N. Napellus x v 1 1, 7, 2. x v 1 1, 9, 2. Narcissi xIV, 19, 1. XVIII, 9, 1. Narcissus xx1, 1, 10. Nastūrtium Indicum xv111, 8, 2. Nicotiana xiv, 13, 2. maior x1v, 20, 3. minor xIV, 16, 4. 20, I. vulgaris xIV, 16, 4. Nigella xxv, 3,5. Nummularia XII, 9, 2. Nymphaea viii, 4, 3. x 1, 2, 2. x x iii, 16, 2. XXV, 3, 5. Ocymoides x1v, 18, 3. xxv, 3, 4. Olus album 1x, 12, 5. Onagra xxv, 2, 6. 3, 4. Ophiogloffum vIII, 10, I. Opuntia v, 12, 3. Orches x v 1 1, 14, 2. Ornithogalum album maius XXII, 4, 2. Orobanche vIII, 2, 2.

Othonna xiv,17,3.19,4.20,4. xviii,18,1. 19, 2. Paeonia v 11, 8, 4. x 1 v, 5, 4. x x 1, 2, 3. Palma dactylifera xiv, 5, 4. 9, 3. XXIII, proprie dicta x1v, 5, 3. Panicum XI; 9, 2. Papauer XIV, 3, 1. XV, 7, 2. XXI, 2, 3. XXIII, 8, 5. corniculatum xiv, 5,3. xxv,3,5. fpinofum xx111,8,5,21,3. vulgare x1v,5,3.xxv,3,5. Papyrus XII, 3,2. 14, 1. Nilotica XII, 12, 2. Pastinaca latifolia vIII, 6, 6. XI, 19, 10. tenuifolia VIII, 6, 5. Pentaphylla 111, 19, 4. Pepones XIV, 21, 2. Periclymenum xxv, 2,5. Perficaria IV; 3, 4. Peruinca v1, 5, 2. x, 5, 2. Petafites VIII, 7, 3. 8, 3. XX, 10, 2, Petrofelinum vi 11, 6, 9. Phalangium Virginianum xv1, 12, 2. Phthora VIII, 9,5. XVIII,5,2. Phyllitis v, 6, 5. x, 2, 3. X X VIII, 6, 2, 4. Phyllum xxv111,5,6. Picea 1x, 7, 2. Pilofella v1, 5, 2. V111, 4, 3. ferpens v11, 7, 2. Pinaster 1x, 7, 2. 14, 4. Pinus 1x, 7, 2, 14, 4. Pifa x vili, 7, 3. Pistacium syluestre xx1 r1, r2, 2. Pifum III, 22, I. XXII, 7, 2. XXVII, 5, 4. Plantae sedes 11,2. Plantago VII, 8,5. VIII, 4, 3. XI, 2, 1. aquatica vIII, 4,4.6,3. xVIII,5, 1. Polyacantha vulgaris x11,6,1. Polygonatum xIV, 2, 2. XXII, 3,5. Polygonum v1, 9, 3. Polypodium x, 2, 3. Porrum 111,11,2. X1, 11, 3. Populus Libyca vi, 9, 4. Popu-

Populus nigra xv, 4, 3. Potentilla III, 23, 4.0 de al grobe ment Primula veris XI, 4, 2. XVI, 15, 2. Pseudolysimachia caerulea ix, 5, 1. galericulata xxiv, 9, 4. purpurea 1x, 5, 1. xxv, 2, 6. trifolia xII, 7, I. Pfeudomoly xi, 2;3. The mount in Pseudoparietaria-xiii, 8, 2. Ptarmica xxII, 19, 17. A C V CORUM Auftriaca Clusii xix, 13, 1. Pulfatilla viit, 9,3. xi,2,1. Punica x1,5,5. Pyrola v1, 9, 4. x, 2, 2. fruticans vi, 10, 1. vulgaris vm, 8, 4. xt, 2, 2, Pyrus 111, 4, 3. xxv, 2, 7. Quercus III, 4, 3. x, 3, 2. xIII, 6, L. xv, 5, L. marina v, 9, 2. or is straight. Ranunculi xxr, 6, 2, xxii, 21, 6. Ranunculus xx1, 2, 2. XXII, 16, 2.XXV,3,5. fluuiatilis m, 31, 11. Lusitanicus viii, 4, 4. Rapistrum xvi, 12, 3. xviii, 3, 4.5, 2.6, 1. Refeda x1, 7, 4. Rofa 111, 23, 4. VI, 10, 2. XXI, 2, 2. XXV, 2, 7. non plena xviii, 3, 4. simplex xvin, 3,3. fybuestris xvin, 3, 4. Rosmarinus III, 4, 4. Rubia 1x, 7, 1. 14, 4. x11, 5, 2. Rubus v1, 5, 3. xxv, 2, 7. vterque vi, 10, 1. Ruta vii, 10, 3. x, 3, 2. xxii, 12, f. ะมรูชตามสำเราไปได้**S**รูก กลก์<sub>ย</sub>าร์อโรยร<sub>ูก</sub>ก Sabina e ramo fata xxviii, 4. Sagittalis xxiv, 8, 2. Salamantica II. xix, 14, 1. Salix latifolia xxvm, 7, 2. Saluia III, 4, 4. VII, 10, 3. IX, 4, 7. X, 3, 2. XII, 5, I. XIV, II, 4. 13, 2. 16, 3. 20, 2. XVII, I, 4. 7, 2. XXII, 6, 6. XXIII, 13, 1. 19, 2. XXVI, 5, 3.

Sambucus xt, 15, 2. 16, 1. 19, 3. XII, 14, L XIV, 2, 2. XVI, 9, 3. aquatica xi, 11, 3. Sanguisorba x11, 3,2. xv,4,3. xx111,6,21,4. Satureia vii, 10, 3. Satyria xvII, 14, 3. Scabiosa x1, 6, 4. x1v, 8, 1. 13, 4. xv, 6, 2. XIX, 5, I. 14, 2. XXIII, 21, 2. Scabiofae xiv, 14, 3. xx11, 19, 14. Sclarea viii, 5, 4, xxii, 6, 6. Scolopendrium v, 6, 6. x, 2, 3. xxviii, Scylla viii, 7, 3. 4. (6,3, 4. Secale x1, 7, 4. xv, 4, 3. Sedum aquatile viii, 4,3. aquaticum xvi, 12, 2. xviii, 5, 2. Semen vbi? xxvm, 6, 4. 21 62.62.618 V Sertularia Imperati v, 12,5. Sesamoides Clusii xxviii, 5, 6. Siciliana x11, 8, 2. Siliqua xxII, 4. ofae xxv, 3, 3. Sifymbrium vi, 9,3. Smilax afpera III, 8. Smyrnium 111,31,5 12 , 201 21 Ad Solanum xxII, 19, 10. xxv, 3, 2. Sonchi xx, 6, 3. Sorbus 111, 23, 4. Spergula ix, 15, 1. xiv, 11, 3. Staphylodendrum xxIII, 12, 2. Stoebae xxII, 19, 15. Stoebe xix, 14, 1. Stoechas XIII, 9, I. Stramonia xxi, 1, 8. Stylo carentes xiv, 7. Succifa xix, 5, 2. Symphytum maius xx11,3,4.7.xx111,104. Tabacum xvi, 7, 2. 8, 4. Tanacetum x1, 12, 2. x1x, 8, 1. xx11, 19,17. Taraxicum vi, 7, 2. viii, 4, 2. 6, 3. xi, 2, i. Teucria kvn, 6,4. (xx, 6, 2. Teucrium IV Clusii xvIII, 6, 2. pratense xvII,6, 3. xvIII, 6, 2. verum, Baeticum xvII, 6,3. commune xvII, 6, 3. Thlaspi

Thaspi Creticum xxxx, 5x2e11011date? Thora YULE 9, 5 Tragopogon xx, 6, 2 supe Trifolia 111, 19, 4. . s. aix schosinga ? Tubera 1, 6, 4. Tulipa 111,4,4. XIV, 2, 1. XV,7, 1. XVIII, 3,3. XXII, 17, 2. XXV, 3, 6. Tulipae xxi, 4, 2, xxii, 18, 4. 19, 5. xxiii, अवस्थात अवस्थाता अवस्थाता विष्टे . Tune v, 12, 2, XIV, 23, 2, 10, THV \$9.110. Tuffilago viii, 7, 3: 8,3 menhaec Typha xv, 4, 2. Vaccaria xiv, 18, 3. Vaccinia vi, 9, 4 Valeriana IX, 4, I. XXV, 2, 2. 5 1. 63 Toak ae proprie dictae xi, 19, 2. rubra x1,15,2.13 conton in

Veronica fruticaulis Clulii xvIII, 6,1 Veronicae xvii, 6,4,55, on Saisueto'l Vicia III. 42, 4x, c. 4. e con sincing Vincetoxicum x1, 2, 2. Viola aquatilis xxIV, 8, 4. canina vii, 7, 2. Martia vII, 7, 1. matronalis xvan, 6, tomobusis Virga aurea xx, 12,2. Viscum v, 9, 4. W SALE P S DECEMBER Vitis 111,4,3.1VI, 5,4. 10,2.11, 3,4. XXV,3,6. Vlmaria III, 26, 2. 20 The chieff Vlmus xv, 4, 2 Vmbelliferae xviii, 7, 3, And riong's Vnifolium viu, 9, 6. 1132ili de Vrtica иг, 4, 4, 1х, 4, к maior x, 1, 2, 17 1 20 211 21/11/4

19, 2, XXII, 5, 2.

#### MONENDVM XXIX.

De perficienda magis Isagoge cogitare qui vult, ille se exempla cumulat, ipsi ordine eorum Alphabetico Lectoribus id praestabit commodi, vt quod ipsi observant, id addendum sit praeceptis, an in its iam exhibitum, sine temporis iactura possint perspicere; Si exempla seligit, obuia locis omnibus secundum germinationis tempus ordinata, subiunctis aliis, secundum prouincias suas digestis, quid quando & vbi reperire liceat, commune facere poterunt.

#### MONENDVM XXX.

Huic quidem operae quae posta erat meta, ad eam est peruentum, dum effectum est, vt sascis 122 a follis 103-162, item 169-185, item 210. 28. 222. 223. manum in perpetuum liceat amouere, dehinc iam rebus aliis absque vlla his ex follis metuenda remora vacaturam.

DEO vero Triuni, Patri, Filio, & Spiritui Sancto foli fit omnis gloria. Is efficiat, vt admiranda fuae prouidentiae opera magis indies liceat iuuetque infpicere, & his quoque testibus de praesentia & gubernatione eius conuicti mortales ab obsequio & fiducia Domini & Patris fui nolint discedere.

# numeronomore FINELES. .... S. ... VIX. IS ON THE CONTROL OF THE CO

ommuneum, c Thiail s

# D. IOACHIMI IVNGII DE PLANTIS DOXOSCOPIAE PHYSICAE

MINORES.



# PLANTAE SPECIEBVS CONSTITUENDIS

#### PROOEMIVM.

Argumentum.

Affertio hæc necessitatem oftendit PLANTAS ad certa GENE-RA & SPECIES reducendi.

Sectionculas habet

#### ASSERTIO.

Sectiunc. I.

LANTÆ nisi in certa GENERA & SPECIES constanti ratione, non pro lubitu hujus vel illius, redigantur, insinitum, quasi reddetur Phytoscopiæ studium.

2. Intellectus autem humanus infinitum fugit, quia infinita per-

transiri nequeunt.

3. Ordo autem classium Generum, Specierum terminum infinitis imponit. (a)

4. Præterea difficile admodum reddit Botanicum studium varia ac

discors Plantarum appellatio.

ç. Ejus autem discrepantiæ causa inter alias etiam hæc est, quod plerique ex Botanicis id potius dant operam, ut novas stirpes proferant, quam ut eas accurate ad vera Genera per Disferentias specificas secundum Logicas leges reducant.

(a) Linnaus in Fundam, botan. VI. Ludwig Institut. regn. vegetab. P. 1. C. 1. §. 27. seqq. nec non Raji diss. de variis Plantarum Methodis.

13

CAP.

#### CAPVT I.

#### DE SVMMIS PLANTAE SPECIEBUS.

#### Argumentum.

r Affer	tio SVFFRVTICIS & CREMII nomen abjicit.
	Sectiunculas habet
2	ALTHÆAM & AGRIMONIAM juxta Iulii Cæfa-
Luis Web. 3	ris Scaligeri definitionem non esse CREMIA adver-
	fus ipfum oftendit. Sectiunc.
2	An FRVTEX ab ARBORE differat Specie, ulteriori
. 2	observationi committit. Sectiunc.
T. Strie	Arboream Plantam in Frutigem, Fruticofam in Ar-
	house the first and the Printeens I will of the
_	borem transire posse commonstrat.
2	ARBOR & HERBA an Specie different, cur dubi-
5	ARBOR & HERBA an Specie aifferant, cur aubi-
	tari possit. Sectione. 19 Alia, qua Pradicamentis Botanicis obstent, enume-
6	Alia, qua Pradicamentis Botanicis obstent, enume-
	rat. Sectiunc. 3
7	HERBÆ Definitionem ex Iulio Cæsare Scaligero in-
	pugnat. Sectione Section 3
, 2 8	Si Herba, ut vult Scaliger, definienda est, magis Her-
•	bam esse afferit, que Caulem primo anno non fert.
9	EXCAVLIS Planta quantum differat a Foliosa an-
	te Caulem.
IO	Guilandini sententia circa Divisionem PLANTA
·	quid obstet, indicat. Sectiunc.
II This	OLVS nullius Planta esse Genus.
7.	Sectione , senting 3
4	The state of the s

#### I.

I. Nec SVFFRVTICIS vox apta est ad eam notionem exprimendam, quam Scaliger Φευγάνω tribuit, neque CREMII vocabulum. \*

\* Contra Julii Cæs. Scaliger. Exercit: 139.

2. Prastat nomen Suffruticis & Cremii abjicere, & dicere Plantam Multicaulem, Plantam ab imo Ramosam, Plantam Vnicaulem; & per differentiam Perennis in singulis divisionem continuare.

3. Ita Frutex erit Planta Multicaulis Perennis; & Arbor erit Planta

Vnicaulis Perennis.

#### ender in the remarks, all something a minimum, in.

"I. Qui CREMIVM cum Arbore in eo convenire affirmant, quod "Trunco sit singulari, sive Vnicaule; \* ALTHÆAM & AGRI-MONIAM inter Cremia perperam numerant. Vtraque enim est Multicaulis.

\* Jul. Cæf. Scalig. dict. loc.

2. Jacobus Theodorus Fabernamontanus in seines Rrauter-Buchs Iten Pheils, 4. sect. 17. Cap. (p. 337. K, edit. Francos. 1613.) expresse, Agrimoniam describit, quod plerumque binos Caules proferat, & ita pingit (p. 338.)

3. Dodonaus Stirpium Histor. Pemtad. 1. l.2. c. 7. pingit vel qua-

tuor Caulibus, quorum tamen tres fint recifi.

4. Althaa tres Caules pingit Dodonæus Pemtad. 5. l. 1. c. 29. (nifi

Pictor errarit, ut non Caules, sed Rami fint ab imo Caule.)

"5. Sine Ramis tamen Caulem Agrimoniæ recte Cæsalpinus, hoc est, Simplici Caule esse scribit, de Plantis l. 8. c. 4. initio. Ita omnes pingunt.

#### III

1. Vtrum plures Caules ex eodem oculo Radicis prodeant, an ex vi-

cinis tantum, ulterius observandum est.

2. Si ex vicinis, FRVTEX ab ARBORE non differt, nisi fecundum magis & minus. Nam & Arbores e Radicibus Stolones emittunt.

#### IV.

1. Fieri potest, ut Arborea Planta recisis Cymis (hoc est cacuminibus caudicum majorum & adultiorum) in Fruticem, Fruticosa, recisis Sto-Ionibus, in Arborem transeat.

2. Quadam ad utrumque potest esse indifferens.

3. Interim etiam absque cultura in Arborem Planta adolescit, dum

unus Stipes reliquis Stipitibus quafi Stolonibus prævalet.

4. De LENTISCO Pena & Lobelius in Stirpium Adversariis ,, p. 412. Antverp. edit. 1576. Fallitur & fallit Senensis, quod pumilas ,, recensens Lentiscos, alias a procerioribus specie facit.

" s. Fit enim tantum refectis Cymis ad usum, ne in Arboris amu-

" lationem assurgant.

"6. Clusius item Rariorum Plantar. Histor. l. 1. c. 10. init. Magna "folum ex parte fruticat Lentiscus, multis ab una Radice Stolonibus & "Virgultis assurgens, lentis & Viminis instar obsequiosis.

"7. Interdum vero, quando non caditur, sed negligitur, sut pleris-, que locis ad Anan fluvium observavi) in Arborem justa magnitudinis

excrescit.

8. De MYRTO Theophrastus Histor. Plantar. l. 1. c. 5.

,, ὁ δὲ Μύρριν Φ μη ἀνακαθαιρό- Myrtus nisi sapius purgetur, in , μεν Φ·, ἐκθαμνέται.

9. Ergo vult natura esse Arborem & cultura conservari in Arborum genere, absque cultura tandem ex Arbore degenerare in Fruticem.

10. ILEX quoque COCCIFERA cultura coercetur in Fruti-

cum ordine.

11. De RVTA vero Tabernamontanus in seines Krauter-Buchs, 1ten Theile, 4. sect. 32. Cap. (p. 398. E, Francos. edit. 1613.) quod cul,, tura elevetur ad Arborum dignitatem, scilicet Rami & Stolones deputen,, tur argenteo cultro, & Florum conceptus defringantur.

" 12. Josephus item de bello Jud. l. 7. c. 25, testatur, Macherunte " vixisse Arborem Rutam ab Herodis tempore usque ad bellum Judaicum

" sub Vespasiano, Ficu non minorem.

13. An vero Iosepho credendum sit, dubitari posset, quia ibidem tra-,, dit sabulam de Baaras Radice, qua in valle Mocheruntis cum vita peri-,, culo eruatur & abigere valeat Damonia vivis immersa.

14. Denique & SALVIA cultura in Arbusculam grandescit, Ra-

mis inferioribus semper recisis.

#### V..

1. Planta Divisio in ARBOREM & HERBAM\* an Specifica sit, videtur quari posse. (a)

\* Cæsalpini de Plantis I. r. c. 13.

"2. MELONES enim in Peruvia plantati Radice ac Caudice "lignoso arborescunt, Arbore ad multos annos superstite, quemadmodum scribit Petrus Laurembergius Horticulturæ l. 1. c. 13. auctore forte Josepho Acosta Ind. Histor. l. 4. c. 19.

<sup>(</sup>a) Conf. Rivini Epistolam ad Rajum de Methodo Plantar. edit. Londin. p. 4. seqq. & hujus responsoriam ibid. p. 30. seqq.

"3. RICINVS annua nec rediviva Planta Penæ & Lobelio Adversar. p. 306. dicitur, (hoc est, ne Radicem quidem perennem habet, quæ novos producat Caules.)

"4. At in Creta multos perdurat annos, & in tantam excrescit al-"titudinem, ut non nisi scalis admotis conscendi possit, quod Bellonius

"tradit Observat. 1. 1. c. 18.

"5. Clusius item in maritimis Batica Ricinos crassitudine humana, "altitudine trium hominum, multis pragrandibus, ramis brachiatas & "multos annos durantes (hoc est, veras Arbores) observavit, easque ex"actissime congruentes descriptioni Dioscoridis.

"6. Vide ejus Scholia in Nicol. Monard, Historiam Simpl. Me-

dicam, ex Novo Orbe c. 4.

7. Præterea Instantia contra Species dari possunt ha:

"ANCHVSA Arborea apud Prosperum Alpinum de Plantis Exoticis l. 1. c. 32. qui Anchusam esse negat, non ob magnitudinem sed ob alias causas;

"Buchs 2. Theils 5. Sect. 11. Cap. (p. 263. init.) Caspar Bauhinus; "wächst bisweilen so hoch, wie ein ziemlichs Bäumlein, so kan man "auch Rohlen daraus brennen zum Büchsenpulver;

, 9. CARYOPHYLLVS Arborescens apud eundem Alpinum

dicti l. 1. c. 19.

10. CHAMÆNERION, sive Onagra, sive Antoniana, sive Epi,, lobium, & NERION alibi Frutex, in Creta trabes adissicis suppeditans, ut est apud Bellonium I, de neglecta Cultura Stirp. Problem. 12.

" II. CYANVS Arboreus tam Longifolius quam Latifolius apud

Prosperum Alpinum de Plantis Exoticis l. 1. c. 15. & c. 16.

12. EBVLVS, Græce Xauandn & SAMBVCVS, Ann, ex, quibus Sambucus Virgas multas fert a Radice, Ebulo vero Caulem Simplicem tribuit Cæsalpinus de Plantis l. 5. c. 13. init.; Bijugæ tamen in utroque Frondes & in utriusque Frustu Flosculi insident.

"13. GOSSIPIVM in Syria Planta annua; in Ægypto Arbor

perennis, de qua Prosper Alpinus I. de Plantis Ægypti c. 18.

"14. LINVM Arborescens ejusdem Alpini, de quo vide librum de Plantis Exoticis c. 10.

15. MALVA Arborescens, de qua jam olim Theophrastus Histor. Plantar. l. r. c. 5. scripsit,

,, μήν. မော် အထိχ. စီဝ၉ ထိုးထို ၁ ,, γίνε သီဆု, διο κဲ့ βακη ηρίαις ထံပါ ထိုင ,, χρη သီဆု.

longitudine & crassitie instar hasta grandescere, quare & ad baculi usum venire;

2. De

"16. PHASEOLVS, qui apud nos Herba Sarmentosa, in Ægypto "Arbor sit Sarmentosa, Vitis magnitudine, vel centum annos durans & perpetuo virens; ut testatur sæpius dictus Alpinus I. de Plantis Ægypti c. 20.

"17. PORTVLACA Hortensis, & Marina sive HALIMVS "Ramis lignosis. Radix hujus, imo tota Stirps per Hiemem vivax, pau"cis foliis destuentibus, apud Dodonæum Stirpium Histor. Pemptad.
6. l. 2. c. 10.

"18. SCABIOSA Arborea apud Prosperum Alpinum de Plantis

Exotic. 1. 1. c. 17.

"19. Et TITHYMALVS Arboreus sive Dendroides, qui in "Creta nascitur, ad duorum hominum altitudinem, crassitie coxa humana (sorte semoris.) Vide Bellonium Observat. l. 1. c. 17. & Prosp. Alpinum de Plantis Exoticis l. 1. c. 29.

#### VI.

1. PRÆDICAMENTIS BOTANICIS obstant etiam

MVZA, Arbor annua, hoc est, Caudice annuo & semel tantum fructisero, apud Oviedum Histor. Ind. l. 8. c. 1. cujus descriptionem Clusius etiam, sed Latinam a se sactam Notis suis in Garsia ab Horto Aromatum &c. Historia Epitom. c. 10. adjunxit. (a)

2. FICVS INDICA, qua magis differt ab Arbore, Frutice, Her-

ba, quam bac inter se;

3. & PALMA tam DACTYLIFERA quam NVCIFERA.
Non ita Ramos fert, ut alia Arbores.

#### VII.

1. Si omnis HERBA plura prater bina Folia profert e Fundo (e Radice).

antequam Caulem producat, Alfine non est Herba, & forsan multæ aliæ.

Contra Julium Cæs. Scalig. Exercit. 130. & Commentar. in Aristot. 1.1.

de Plantis (p.62. Genev. edit. 1566.)

(a) Confirmavit hoc aytoplia, ubi Mense Januar, hujus anni 1747. hæc in Horto Sereniss. nostri Principis, FRANC. IOSIÆ, Duc. Sax. hic Coburgi raro & jucundo spectaculo, sueessive in tribus singularibus plantis sloruic.

2. De Lilio Purpureo Dodonæus Stirp. Histor. Pemptad. 2. l. 2. ,, c. 2. initio: Folia circa Caulem multa, sed ante ejus exortum e Radicibas nulla. (hoc est, nulla e Radice Folia, ut in Lilio Candido.)

3. Deinde Caules qui anticipant Folia, oppugnant hanc Herbæ Definitionem, ut in Tussilagine. Observatione digna est Pullulatio hu-

jus Plantæ e Semine.

#### VIII.

Si Herba est, quæ Folia circa Caput Radicis profert ante Caulem, illa magis Herba est, vel etiam aliud nomen meretur ultra Herbam, quæ Folia ista Herbacea producit absque Caule, Caulem autem altero vel tertio demum anno, ut Cynoglossum.

#### IX.

Planta que Caule omnino caret, magis differt ab ea, que ante Caulem Foliosa est, quam hec ab ea, que non nist Caule Foliosa est.

#### X.

1. Si Simplicitas & Multiplicitas Caudicis Differentiam facit, Herba fub alterutro, Arbore vel Frutice comprehendetur.

Adversus Guilandin. de Papyr. membr. 1. sect. 19.

2. Atque ita maximum Divisionis vitium commissium suerit; niste eam solam Herbam dicant, que nullum unquam Caulem emittit, ut Filix.

#### XI.

- "1. Epicrates Comicus auditorium Platonis traducebat, quod in-"quireret Genus Cucurbita, utrum Arbor, an OLVS, an Herba foret, Athenæus l. 2. Δειπνοσοφ. (p. 59. D & fequ. liter. edit. Commelin.) versus illos servavit.
- 2. Aristoteles quoque, vel quisquis auctor sit, de Plantis l. 1. c. 4. ,, hisce 4. Summis Generibus; Arbore, Frutice, Herba, Olere, Plantarum naturam comprehendit.
  - 3. Nos Olus ullius Planta Genus esse negamus. (b)
- (b) Quæ circa genericam plantarum denominationem desiderari possint, hactenus docuit autor noster. Veras vero constituendi caracteris generici, & denominationis rationes docet. Cl. Linnœus in Fundamentis botanicis VII. It. in Critica botanica p. 1. sequeopiosius, nec non Cl. Chr. Gottl. Ludwig in Institutionibus regni vegetabilis P. I. Cap. IV. qui consuli queunt.

CAP.

#### CAPVT II.

#### DE INFERIORIBVS PLANTÆ SPECIEBVS. (c)

#### Argumentum.

1 Affertio in Plantæ Speciebus constituendis FOLIA porissimum consideranda esse docet. Sectiunculas habet 5.
2 quale SOPHISMA sit, cum modo Figura, modo Odor & Sapor consideratur. Sectiunc. 4.
3 DIFFERENTIAS quasdam ACCIDENTALES proponit. Sectiunc. 56.

#### I.

gis conveniunt, & five in illis discrepent, tamen in Speciebus maper tamen ad FIGVRAM respiciunt. Alius Florem & Fructum sive Semen; alius Radicem; alius Folia respicit.

Vid. Cæsalpin. de Plantis 1.1. c.12. & 13. & Spigel. Isagog. in rem Herbar.

1. 1. c. 55.

2. Ego autem potius FOLIA respicio, quia ea quavis sere Planta atate reperiuntur, & maxime perspicua partes sunt.

3. Radices enim, quamvis semper adsint, non tamen oculis prostant; Flores vero plurimi quidem pulcritudiue sua oculi aciem in se convertunt, at non diu videntur; Semina denique quomodo sita sint, propter summam eorum subtilitatem sapius ignoratur.

4. Interim non diffiteor, quod Floris & Seminis situs quandoque

magis cognationem arguat Speciei, quam Foliorum.

5. Ejus exempla habes evidentia in Ranunculis, Geraniis, Potamo,, getonibus, sc. Incubante, Plantaginifolia (est Potamogeton altera Do,, donzi Stirp. Histor. Pemptad. 4. l. s. c. 2) Crispisolia (sub Tribuli
,, Aquatici nomine a Clusio Rarior. Plantar. Histor. l. 6. c. ult. descripta)
& Angustifolia.

(c) In nominibus specificis constituendis quæ rejicienda, quæ admittenda, pluribus docent Cl. Linnæus in Fundam botan. VIII. & in Crit. botan. p. 146. 201. seqq. Const. Ejusd. Prolegomina ad Flor. Lapponicam p. 7. & Cl. Ludwig in Institut. regni vegetabilis Part. I. Cap. V.

#### . 8. Sellian profine decourt. Hinnis for minute fruita, Cinaras na-

1. Dum Botanici in Plantis nominandis & sub Genera redigendis modo Figuram considerant, modo præserunt Odorem & Saporem; est SOPHISMA Homonymia longinquum. Ideo non tam facile deprehenditur.

" 2. Ita Figuram in Moly Virginiano Caspar Bauhinus Pinac. Thea-

tri Botanici Appendic. ad pag. 75.

"3. Odorem & Saporem confiderat in Botry Mexicana, quam Figu-"ra alias Atriplici propriorem fatetur, dica Append. ad pag. 138. lin. 21.

"4. Rurlus Odorem negligit, quando inter Valerianas refert ali-

, quot Species Inodoras Pinac. dict. 1. 4. fect. 6.

#### III.

- 1. DIFFERENTIÆ a Spinis, Colore, Odore, Sapore, Facultatibus Medicis, Loco, Tempore Germinationis, Numero denique Florum vel Fructuum desumtæ ACCIDENTA-LES suut, & Speciem non variant.
- 2mlin 2mA-SPINIS ordiar: went where I again to seem with the contract ...
- 3. ACANTHUS Sativus Foliorum incisura, Kuzagiois sive, "Nucamentis, Thyrso, Floribus, convenit cum Silvestri. At hic Spinosus, "ille in Italia prorsus non Spinosus, in Gracia Kuzagia habet Spinosa, si "Dioscoridi credendum l. 3. c. 19.

4. ASPARAGVS Silvestris & Hortensistidem sunt sub eodem

Génerez di eta di arra ed la Morba delle sessona delle P. 1922.

-mel 19. Vti nec CHAMÆ DRYS Spinofa variat Speciem, Caspari

Bauhino in Phytopinac. I. 7. Sect. 1. in Chamædr. 4. descripta.

6. CINAR Æ nulla, inquir Dodonæus (Stirp. Histor. Pemptad., 5. 1. 5. c. 6. init.) vere Genera sunt. Num Aculeata & Spinosa Cina-, 7a, quam Carduum vocant (Itali Cardo) nonnisi degenerans Cinara est.; ex ejusdem siquidem Stirpis Semine utraque tam Spinosa quam Non-, spinosa nuscitur. Et paulo post: Cinara Folia & Coni Spinis carent, aut omnino paucis obsita. Post: Spinosa Cinara Foliorum angulos, & ,, Coni Squamas pungentibus Spinis armatas habet.

К 3

"8. Scilicet passim docetur, Seminis summitate fracta, Cinaras na-

9. In MESPILIS per insitionem Spina definunt. Vide Bauhin.

Pinac. 1. 12. sect. 1, in Mespil. 2.

10. PRVNVS Silvestris & PYRVS Silvestris Spinosa sunt, non

different tamen Specie a Sativis.

"11. ROSA sinc Spinis est quinta inter eas, quas Tabernamontanus Krauter Buchs zten Theils z. Sect. 100. Cap. (pag. 809.) describit,

"12. RVBI ID ÆI (Sindbeeten) Turiones tenelli Spinis quandoque "carent, ut Dodonæus habet Stirp. Histor. Pemptad. 6.1. 1. c. 2. initio.

"13. SOLANVM Pomi duri & striati ferax Casp. Bauhini, seu "Mala Æthiopica Dodonxi, habet in Caule aliquando, ut & in Foliis, "modo inferne, modosuperne parvos Aculeos, uti Bauhinus describit in Pinac. l. 5. Sect. 1. in Solan. 14. 2.

14. SONCHVS denique Spinosus & Lavis Specie non dif-

ferunt. All the light of the section of the section business

"15. A COLORE quidem apud Plinium l. 15. c, 30, post init.

"in TINO Differentia a Lauro ratio sumitur, quod, cum Lauri "Bacca sit Nigricans, Tinus Carulea inveniatur. Sed had ratio nullius est momenti. Vera ratio Generis discrimen ostendens in Tino est primo Parilitas Foliorum & Ramorum, secundo Vmbella.

16. Neque varii Colores in TVLIP Æ Floribus, aut Fruetu

MAIZI Indici Species discernunt.

17. Ex ODORE non esse distinguendas Species, argumento est

"SALVIÆ Species, que nonnisi rubro Flore & Absinthii Odore, disfert a reliquis Salviæ Speciebus, cujus meminit primus Caspar Bauhinus in Phytopinac. 1. 6. sect. 6. in Salv. 3. & in Pinac. Theatri in Salv. 4.

"18. Ita EQVISETVM Olidum (Sulfureo Canoso nimirum "Odore) Casparis Bauhini in Phytopin. l. 1. sect. 2. in Equis. ult. reliquis

Odore cassis accensetur. Vide & Pinac.

19. Alius Odor ROSÆ Moscatæ, alius Eglenteriæ. Rosa Lutea absque Odore est, & absque Viribus Medicis. Ajunt eam provenire Rosa Surculo Genisto insito.

20, LO-

120. LOCIS etiam Odores variantur & Sapores.

"21. CARPOCHENOPODE Fabii Columnæ Minus cogni-"tar. & Rarior. Stirp. Ecphraf. Part. 1. c. 60. & 124. (Alysso Germanico "Lobelii) elixa Pulmenti instar vescuntur Montani, & Pharmacopæi qui-"dam Boraginis usualis loco utuntur, teste Columna dicto c. 60. fin. & init. Apud nos Fætorem Cynoglossi quamvis remissiorem refert.

"vero, Locisque frigidioribus Odore penitus caret, ut Theophrastus tra-

dit de Causis Plant. l. 6. c. 28.

"23. OENANTHE, teste Athenæo Δειπνοσοφ.l. 15. (p. 689), lit. D. E. Commelin. edit.) copiosa in Cypri montosis gignitur (ex qua non praparat, quoniam inodora est Oenanthe, qua in ea provenit.

"24. SERPYLLY M vulgare minus, sive Sextum Casparis Bau-"hini pro cæli & Loci diversitate Odorem mutat & Inodorum reperitur: "& Septimum ejusdem aliquando Inodorum est, in Pinac. l. 6. sect. 4.

"zs. STACHYS Aquatica Tabernæmontani wächst an Was"sern viel. Da reucht die Wurzel nicht. Wächst auch unterweis"len auf den Ackern, die es oft gant einnimmt, da die Wurzeln lieb"lich riechen, wie der Benedicten (Caryophyllatæ.) Ita Caspar Bauhinus in Tabernæmont. Kräuter-Buchs 2ten Eheils 2. sect. 25. Cap.
(p. 100. lit. E & F.)

"26. TRIFOLII Bituminosi Semen Italicum in Germania pro-"fert Plantam Odore Bituminoso. At Semen Planta in Germania edu-"cata rursus satum, Plantam Sapore & Odore deficientem producit, uti

observat Caspar Bauhin. Pinac. l. 8. sect. 6. in Trifol, 1.

27. Nec SAPOR igitur Speciem variat.

28. AMYGDALÆ præterea Ducles & Amara. Ex Amaris, quomodo Ducles fiant, docet Theophrastus Histor. Plant. l. 2. c. 8. fin. & de Causis Plant. l. 1. c. 21. fin. & ex eo Plinius l. 17. c. 27. paulo post, init. Rursus nodsoes sive amputatione Amaras effici Theophrastus annotat. de Caus. Plant. l. 3. c. 24. fin.

29. Ita FOENICVLVM Marinum Sapore multum differt a

n30. Ad HELENIVM Helianthema five Flores Solis reducun-

tur a Casp. Bauhino Pinac. l. 7. sect. 4. sin. in Helen. 3. & sequ. At Helenium est Amarum, Helianthema Edules habent alia Radices; alia Fotia, aut Caules.

31. Ita PASTINACA Marina Sapore multum differt a Come

32. Ita PSYLLII forsan Species est Kali Roseum sive tertium Prosperi Alpini 1. de Plantis Ægypti c. 42, etiamsi Sapor longe discrepet.

Conf. Fragm. 3. c. 1. affert. 1.

"33. Ex P V NICIS Acidis Stercoratione Dulcia facere docet Plinius l. 17. c. 27. paulo ante finem. Confer. Theophraft. de Causis Plant. l. 3. c. 23. paulo post init.

"34. VIPERARIA sive Scorzonera alia Radices habet Subdul-"ces, nihil discrepantes a Radicibus Tragopogonis; alia Amaras Gentiana

instar. Casp. Bauhin. Pinac. l. 7. sect. 4. in Scorzon. Latifol. 1.

"35. A FACVLTATIBVS MEDICIS Botanici Auctores sæpius Differentias Plantarum sumunt, Dioscoridem secuti. Hic si a Figura potius quam Facultatibus Plantas descripsisset, tantum inter Botanicos nostros litigium non esset.

, 36. Ejusdem Speciei esse statuunt Pena & Lobelius

"Gucumerem Silvestrem & Sativum,
"Colocynthidem & Cucurbitas,
"Thapsiam & Ferulam,
"Crocum & Colchicum,
"Scammonium & Convolvulum,
"Soldanellam & Mentham,
"Hieracia & Chondrillam.

37. Hac a Dioscoride divulsa a se invicem conqueruntur in Pra-

38. Ita sub CONSOLIDARVM, Solidaginum, Symphytorum titulis diversissimi Generis Plantas proponunt, cum tamen Consolida nomen non magis Speciem designet aut Genus, atque Oleris nomen.

Conf. c. 1. affert, ult.

39. Ita sub SANICVLIS etiam Auriculam Vrsi comprehendunt,

"dunt, & Saniculam Alpinam luteam vocant\*, quia ad Enterocelas valet. Caule est nudo, in Vmbellam pendulam terminato.

\* Casp. Bauh. Pinac. 1. 6. fect. 6. Sanic. r.

40. Ita in SAXIFRAGARV M classem referuntur Vmbellifera varia, Caryophylli, Alfina, & alia.

Conf. Pen. & Lobel. Adversar in Bipinel. Saxifrag. (p. 321.)

"41. Colutea SEN Æ Genus non est, ait Bellonius apud Casparem "Bauhinum Pinac. l. IV. s. i. circa fin. in Colut. 1. cum nullas Facultates "cum Sena communes habeat.

42. Dodonæus CARDVOS qui nutriunt, hoc est Edules, ut est Scolymus; Medicos, quales sunt Carduus Benedictus, Carduus Maria, Eryngia, Carlina; & Venenatos, quibus accenset Chamaleontem nigrum, uno libro (Pemptadis 5 quinto) complexus est contra librorum reliquorum dispositionem.

43 Verum enim vero ex Differentiz magis sunt Essentiales, que minus Locis & Tempore variantur. Atqui Efficacia illa hoc est vel nocendi vel commodandi Animalibus Potentix) variantur, quemadmo-

dum Odores & Sapores, & præterea respectivum quid sunt.

44. PANIS Homini est Salutaris; Accipitri Venenum:

45. CICVTA Homini Venenum; Coturnici Cibus, ut Aranea Gallinis.

"46. Ita PERSEA apud alios Venenatum Fructum, in Ægypto "Suavem & Salubrem fert. Vide Dioscorid. l. 1. c. 188.

47. Ita PAPAVER in nostro Climate non præbet Opium.

48. Nec ALOE Succum quem in India, quamvis in Italia Flores proferat.

49. ALOCO non variari Species ex sectiunc. 20 & seq patuit.

Nunc adde Hortensis, Campestris, Silvestris, Marini Differentias.

50. A TEMPORE GERMINATIONIS non sumendam Specierum diversitatem vel hinc patet, quod CYCLAMINI Species quædam Vere, quædam Æstate, quædam Austumno & Vere storeant.

51. A NVMERO denique Florum vel Fructuum non discerni Spe-

cies hinc oftenditur, quia Plurimos eodem Petiolo Flores fert.

PERICLYMENON; Binos XYLOSTEON utrumque Dodonai Pemptad, 3, 1, 3, c, 24. Periclymenon utrumque fert Baccas eo-

dem

3

dem Petiolo Plures in Vvam compactas; Xylosteon majus Binas; Minus Singulas Singulis Petiolis: Et tamen hæ omnes Plantæ propter alias similitudines eadem comprehendi debere Specie videntur.

"52. Ad Accidentales hasce Differentias refer CANITIEM.

"53. CYTISVS Lobelii PRIOR Stirp, Adversar. (p. 387.) five Cytisus Incanus Siliqua longiore in Hortos translatus Canitiem amittit. Casp. Bauhin, in Pinac. 1. 11. sect. 1. init. in 4.

54 Item DIFFERENTIAS, interdum & LVSVS NA-TVRÆ, in FOLIIS, quæ non videntur Speciem semper mutare.

55. Experimentum fieri posset serendo SERRATVLAM ali-"quot annis in variis locis. Quatuor enim ejus Differentias in Foliis ita notat. Caspar Bauhinus in Pinac. l. 6. sect. 5. circa fin., ut tamen Speciem ideo non variari tacite quasi innuat.

"56. MOLLEA (Arbor Peruana) dum juvenis est, Marginem "Foliorum Crenatum, adulta integrum habet, teste Clusio in Scholiis ad Nicol. Monard. Histor. Simpl. Medicam. ex Novo Orbec. 24. Confine Come Paster (Confine Come Pa

fer ejus Curas Poster. (p. 94. edit. Lugdun. Batav. 1611.)

# FRAGMENTVM II. DE NOMINIBUS PLANTARUM.

#### Argumentum.

Affertio nimium studium Plantas ad VETERVM NO-MENCLATVRAM referendi improbat. Sectiunctulas habet 2. NOMINA, unde alterius Speciei opinionem concipimus, præsertim a LOCIS sumta, rejicit. Sectiunc.

Sæpe ex falsa PESVASIONE Plantas nominari oftendit. Sectiunc. 3.

Ĩ.

Dodonæus Stirpium Hist. Pemptad. 6. l. 2. c. 13. fin. de Vacciniis:
In tanta Veterum brevitate quid poterit certi adferri, aut statui?
2. Opor-

2. Oportet ergo, ut istud studium omnes Plantas ad VETERVM NOMENCLATVRAM referendi ne sit nimium.

#### H.

1. NOMINA hæc Frauenmung, Maurrauten, Bundrauten, Geißrauten nullius sunt pretii, quia alterius Speciei opinionem nobis afferunt.

2. Tale etiam est Nomen Romisch Salben &c.

3. Non enim Didacticum & Philosophicum est, a LOCIS FOR-TVITIS denominare Plantas.

4. Loca Fortuita appello, ut Indiam, Pannoniam, Salmanticam,

Zacynthum, Montispessulum &c.

5. Pena & Lobelius Stirpium Adversar. p. 83. (Antverp. edit. ,, 1576.) de Condrilla Marina Bulbosa: Si Athenis nobis dono missa fuisset, ,, haud tamen continuo magis Atheniensium, quam Monspeliensium Narbo, nensiumve Cichorium nuncupanda fuisset.

6. Prastat ergo denominare Plantas a Figura & aliis Accidentibus

per se competentibus.

7. Onomatopæia enim a Regionibus & ceteris Locis sunt intuta.

"8. Alcea Vesicaria malo dicere cum Dodonzo (Stirp. Histor. Pempt. 5.1. 1. c. 32.) quam cum aliis ALCEA VENETA.

"9. Clematis Daphnoides Plinio teste 1. 24. c. 15. aliis CLEMA-"TIS ÆGYPTIA dicebatur. Sed quid attinet Ægyptiam cogno-

minare, cum in Germania multis Locis, etiam Rostochii crescat?

"10. Totam-Sanam, seu Androsamum Dodonai, Itali SICILIA-NAM vocant, quia în Sicilia sola crescere existimant, cum tamen plu-"rima reperiatur in Anglia silvis & nemoribus, testibus Pena & Lobelio, Stirp. Adversar. (p. 280. init.) Ipse eam sponte nascentem in Euganeis reperi.

#### III.

I. Nomenclatura sæpe est ex falsa PERSVASIONE.

2. Vr.: ACORVS dicitur Kalmus, quia putabatur esse Calamus Aromaticus, a Tabernæmontano Kräuter-Buchs 2ten Pheils 7., sect. 1. Cap. (p. 354. Francof. ed. 1613.) dicitur Afermurz (vinose mimpressum Afferwurz.)

Vid. Matthiol. in Diofcor. 1, 1. c. 2.

3. Ita CENTAVRIVM creditum est Nomen habere a centum , aureis, unde Zausendguldenfraut dicum; quod a Chirone Centau-, ro cognominatum scribit Plinius 1. 25. c. 4.

#### FRAGMENTVM III.

DE

## HOMOIDIA IN QVIBVSDAM

#### PLANTIS NEGLECTA.

PORTIONIS I.

DE PLANTIS QVIBVSDAM HOMONYMIS JVXTA ALPHABETI ORDINEM,

CAP. I.

five

## Litera A.

#### Argumentum.

1 Affertio indicat, quænam Plantæ male conveniant ABROTONI nomine.

			Sectiuncu	las habet	3.
2.	quæ	ACANTHI			-
	•	ACERIS			
-		ACETOSÆ	2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		ACONITI nomine.	Sectiunc.	٠.	7.
3	que	ADIANTI.			
4	quæ	ALSINES.	Sectiunc.		7,
5	quæ	ANONIDIS	State of		
	-8c	ANTHYLLIDIS.	Sectionc.	Stilling Still	7.
6	quæ	APII.	1 11-19	1 317 .	'>
	_	14	Sectiunc.		4.
7	que	ASPERVLÆ.	400		-

I. five

#### I. five AB.

1. ABROTONVM FEMINA, five Sanctolina, five Chamæcypariffus, non est ejusdem Speciei cum Abrotono MARE, etiamsi

Dioscorides 1.3. c. 29. sub eodem nomine conjugat. (d)

"2. Abrotonum LATIFOLIV M Tabernæmontani Rråuterb. "1sten Theils 1. sect. 11. Cap. (p. 51.) sive Inodorum & Insipidum, vul-"tu, Folio, Flore & Semine Artemisia Tenuisolia esse, scribit Lobelius in Stirp. Observation. p. 444. (Antverp. edit. 1576.)

3. Cur ergo non potius Artemisia Fatua dicitur?

#### II. five AC.

I. ACANTHVS GERMANICVS & ITALICVS

(Teutsch und Welsch Barenklau) diversissima funt Species.

2. ACEREM Majorem Galli Plasne (Plane) vocant, & Minorem, Erable. Quod si PLANTANVM quoque Plasne vocant, labuntur in idem vitium, in quod Germani, dum Platanum Belsch Albern appellant, & Acerem Minorem quidam Mahsholver.

3. (Item Saxones distinguunt Lohnen & Ahorn.)

"4. ACETOSÆ (Saurampfer) Species Fallæ: Buchampfer, "Saurkleh Tabernæmontani Kråuterb. 2ten Theils 4. sect. 29. Cap. (p. 237.)

5. ACONITVM BACCIFERVM, sive Christophoriana non est Aconitum, quia Triangulata est Foliatura & Baccifera; Flores

funt Vniformes parvi ex Foliis compositi.

6 Aconitum Foliatura Singulari, Simplici, aut inter Laciniatam & Digitatam ambigente: Flos Cucullatus aut Galeatus; Semen in Siliquis

ternis coaptatis.

7. Aconitum HIEMALE est Flore Ranunculorum, Siliquis ternis aut quaternis Lycoctonon æmulatur, situ Folii singulare ad Anemonas accedit, quemadmodum & Radice Tuberosa. Ergo non pertinet ad Aconita & Napellos ceteros. Confer. Dodonæum Stirp, Hist. Pemptad. 3. l. 4. c. 10.

III. five AD.

ADIANTVM AVREVM (Guiden Wiedertoht) nec ADI-L 3 100 200 ANTVM

<sup>(</sup>d) Linnæus Crit. botan. p. 188.

ANTVM est, nec Trichomanes, (Wiedertoht) quia Caulem habet, cum illorum neutrum Caule præditum sit.

#### IV. five AL.

\*ALSINES Species non funt ALSINE HEDERACEA & Alfine TRISSAGINEA, ut vel ex Floribus constat, quorum Foliola in Alfines veris Speciebus sunt profundissime secta, in his non sunt secta.

2. Deinde Hederacea & Trissaginea in inferiore parte Cauliculorum Pariliter Folia & Germania gerunt; in superiore Sigillatim.

3. Etiamsi utraque libenter Gallina vescantur, non tamen Alsine &

Alfine Hederacea unius funt Speciei.

"4. ANDROSACES alterum Matthioli non est Alsines Species, "ut Pena & Lobelius putant in Stirp. Advers. p. 166. med., neque Al"sina assine, ut Caspar Bauhinus Pinac. l. 7. sect. 1, in Alsin. 16,

5. Folia ad Plantaginem accedunt, nisi quod Denticulata. Flores

non sunt Fissa Fronte, ut Alfinarum Folia.

- 6. Caulis determinate Foliatus, quod non est in Alsine: Fundo Folioso, quod itidem non est in Alsine, sed in Plantagine. Vide Clusium Rarior. Plantar. Histor. 1. 5. c. 32.
- 7. SPERGVLA quoque non est Alsine Species, ut Fabius Columna minus cognitar. Stirp. Ecphras, part. 2. c. 34. fin., & Caspar Bauhin, Pinac, 1. 7. sect. 1. post Alsin. 18. existimant.

#### V. five AN.

- 1. ANONIS NON-SPINOSA, si rece pingitur a Clusio Rarior. Plantarum Histor. l. 1. c. 67. & Tabernæmontano Rrauterb. 2ten Theils 4. sect. 31. Cap. (p. 240.) Foliis nimium quantum discrepat ab Anonide.
- 2. Folium enim a lata basi in angustum deductum, rursus in bina Folia sinditur, æqualia vel inæqualia, interdum in unum.

3. Observandum an tanta sit convenientia in Floribus & Seminibus.

"4. Miror Clusio missam esse nomine Trifolii Fætidi, item Clusium "scribere, quod tota facie Anonidem vulgarem referat.

"5. ANTHYLLIDIS Species non est Anthyllis LEGVMI-"NOSA VTRAQVE Dodonzi Pemptad. 4. l, 3. c. 22. & Lobelii "Stirp. "Stirp. Observ. (p. 530.) quarum posterior Glaux Dioscoridis dicitur Lobelio Observat, dictis p. 526.-& Clusio Rarior, Plantar, Hist. 1. 6, 5, 50.

"6. Plinius l. 21. c. 29. & l. 26. c. 8. paulo ante finem Anthyllion

vocat ab ar 96 deductum ea forma, qua ab eid fit eiduxior.

"7. LENTIFOLIA quoque vel Peptidos facie Penæ & Lobelii Stirp. Adversar. (p. 195.) rejicienda videtur, quia non est Diblastos.

#### VI. five AP.

p. 405. & Dodonæi Pemptad. 5.1.4. c. 2. seu Palustre Apium, quod Officinis absolute Apium dicitur, si recte pictum est a Lobelio & Dodonæo.

2. Si enim verum est, idem esse Casparis Baubini & Lobelii, Dodonaique, hi non recte pingi curarunt, quia pingunt Pennatis Ramastris, cum Baubinus in Matthiol. ad Dioscoridis 1. 3. c. 64. pingat Cuneatis sive Triangulatis Ramastris, quamvis Petiolis curtioribus quam in Hortensi vel Macedonico.

"3. DAVCVS PALVSTRIS Gesneri I. de Hort. German,

videtur Folia Tenuiora habere, quam ut Apiis accenferi poliit.

4. SIV M (Wassermerck) perperam quoque Apium Aquaticum & Apium Palustre dicitur, quia Folia Sii prorsus Pennata sunt.

#### VII. five AS.

"ASPERVLA AVREA sive Cruciata Minor Lobelii Stirp. Observ. p. 467. (Golden Balmeister) quaterna in Geniculis habet Folia. Non itaque ad Asperulam ODORATAM seu Hepaticam Stellarem referenda est, sed potius ad Rubiam Taurinensem ejusd, ibid. p. 465. quæ itidem, quia Quadrifoliis est Geniculis, Rubiis accenseri non debet.

#### CAP. III.

five

## Litera B.

Argumentum.

1 Affertio que BALSAMINÆ nomine male congruant, designat.

qua BELLIDIS nomine.

Sections.

I. five

#### I. five BA.

"1. PALSAMINA Repens, five MAS, five Cucumerina Lobelii Stirpium Observat. p. 369. five Momordica, non recte sub ean, dem Speciem refertur cum duabus CATANANCIS a Casp. Bau, hino in Pinac. l. 8. sect. 3, in Balsamin. 1. 2. & 3.

2. Eadem Charantia Dodonzo Pemptad. 5.1. 2. c. 8. inepte dicitur.

3. Balfamina Mas & FEMINA itidem Falfæ Species. Illa est Amplexicaulis, Floribus Rofaceis; hæc Recticaulis, Floribus Hiantibus & Caudatis.

II. five BE.

1. BELLIS MAJOR Folioso & Ramoso est Caule, & Genere diversa, quæ potius cum Chrysanthemo convenit, nisi quod Florem habet Bicolorem, Disco scilicet Luteo, Ambitu Albo, cum quo etiam Foliis convenit potius, quam cum Astere Attico sive Amello.

#### III. five BR.

"I. BRASSICAS inter (Rapa, Erucas, Sinapi, Lampsanam &c.) "male a Cæsalpino de Plantis l. 8. c. 60. refertur ISATIS, si fingula "habet Semina in Vasculis sive Folliculis.

"2. Illorum enim Vascula Seminum Membranaceo Septo dividun-

, tur in duas Cavitates, ut idem l. g. c. 53. habet.

"3. Caspar Bauhinus quoque pingit unum Semen in laxo Folliculo in Tabernæmontani Krauterb. 2ten Theils 11. sect. 21. Cap. (p. 436.)

4. Præterea Flosculi Isatidis non quaternis sed quinis potius Fo-

liolis pinguntur ab eodem Bauhino dict. loc.

#### CAP. / III.

five

## Litera C.

Argumentum,

1 Affertio qua CALIOS CAPPAREOS

& CARDVI nomine male congruent, recenfer. Section culas habet it.

2. 14€

quæ CENTAVRII nomine.
quæ CHAMÆDRYOS
CHELIDONII
& CHRYSANTHEMI.
Sectiunc.
6.
quæ CISTI.
quæ CLEMATIDIS.
quæ CORONOPODIS
& COTYLEDONIS.
Sectiunc.
8.

#### I. five CA.

"I. CALI TERTIVM Prosperi Alpini I, de Plantis Ægypti c. 42. quod Ægyptiis proprium dicit, nihil commune habet cum aliis Calibus præter Saporem & Vsum.

2. Folia & Germina Geminatim sita, si iconi credendum, & exte-

rior Floris forma satis cum Psyllio convenit.

3. Quod si scrupulosior anatomia Floris & Seminis concederetur, judicari posset, utrum Psylliis accensendum. Nam Sapor nil obstat, uti jam pro Postulato posuimus Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 1. & 27. seq.

"4. CAPPARIS LEGVMINOSA Lobelii Stirp, Observ. "p. 511. five Capparis Fabago Dodonxi Pemptad, 6. l. 1. c. 7. male dicitur CAPPARIS, a qua longe diversa.

5. Nam Capparis vera tam Acutifolia quam Obtusifolia Pariliter

nec Flores fert nec Folia, nec Ramos.

6. Hac vero Petiolo crasso Bina seu Parilia Folia in extremo Petio-lo crassiuscula instar Portulaca.

7. (Non est autem Portulaca, quia hac Sigillatim profert Folia.)

8. Petioli tam Foliorum quam Florum Pariles (Gepaart.) Flores etiam diversi videntur.

9. Nam Leguminosæ Flores similes dicuntur Cappareos Floribus

cantum conditis.

10. CARDVIS EVPHORBIVM, quod Ficui Indica five Tuna five Opuntia cognatum est, accensetur a Caspare Bauhino Pinac. 1. 10. sect. 6. circa finem.

M

II. Sed Spinosum esse est accidentarium, uti jam id asseruimus Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 1. 2. sequ.

#### II. five CE.

CENTAVRIVM MAJVS & MINVS nomine perperam conveniunt.

#### III. five CH.

- "r. CHAMÆDRYS MONTANA Clusii Rarior. Plantar. "Histor. l. 3. c. 46. sive Alpina Josiæ Simleri commentar. de Alpib. sub sin. cap. de Alpinis Frutic. & Herb. (fol. 130. b) prorsus CHAMÆ-DRYS non est, ut ex Flore & Semine constat, utut Foliis similis sit aliquo modo. Restius itaque Herba Cervi dicitur, vel Cervaria (Hirst) wurz.)
- "2. Chamædrys SILVESTRIS Dodonæi Pemptad. 1. l. 2. c. 26. five Teucrium Pratense, Flore est Foliis quatuor constante, cum Teucrii & Chamædryos Flores sint Labiati.
- 3. CHELIDONIVM MAJVS & MINVS Equivoca casu funt.
- "4. Illud enim dicitur, quod Hominibus ab Hirundine, (quæ "Xeludov Græcis dicitur) oftensum sit, quippe quæ Oculis Pullorum ea "medeatur, vel quod sub adventum Hirundinum exoriatur, earumque de-"cessu emarcescat, teste Dioscoride l. 2. c. 211. fin.

"5. Hoe, quod sub adventum Hirundinis floreat. Theophrast.

Histor. Plantar. 1. 7. c. ult. Species forte est Monadica.

"Esosfersen, quod Chrysanthemum LATIFOLIV M vocat Pemptad. 2. l. 3. c. 21. cum reliqua Chrysanthema Sigillatim proferant Folia & Ramos.

Conf. c. 4. affert. 3.

#### IV. five Cl.

CISTVS MAS QVINTVS Clusii Rarior. Histor. 1. 1. c. 45. sive Sinuatis & Fimbriatis Foliis longe differt a RELIQVIS.

V. five

#### V. five CL.

CLEMATIDIBVS accenseri non possunt que non sunt Amplexicaules, hoc est, que adminiculis nullis egent, uti est Clematis COE-RVLEA PANNONICA, & FLAMMVLA Surrecta.

#### VI. five CO.

"I. CORONOPVS non est Herba STELLA, quam reclius "Cornu Cervinum vocare Dodonæus Pemptad. I. l. 4. c. 24. videtur. Ego Cervicornem Historiacien.

2. Similior enim est Cornu Cervi. Contra Coronopus, quem Bernardus Paludanus in Asia vidit, (ut Dodonæus loc, dich. refert) & qui in Codice Dioscoridis Casareo depictus est, Cornicis pedi valde similis.

"3. COTYLEDON MAJOR Casp. Bauhini Pinac. 1. 7. "sect. 5. in Cotyled. 1. sive prima Dioscoridis juxta Dodonæum Pemptad. 1. 1. 5. c. 12. & alios, sive Vmbilicus Veneris, diversa est a reliquis omnibus, tam MEDIA quam MINORE, unde communi nomine non debebant comprehendi.

4. Primo enim Folia hahent Cava & centro sui Petiolo harentia.

"5. Illud λεληθότως μοϊλου (latenter cavum sc. Folium) apud Dio"scorid. l. 3. c. 92. non pertinet ad Cavitatem illam Acetabuli instar, sed
ad Cavitatem quæ videtur in Petiolum quasi intrare.

6. Secundo Flores sunt una Lamina, Cavi & Penduli instar Tin-

"7. SEDVM MAJVS VVLGARE Clusius Rarior. Plan-"tar. Histor. l. 4. c. 43. alteram Dioscoridis Cotyledonem esse contendit. Sit ita. Non tamen ideo Cotyledon est.

8. Convenit enim magis cum Sedo Magno & reliquis, ob Flores sex

Foliis Stellatim constantes, quam cum Coryledone prima.

#### VII. five CR.

CRITHMVM VMBELLIFERVM & CRITHMVM CHRYSANTHEMVMGenere non conveniunt; utut Sapore, aliisve Viribus conveniant.

#### C A P. V.

ton five a make "

## Litera D.

#### Argumentum.

#### Affertio qua DENTIS LEONIS

	& DENTARLE nomine	perperam conveniant, in-	
	dicat.	Sectiunculas habet 3.	
2	 quæ DISPACI.	Sectiunc. 2.	
3	quæ DORONICI.	Sectiunc. 2.	
4	 quæ DRACONIS.	Sectiunc. 2.	

#### I. five DE.

"1. DENS LEONIS TERTIVS Dodonai Pemptad. 5. l. 1. c. 16. & Tabernamontani Rrauterb. part. 1. fect. 5. c. 24. (p. 497.)

• d Hieracia vel Cichoria vel Sonchos est referendus.

2. A DENTARIIS sejungendas censeo Dentarias APHYL-"LAS, sive Orobanchas Coralloide Radice; & ANEMONEN TRI-"FOLIAM Dodonæi Pemptad. 3. l. 4. c. 7. quæ est Dentaria Alba

"Brancionis apud Lobelium Stirp. Observat. p. 149.

3. Reliquæ in eo conveniunt, quod Florem gerunt & Siliquas instar Leucoii, Caulem absque Ramis, Radicem Nodosam, Squamosam sive Denticulatam, Foliaturam habent Fissam non Pennatam, hoc est. Terna, Quina, Septena Folia ex eodem termino, vel saltem ex exortibus, sive principiis, sive aptationihus, non multum distantibus.

#### II. five DI.

"I. DIPSACVM SATIVVM & SILVESTREM cultura "tantum mangonio differre scribit Dodonaus Pemptad. 5. l. 5. c. 16. init.

2. At ille oppositis Foliis est Coëuntibus sive Continuis, instar Per-

foliatæ; Hic non ita.

#### III. five DO.

"I. DORONICVM GERMANICVM (Wolferlen) & "PANNONICVM Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 8. sive Alisma Folio Plantaginis, sive Doronicum Radice Geniculata vel Scorpioide

pioide (Kovónfovov) non recte DORONICIS accensetur, cum Doronica reliqua Sigillatim; ista vero Pariliter Folia & Germina proferant Conf. c. 3. assert. 3. sectiunc. 6.

2. Seductus hac in re Caspar Bauhinus est a Clusio, Pinac. l. 5. fect. 4. in Doron. 5.

#### IV. five DR.

DRACO (Draguhn) non est sub uno genere cum PTARMI-CA sive Pyrethro, ut videtur sentire Dodonæus, quamvis languide, Pemptad. 5. 1, 4. c. 18. init.

2. Est Monadicum Genus, Flosculi Draconis inspiciendi sunt.

#### CAP. V.

five

## Litera E.

#### Argumentum.

1 Affertio, qua	ELATINES.	nomine male congruant, oftendit.
2 . quæ	ERYNGII.	Sectiunculas habet 3.
	ESVLÆ.	Sectiunc. 2.
4 qua	EVPATORI	I. Sections. 16.

#### I. five EL.

"1. FLATINE TERTIA Tabernamontani Rrauterb. part. 2. sect.
11. c. 3. (p. 413. & 414.), discrepat a duabus PRIORIBVS,
quia Geminata sive Pariliter sita habet Folia.

#### II. five ER.

"1. ERYNGIVM QVARTVM Dodonai Pemptad. 5. 1 5. "c. 13. Crithmi Generibus adscripsit Matthiolus in Dioscorid. 1. 2. c. 122.

"2. Alii ERYNGIIS adnumerant, quod probat Dodonæus, "cum Odore & Sapore non Crithmum sed Eryngium referat.

3. At, inquam ego, Figura potius attendenda. Figura vero ratione nunquam erit Eryngium.

M 3

III. five

#### III. five ES.

"I. ESVLA RARA VENETA sive Turbith Venetum, Magna, Lata habet Folia, Geminatim sita, Laste Glutinoso reserta, ab Lobelio in Stirpium Observationib. p. 201. persecius depicta, quam in Adversariis p. 160.

2. Non est accenfenda ESVLIS aut Tithymalis, quia Ramos ac

Folia Geminatim profert, & Flores non per Vmbellam.

#### IV. five EV.

"1. EVPATORII VVLGARIS sive Cunigundine prime Tabernamontani Rrauterb. part. 1. sect. 4. c. 18. (p. 343. & 344.) Flos constat quidem paucis Flosculis, sed Vmbella densa Surculis subdivisis numerosis constat Floribus. Vel quadraginta aut plura gerit Capitula.

2. Capitulum quodvis Perianthio ex aliquot Squamulis e Viridi

Purpureis composito vestitum,

3. Meditullium est compositum ex quinis vel fenis dilute Purpu-

reis Flosculis Cavis; quilibet Flosculus Semini suo insidet.

4. Apici Seminis cujusque longi Villi inhærent Candidi, æquantes fere Flosculi (absque Stylo) aktitudinem, & undique eum ambientes.

5. Flosculus Marginem quinque Laciniis Brevibus Fissum habet.

6. Ex fingulis Flosculis prominet Stylus Candidus Bifidus.

"7. Cunigundina igitur hæc a RELIQVIS DVABVS Tabernæmontani & Casparis Bauhini Genere differt.

8. Secunda enim & Tertia Species hoc habent commune, quod

Flori subjiciantur quinque Oblonga Viridia Foliola.

9. Secunda Flos ex Disco & Margine constat, Margo Foliis octo Luteis: Discus Cavis Flosculis Luteis, in quibus singuli Styli.

10. Folia Frondea Oblonga, Serrata (Non filla) ex adverso posita

five Bijuga.

11. Tertia Folia Frondea Trifida aut Multifida, quemadmodum Prima.

12. Semina Subnigra post Floris interitum, adhuc arcte compressa Capitulum constituunt ex Luteo Nigricans, & Cuspidem deorsum, Basin sursum conversam habent,

13. E Basis medio erigitur Curtus Stylus, qui summitate sua Floris quasi marcidi Luteas reliquias ostendit.

14. Basis extremis singulæ Cuspides aut Denticuli insistunt, dupli-

eique serie Spinarum deorsum tendentium instructi.

15. Hinc fit, ut & Capitulum totum ex Seminibus constans & Semina singula Vesti Lanea bareant (als Tuch, ja auch auf Bruggisch oder Riffelisch Bohmseide oder Sajen.)

16. Flosculi ipsi Lutei, singuli singulis Seminibus inhærentes sunt Parvuli, ita ut altitudo Flosculi altitudinem Hamati Spiculi non superet.

## CAP. VI.

## Litera F.

Argumentum.

Affertio que FICVS INDICA nomen perperam commune has beant, oftendit.

AXINI.

MARIÆ.

Sectiunculas habet 2.

Sectiunc.

4.

Sectiunc.

2. que FRAXINI. quæ FVMARIÆ.

#### I. five FI.

#### 1. A FICV INDICA five Tuna differt EVPHORBIVM, quod illa Ramofa est.

Conf. c. 3. affert, 1. fect. 10.

2. Deinde Euphorbii Folia forsan Fructus potius sunt.

#### II. five FR.

1. FRAXIN1 Species genuina non est ORNVS, sed potius Sorbi, contra quam cum Portal. 2. Aeris transmut. c. 18. Dodonæus Pemptad. 6. l. 4. c. 13. init. existimat.

2. Nam neque Flore convenit cum Fraxino, neque Fructu.

3. Ornus fert Vmbellam Florum & Baccas; Fraxinus Racemos & Ligulas five Siliquas.

" 4. Non tamen nego quin Ornus fit Fraxinus Montana Theophrasti Histor. Plantar. 1.5. c. 11. circa fin.

III. fi-

#### III. five FV. 19 600 M

- 1. FVMARIA BVLBOSA five Radix Cava (Sohlmur;) & Fumaria VULGARIS Radicibus different, in ceteris satis conveniunt.
- "2. Fumariam BVLBOSAM MINIMAM Tabernæmontani Rrauterb. part. 1. sea. 1. sin., (p. 95.) sive Fumariam Moschatam rectius "ad Ranunculos refert Caspar Bauhinus Pinac. 1. 5. sect. 3. in Ranunc. Nemoros. 4.

#### CAP. VII.

five -

## Litera G.

#### Argumentum.

1 Affertio qua GENISTA nomine perperam commune habeant, indicat. Sectiunculas habent 2.

que GRAMINIS

& GRATIOLÆ nomen. Sectiunc.

6.

#### I. five GE.

"1. GENISTELLA PINNATA Lobelii Stirpium Observation. p. 534. sive Chamagenista Peregrina Clusii Rarior. Plantar. Histor. 1. c. 71. solo Flore convenit cum GENISTIS & Caulis lentore.

"2. Multum eriam a reliquis discrepat SPARTVM APHYL-

LON Lobelii dicti libri p. 535.

#### II. five GR.

I. GRAMEN LEVCANTHEMVM forte rectius diceretur Alfine Graminea, vel Alfine Prolixifolia.

2. De PARNASIO Gramine jam monuerunt Pena & Lobelius

in Adversariis p. 4.

"3. Parnasium, inquiunt, Dioscoridis Gramen sic dictum magis propter Pastionem salubrem & opimam, quam propter similitudinis comparationem, quia facie longe alia (Folio nempe Hederaceo & Flore Albon, est) proxime Chelidoniam Minorem & Cochleariam relegamus.

, 4. Alie-

"4. Alioqui posset quis ex Vulgi usu Burgundicum Fænum dictum, "Cytisum, aliaque Loti & Trisolii Genera Pabulo laudatissima, Gramina "vocare & buc advocare;

"s. Eadem prorsus ratione & consuetudine plebeja, que ansam de-"disse etiam Plinio (l. 24. circa finem) videtur enumerandi quedam Ai-"zoi Vrentis essigie Gramina, quorum alterum DACTYLON voce-

,, tur &c.

"6. GRATIOLA MINOR Gesneri in libel. de Collectione Stir-"pium, sive Hyssopisolia Casparis Bauhini Pinac. l. 6. sect. 4. Hyssop. ult., in ejusdem Bauhini Matthiolo in Dioscorid. l. 3. c. 26. sin. depicta & descripta, non est GRATIOLA, quia non est Bijugis Foliis, nec Floris forma ad Flores Gratiola accedit.

#### CAP. VIII.

five

## Litera H.

#### Argumentum.

Affertio que HELLEBORI nomen perperam commune habeant, recenfet.

quæ HIERACII.

quæ HORMINI. quæ HYACINTHI POETICI

& HYSSOPI. Section culas habet 6.

#### I. five HE.

"I. HELLEBORVS ALBVS, Helleborus NIGER qui THEO-PHRASTO, & Helleborus Niger, qui DIOSCORIDI tribuitur a Dodonzo Pemptad. 3. l. 2. c. 29. & 30. æquivoce nomine eodem fruuntur.

#### II. five HI.

Ab HIERACIIS secernantur omnes Herbæ quæ SIMPLICI CAV-LE. Hæ enim ad Dentem Leonis sive Taraxacon referendæ.

III. five

#### III. five HO.

"HORMINVM LVTEVM sive Orvala Tertia Dodonai Pemptad. 2. l. 4. c. 24. sive Officinarum Gallitricum Luteum (Gelbe Schars, lach;) & ORVALA SILVESTRIS sive quarta Orvala Species Dodonai disto loco, videntur esse sub eodem Genere proximo, non autem HORMINI nomine appellanda.

IV. five HY.

- "I. HYACINTHI POETICI nomine non poterunt, contra ac "Lobelius Stirp. Observat. p. 48. seq. secit, communiter comprehendi "IRIS BVLBOSA PRIMA, SECVNDA, TERTIA Ciusii Rarior. Plan, tar. Histor. l. 2. c. 44. & SISYRINCHIVM ejusdem utrumque dicti libri c. 45.
- 2. Tum aliis de causis, tum hac, quod *Iris* secunda & tertia & manifestius prima deorsum reflexorum Foliorum Floris Frondem Bisidam seu Fissam habent; Sisyrinchium vero utrumque Folia ista Integra.

3. HYSSOPVS GRÆCORVM, si Dioscoridis l. 3. c. 32. de Origano Heracleotico & c. 33. de Onetide, item l. 4. c. 55. de Chrysocome

confulamus, longe diversus est ab Hyssopo OFFICINARVM.

" 4. Ita quoque cum Pena & Lobelio in Stirpium Adversar. p. 212. Caspar Bauhinus in Matthiol. ad Dioscorid. l. 3. c. 26. sentit contra

ipfum.

5. GRATIOLA MINOR, de qua cap. 7. affert ult. fin. dicebamus, nec Hyssopi Species est. Ideo etiam a Caspare Bauhino non Hyssopus sed Hyssopi folia vocatur. Non enim Foliis est Bijugis nec Floris forma ad Flores Hyssopi accedit.

#### CAP. IX.

five

## Litera I. & J.

Argumentum.

1 Assertio qua IRIDIS nomine perperam conveniant, refert.

Section culas habet 2. Section c. 3.

guæ JACEÆ. 3 quæ JVNCI.

I. five

#### I. five IR.

1. TRIS BVLBOSA cum RELIQVIS quæ Radicem habent vel Geniculatam vel Tuberosam, quod ad Flores, Specie convenit, quod ad Radices & Folia Specie discrepat.

2. Folia enim habet Cava (non Concava sive Fistularia.)

II. five JA.

"1. JACEA LVTEA SPINOSA Clusii Rarior. Plant. Hist. l. 4.c.

3. potius Carduus dicendus,

"2. Jacea MONTANA Dalescampii non est Jacea, sed alterius vel "sui Generis Planta Spigelio Isagog. in rem Herbar.l. 1. c. 37. qui cuntta "ea Herbarum Genera, quibus Capitulum Spinis destitutum exiguis La-"minulis sive Squamulis est compactum, & unicus Flos ex multis Foliis "Laciniosis constans; Semen praterea Oblongum molli Lanuguine obsitum, "Jaceas vocat.

"3. Verbi gratia Centaurium Majus, Cyanum, Serratulam & Stæben "Salmanticensem Clusii (Rarior. Plantar. Histor.l.4. c. 4.) & Scabiosam

" Montanam Dalescampii.

III. five IV.

JVNCVS FLORIDVS non est JVNCVS. Nam & Foliatura differt, & mirum quantum Flore, cum Juncus vix Florem habere dici queat.
Conf. Dodon. Pempt. 4. 1. 5. c. 25.

#### CAP.X.

five .

## Litera L.

Argumentum.

1 Affertio qua LASERPITII

LATHYRI LATIFOLII

& LAVRI nomine perperam conveniant, docet.

Sectiunculas habet 18.

\* LEVCOII

Sectiunc.

3.

qua LINARIÆ

& LINOSYRIDIS. Sectiunc.

2.

qua LYSIMACHIÆ.

N 2

I. five

#### I. five LA.

"1. ASERPITIVM Pena & Lobelii, etiam Rondeletii, Stirpium Adversar. p. 312. & 313. sive Massilioticum Tabernæmontani Rrauterb. "part. 1. sect. 3. c. 5. (p. 214.) sive Gallicum Caspar. Bauhini Pinac. 1. 4. s. 5. in Laserpit. 2; & GERMANICVM sive Levisticum, quæcunque sit Succorum cognatio, Congeneres Plantæ non sunt.

2. Gallicum enim Folia Pennatim in Ramastris gerit, Septena ad summum, si picturæ credendum, valde inordinate Laciniata, partim Obtusis,

partim Acutis Laciniis five Sinubus, nec utrinque fimiliter;

3. Quæ aliarum Plantarum Foliis aptius forsan conferri possent quam Paludapii sive Eleoselini, quibus a Pena & Lobelio, quia Dioscorides 1. 3., c. 94. init. & Theophrastus Histor. Plant. 1. 6. c. 3. init. Apii Folia Silphio tribuunt, conferuntur.

4. Levisticum vero est Cuneata sive Triangulata Foliatura.

"Finac. l. 9. fect. 3. in Lathyr. 6. CICERCVLAM SILVESTREM Ta-"bernæmontani Kråuterb. part. 2. fect. 4. c. 5. (p. 215.) & CLYMENVM "Matthioli in Dioscorid. l. 4. c. 11.

6. Sed Cicercula illa non est Clymenum hoc. Nam Clymenum Matthioli Bina tantum Folia habet, eaque minus Oblonga: at Cicercula Ta-

bernæmontani Plura Foliorum Paria & Longiora Folia.

"7. Idem Bauhinus ad Matthioli dict. loc. & Clusius Rarior. Plantar. "Histor. l. 6. c. 43. LATHYRVM SILVESTREM Dodonæi Pemptad. 4. "l. 2. c. 12. eandem facit cum Clymeno Matthioli.

8. Sed Lathyrus Silvestris Dodonæi Longiora & Angustiora habet

Folia quam Clymenon.

- "9. LAVRI Silvatica nomine non recte appellatur TINVS a Catone de Re Rustic. c. 8. & Italorum vulgo, quia Foliorum, Ramorum & Florum situ differt.
- 10. Nam Laurus Sigillatim ordinatos habet Ramos & Folia, neque Flores in Vmbellam dispositos.

#### II. five LE.

"1. LENTISCVS PERVANA, quo nomine Mollea dicitur Caspari Bauhino in Matthiol.in Dioscorid. l. 1. c. 75. & Pinac. l. 11. sect. 2. in Lentisc. 2. non est ejusdem Speciei cum vera LENTISCO. "2. Nam & Foliatura ejus est Impariter Pennata, & (si Accidentales "Differentias adjicias) Resina ejus non adstringit, sed purgat, & Fructus "Acer instar Piperis, teste ipso Casp. Bauhino loc. in Matthiol. dicto.

tar. Histor. I. 3. c. 7. non est LEVCOIVM ipso Clusio teste fin, dict. cap.

quia Flores Quinque Foliis constant.

#### III. five LI.

"1. LINARIA HISPANICA PRIMA Clusii Rarior. Plantar. Histor. 1.3. c. 18. nescio utrum ad LINARIAS (Osyrides aliorum) referri possit, cum sit Triblastos, vel potius simul Triblastos, & Monoblastos, quamvis Flore Calcariformi conveniat.

"2. LINARIA STIRIACA Clusii ejusd. libri c. 19. non videtur Li-"nariis annumeranda, quia Folia (quemadmodum ipse scribit) habet Crassa, "Succulenta, Coloris veluti Cassi, non temere per Ramulos sparsa, sed serie

quadam aut terna aut quaterna eos amplectentia.

3. LINARIA CONYZOIDES, aliorum Linosyris, (Lobelio Stirp., Observat. p. 223. & 224. Tripolii forte Species, Linaria Aurea Tragi, "Hyssopus Vmbellifera Guitandini) male LINOSYRIS dicitur, cum Linaria Purpurea utraque Lobelii Observ. dict. p. 222. potius Linosyris dicenda sit ob Flores & Fructus.

#### IV. five LY.

LYSIMACHIA LVTEA; PVRPVREA SPICATA; & SILI-QVOSA æquivoce nomine eodem fruuntur.

#### CAP. XI.

five

## Litera M.

#### A.gumentum.

1 Affertio quæ MALI nomine perperam conveniant, docet.
2 quæ MERCVRIARIS. Sectiunculas habet
3 quæ MILLEFOLII. Sectiunc. 4.
4 quæ MVSCI.

N 3

I. five

#### I. five MA.

"I. MALVS PERSICA Dodonæi Pemptad. ult. l. 3. c. 6. sive Persicus, admodum improprie dicitur MALVS, cum non ferat Malum, sed Nucem potius vesco Pericarpio vestitam. Reclius diceretur Prunus Persica. Pruno enim similior quam Malo.

#### II. five ME.

- "1. Ad MERCVRIALIS formam ac effigiem, inquit Dodonæus "Pemptad. 5. l. 1. c. 35. init., accedit IMPATIENS Herba. At totis Generibus differt.
- " 2. Primo Mercurialis Mas Dodonæo libri dicti c. 33. fert Bina Se-"mina eodem Petiolo hærentia: Impatiens Siliquas Chelidonii Majoris "instar.

"3. Secundo Mercurialis Flos Ramosus: Impatientis e Fastigiis Pe-

"tiolorum dependet.

4. Tertio Mercurialis Foliatura Bijuga: Impatiens Singularia.

#### III. five MI.

" I. MILLEFOLII PVRPVRIFLORI five secundi schema apud Do-"donaum Pemptad. I. l. 4. c. 15. hoc est, pictura Millefolii Terrestris. "Purpuristori apud Lobelium Stirp. Observ. p. 431. videtur millefolio "Purpuristori apud Lobelium Stirp. Observ. p. 431. videtur millefolio "VVLGARI Lobelii Observ. dict. p. 430. seu Achillea Dodonzi dict. loc.

"2. Multoque magis Specie distincta a Millesolio MINORE "Dioscoridis Dodon. ejusd. l. c. 16. sive LVTEO Lobelii dict. Observ.

p. 431.

3. Nam, ut alias Differentias taceam, Foliola in Ramastris Sigillatim seu Alterne, non Pariter sita sunt, ut in Achillea.

"4. VIOLA AQVATICA Dodonzi Pemptad. 4. l. 5. c. 4. non est Millefolium.

#### IV. five MV.

MVSCIS certe LICHEN non est accensendus, quemadmodum Dodonæus facit Pemptad. 3. l. 5. c. 15. Habet enim Petiolos Flurigeros. Conf. Lobel. Stirp. Observ. p. 646.

CAP.

#### CAP. XII.

five

## Litera N.

Argumentum.

1 Assertio qua NARCISSI

& NASTVRTII nomen perperam commune habeant, indicat. Sectiunculas habet 5. que NYMPHÆÆ.

I. five NA.

"I. NARCISSVM AVCTVMNALEM fatetur Clusius, uti & PERSI-CVM, Rarior. Plantar. Histor. l. 2. c. 16. initio, non Flore sed Foliis & Radice NARCISSIS similem.

"2. Improbat postea eos, qui ad Colchica reserunt, quia nihil cum Col"chico commune habeat prater Florem. Quod si ob Floris similitudinem
"Colchicum dicendus est, pergit, omnia Croci Genera etiam Colchicum ap"pellare licebit.

3. Certe si Florem respicias, magis distat a Narcisso, quam is qui

"Pseudonarcissus ob Calycem Oblongum dicitur ejusd. l. c. 17.

4. Quomodocunque nominetur, ad Crocos & Colchica referendus bic Pfeudonarcissus Auctumnalis. Convenit etiam cum Croco & Colchico, quod Vnicum Florem in Caule gerit.

Conf. portion. 2. c. 1. affert. 3. fin.

5. NASTVRTIVM INDICVM ex Sapore & Odore, non e Figura dictum est.

#### II. five NY.

NYMPHÆIS non est accensendus RANÆ MORSVS, quia Flores hujus Tribus Foliis constant.

C A P. XIII.

five

## Litera O.

Argumentum.

Affertio hac que ORCHEOS

**ORNITHOGALI** 

& OROBI nomine perperant conveniant recenfet Section culas habet 7.

#### OR./

"I. ORCHIS ODORATA & FRISIA Lobelii Stirp. Observat. p. 93. " (vitiose impressum 89.) item TETRORCHIS & TRIORCHIS "ejusdem ib. & p. 94. (vitiose impressum 90) non sunt ORCHES, quia Florem non habent Calcari instructum, nec Labiis Hiantem, sed Vniformem, Solidum aftar Lilii Convallium aut Hyacinthi Comosi.

2. Omnino ad Lilium Convallium referenda.

"3. ORNITHOGALVM LVTEVM five Bulbus Silvestris Fuchsii Plantar. Histor, c. 60. & Dodonæi Pemptad. 2. l. 2. c. 20. peculiare quid habet a RELIQVIS Ornithogalis, quia quasi in Vmbella gerit Flores.

4. ORNITHOGALA SPICATA videntur discrepare ab VM-BELLATIS, quod illa Stamina usitata forma; hac vero Stamineos Apices Luteos Sex Foliolis Candidis, tribus Acuminatis, tribus Bisidis sive Sinuatis inharentes habent.

ς. Ηκε Sex Φυλλοειδη (Filiosa) Stamina Capitulum Seminis, ejusque Stylum includunt arcte coëuntia, etiam explicatis Foliis exterioribus.

"6. OROBVS SECVNDVS Clussi Rarior. Plant. Histor. l. 6. c. 44. "Impari numero Folia habet in Ramastris. At PRIMVS & TERTIVS "Pari numero, absque Capreolis tamen. Ergo diversa hic sunt Genera.

7. QVARTVS Orobus Clusii partim Pari, partim Impari nume-

ro habet Folia, quod vix credo.

#### C A P. XIV.

five

## Litera P.

#### Argumentum?

I Affertio que PLANTAGINIS nomen perperam commune habeant monstrat.

que POLYGONI

quæ PYCNOCOMI & PYRETHRI.

Sectiunculas babet 3.

#### I. five PL.

PLANTAGO AQVATICA non est Species PLANTAGINIS. Conf. Tragi Rutters. part. 1. c. 75.

II. five

#### II. five PO.

POLYGONI Species non est Rnauel, quia Foliola habet Pariliter sita, & Foliola Florea extrinsecus Viridia, intrinsecus Alba, Quina, Acuta, Alfina est affinis.

III. five PY.

.I. PYCNOCOMVM PRIMVM Tragi Rrauterb. part. 1. c. 95. five "Vlmaria Pennata est Foliatura; SECVNDVM ejusdem ibid. five Dry-"mopogon primus Tabernamontani (Waldbart) Rrauterb. part. 2. fect. 11. c. 59. (p. 482.) Triangulari. Ergo non funt unius Speciei.

2. PYRETHRVM VMBELLIFERVM & DISCIFLORVM non "funt ejusdem Speciei Plantæ dicendæ, sed illa est Dioscoridis legitimum

"Pyrethrum l. 3. c. 86. Nam Vmbella meminit.

3. Hac Salivaris dici posset, nomine supersuo a vero Pyrethro mutuato aut Pseudopyrethrum, aut Antipyrethrum, quasi Vicepyrethrum. The standard areas.

#### CAP. XV.

. . Reconus primus & Phasylus Gord . 182 Winthick 1911 :

## Litera

Argumentum. Assertio hæc que QVERCVS nomen perperant commune habeant docet.

QVERCY diversissima est Foliis ILEX, licet Germanis Stecheich Ferrian Secreta Print out due BACCIFFR 1-rutaile.

#### CAP: XVICAMBAR DE COMPETATION

## as den Carbas (Augustalia) etteramenta ekura ekura

Argumentum.

Assertio qua RANVNCVLI nomine perperam conveniant. indicat. Section culas habet 4.

eil milit ensla dank /

-9366

to the Tibe appear as

and the same of th

#### I. five RA.

RANVNCVLIS omnibus in Flore Quinque Folia. Ergo Ranunculus NEMOROSVS Albiflorus, non est Ranunculus verus, quia habet Folia Sex. Confer. Spigelii Isagog. in rem Herbar. l. 1. c. 34. med.

## II. five RH.

"1. RHAMNVS TERTIVS Dioscoridis l. 1. c. 120. quamvis sit Paliurus Dodonai Pemptad. ultim, l. 1. c. 20. & Lobelii Stirp. Observ. p. 598. & aliorum, ex sententia Matthioli in Dioscorid. loc. dict. (cap. tamen ipsi est 102.) Casp. Banhini ad Matthiol., & Pinac. l. 12. sect. 4. in Rhamn. 5. &c.: nihil tamen commune habet cum RELIQVIS Rhamnis, nisi quod Aculeos habet, qui tamen Situ & Figura different profus a Rhamni Spinis.

"2. Spina Cervina (quæ male Infectoria ibid. dicitur Matthiolo, cum non Infectoribus sed Pictoribus usui sit) ob Foliorum Latitudinem & Parilem situm Rhamnis dissimilis est, cetera tamen propius accedit

quam Paliurus.

"3. Rhamnus primus & Rhamnus Germanicus Matthioli dia. loc.

"Folia Inordinate & Acervatim fita habent.

"4. Ejusdem Rhamnus fecundus, fi idem est cum Germanico, (in quam sententiam Bauhinus propendet ad Matthiol. loc.) male pictus est. Nam Folia Pariliter sita habet.

#### III. five RV.

1. RVTA ALBA (Witte Rude) Species est Abrotoni.

"2. Rutæ etiam Species Falsa est Ruta BACCIFERA (Barraute) Tabernæmontani Kräuterb., paur. 1; sect. 4. c. 36. (p. 422.) quæ part. 2. "sect. 4. c. 32. (p. 24..) ab ipso Baumichter Wiesenkleh dicitur. Re-Aius Klehbaum oder Klehstrauch.

"fraut) ejusd. part. 1. sect. 4. cap. 37. (p. 423.) Ruis plane dissimilis "est. Scrofulariam Laciniatam Caspar Bauhinus vocat ad Tabernæ-

montani loc. diel.

"Rutam CAPRARIAM (Seifraut) Tabernamontanus ipse part. 1. "sed. 4. c. 25. (p. 419.) Vicus Purpurifloris Fosis & Flore tam similem "fate-

"fatetur, ut vix discerni possint, nisi quod Vicia habeant Capreolos, qui-"bus Ruta Capraria caret.

"5. Pena & Lobelius quoque Stirp. Adversar. p. 392. in Galega, non Ruta sed Leguminis Speciem esse, adfirmant.

#### CAP. XVII.

five

#### Litera S.

#### Argumentum.

. 13 1

the state of the s	* · · ·
Affertio que SALVIÆ	
SAMBUCIO	
SANICVLÆ MONT.	ANÆ
SATYRII	
& SAXIFRAGÆ AVRE	A. nomine verberam con-
arvant docet	Sectiunculas haber 23.
que SCABIOSÆ	are goodle shall
& SCORDII.	
PROTECTION OF THE	
qua SECVRIDACÆ SEDI	to the first of the second
SENNÆ	
SESELIOS.	Sectione.
4 qua SIDERITIDIS	Section C.
and to a & SII of the state of	Sections.
s quæ SOLANI	
SOLIS FLORIS	or pasitionized the engineer of the
SORBEDA HEROLES	Sectiunc. 12,
6 quæ SPARGANII	Section.
& SPARTI.	0.00
	WWW. The Control of t
7 quæ STOEBES.	

#### I, five SA.

"I. SALVIA AGRESTIS, sive Sphacelus Dodonai Pemptad. 2. 1. 4. c. 23. neque Odore, (si hic quoque est considerandus) neque Figura convenit cum SALVIIS. Folia & Superficie & Figura conveniunt cum Verbasco Nigro, nisi quod Minora.

2. Flosculi Labio superiori sive Galea quasi carent, inferius Labium Trisidum habent: & versus unam Caulis aut Rami partem interdum vergunt, non semper. Dodonæum etiam pictura sua resutat.

" 3. SAMBVCI Italica nomine male SYRINGA fruitur apud Au-

strios Clus. Rarior. Plantar. Histor. l. s. c. 36.

4. Vtraque quidem Pariles habet Ramulos, Surculos, Folia; Sambucus vero Foliaturam Pennatam, at Syringa Monadicam.

5. Sambucus LACINIOSO FOLIO etiam minus recte Sambucus

dicitur, quia Foliatura est Triangulari.

6. Sambucus PALVSTRIS five Lycostaphylus Folia Monadica

Pariliter sita habet.

- "7. SANICVLIS MONTANIS minus recte PINGVICVLA Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 14. adnumeratur a Casp. Bauhino Pinac. l. 6. sect. 6. in Sanicula Alpina Rotundisol. 5. Nec enim Vmbellata est, sed Simplici Caule.
  - " 8. SATYRIVM Dioscoridis l. 3. c. 143. & 144. duplex est.
  - " 9. Prius Albiflorum (cui maxime accedit Hyacinthus Orientalis;)
- "10. Posterius equ Igóviov, hoc est, ut interpretantur, Rubro Flore, "quod vel manu comprehensum ad Venerem incitat.

11. Vtriusque Satyrii Radix est Vnica. Male itaque ORCHES

Satyria dicuntur.

12. SAXIFRAGA AVREA a nonnullis appellatur Herbula CIRCA HAMBVRGVM & Lubecam in palustribus aut uvidis saltem locis nascens, quæ Foliis Germinis Saxifragam Albam (quæ Folia habet Sigilla-

tim sita) licet minor, utcunque refert.

13. Verum Pena & Lobelius Stirp. Adversar. p. 267. Dodonæus Pemptad. 2. l. 5. c. 22. & Tabernæmontanus Rrauterb. part. 2. sect. 11. c. 22. (p. 542.) hanc Plantam ita descripserunt, ut ex Picturis adjectis (Lobelius depingit Stirp. Observat. p. 336.) potius quam ex ipsorum descriptionibus Plantam cognoscere liceat.

14. Quod si picturis fidendum, nostra hæc ab Aurea Saxifraga

omnino diversa est.

48 T. C

15. Aurea enim Folia Germinum & Ramulos (licet parcos) Compariter five Conjugatim sita habet; Nostra vero non ex tot distinctionibus Foliata est & Folia Sigillatim habet sita.

16. Aurea

pingunt; Nostra prolixis Petiolis, qualia Aurea pictura Tabernamontani tribuit.

" 17. Aurea Flores ex Alis Foliorum enascuntur, ut omnes pingunt, "idque fere Verticillatim, ut Tabernæmontanus pingit, saltem Compa-

riter ut Dodonæus & Lobelius pingunt, Perianthio suo vestiti;

18. Nostræ vero Flores Lutei incumbunt quasi Foliis Germinis e Cacumine Caulis confertim enatis absque conspicuo Perianthio; & denfus tum Florum tum Foliorum Cacuminis situs, nescio quid simile habet Tithymalorum aut Esularum Summitatibus, licet Tithymalus non sit, nec Lacteo Succo prægnans.

"19. Hepatica Palustris icon in Horto Eistetensi propius ad Nostram præsertim quod ad Flores accedit, sed Crenas Foliorum Germinis non

exprimit.

20. In Floribus Quaterna Folia quidem Foliis Germinis arcte incumbentia, sed Geminam Seminis Thecam non exprimit, neque Stamina exilitatem.

21. Densum tamen Foliorum Germinis & Ramulorum in Cacumine

fitum fatis exprimit.

- 22. Sed nec Genere cum Alba Saxifraga convenit, cujus Flos Perianthio ima parte inclusus Quinque Foliis Oblongis & in Summitate Arcuatis, constat;
- 23. Cum Nostra Flosculos gerat in Ramoso Cacumine decem vel plures, e Foliis Quaternis obtuse Angulatis Luteis non splendentibus, Octonis Staminibus & Binis Curtis Stylis compositos, vel quaternis vel quinis Foliis Ramuli incumbentes, quorum superius minus est inferiore.

#### II. five SC.

"1. SCABIOSA MAJOR sive prima Matthioli in Dioscorid. l. 4. c. 11. videtur esse Cyanus potius quam SCABIOSA, ut etiam ex icone intelligitur. Radice etiam (si quis talia attributa curet) est Subdulci, cum vera Scabiosa Sapore sit Amaro.

"2. SCABIOSA PVRPVREA (Bleichbraun) five Vulgaris Major "Dodonzi Pemptad. 1. l. 5. c. 3. & CÆRVLEA five Decima tertia Tabernamontani Rrauterb. part. 1. sect. 5. c. 14. (p. 457.) different Genere. 3. Purpurea Folia Pariliter sita, Laciniosa & Prolixa: Carulea Sigillatim sita, vix Serrata, Curta.

4. Purpurea Flosculi secti in Quatuor Lacinias Rotunda Frontis; Quatuor habent Stamina, quorum Petioli adhærent Laminæ Flosculi;

Stylum Fundo Flosculi insistentem Capitulo Spherico.

5. Carutea vero Flosculi in Quinque prolixas Acutissimas Lacinias secti, Stamina habent nulla, nisi quod Staminum loco est Fistula; Stylus Prolixus est ultra Flosculos eminens Capitulo Ovali, acutiore extremo cum reliqua longitudine coëunte.

6. Fistula inferiorem Styli partem amplectens superiore parte in Stellam Luteam quinque brevium radiorum terminata. Rectius Globu-

laria dicitur.

- "7. SCABIOSA item PRIMA, & DÉCIMA QVARTA Tabernamontani dico cap. (p. 453. & 457.) Scabiosa non sunt, quia Folia non habent Pariliter sita.
- 8. Nec ista proprie Scabiosa sunt, qua FOLIIS sunt INTEGRIS, ,non Dissectis: ideoque Decima tertia Tabernamontani duplici jure a Scabiosis excludenda est.
- "9. SCORDII Species non est ELEPHAS Fabii Columna Minus cognitar. & Rarior, Stirp. Ecphras. part, 1. c. 64. ut vult Caspar. Bauhinus Pinac. 1. 7. sect. 1. Scord. ult.
- 10. Scordium enim est ex iis quæ ferunt Quaterna Semina Perian, thio. At Elephas in eodem Folliculo vel Triginta fert Semina, teste Fanbio capitis dicti fin.

Conf. Cæfalpin. de Plant. I. H. C. I. & 42.

III. five SE.

"I. SECVRIDACA CLYPEATA five Hedysarum Chypeatum Lobe-"lii Stirp. Observ. p. 523. & allorum, Onobrychis (quam pingit & Clusius Rarior. Plantar. Histor. l. 6. c. 44.) esse recte defenditur a Dodonzo Pemptad. 4.l. 3. c. 18. Tum Foliatura enim, scilicet Pennata, Imparis, tum Siliqua ratione sub unum Genus referri posse videntur.

"2. SEDI Flos Quinque habet Folia: ILLECEBRÆ sive Sedi Minimi Quatuor, si Lobelii & Dodonæi picturæ credendum, quæ illius Stirp. Observat. p. 205.; hujus Pemptad. 1. l. 5. c. 10. invenitur. Ergo Illecebra

non est Sedum.

"LITES TECTORVM Casp. Bauhini Pinac. I. 7. sect. 5. in Sed. Foliis "Lacinitatis 6. sive Alsine Petrea Rubra Tabernæmontani Rrauterb. part. 2. sect. 11. c. 2. (p. 410.) Nam & hoc Flores videtur habere Concavos & Solidos.

"4. Neque tamen idem est cum Paronychia Tertia ejusd. sect. c. 94. (p. 513.) ut Bauhinus ad utrumque Tabernæmontani locum notat, cum Paronychia Geminatim; Sedum istud vero Sigillatim Folia habeat sita.

5. SENNA differt Specie a COLVTEA, quia Senna est Pennata

Fronde numero Pari; Colutea numero Impari.

6. Deinde Senna Flore est ex Quinque Luteis Foliolis Vniformibus

composito; Colutea Flore Labiato Composito sive Leguminari.

7. Sennæ denique Siliquæ sunt Lunatæ, nullo Spiritu tumidæ sed compressæ, adeo ut Latera cohæreant, in quibus Semen Vvarum Vinaceis similimum. Confer Matthiol. in Dioscorid. 1. 3. c. 70. & Dodonæum

Pemptad. 3, 1, 2, c, 3, & Pemptad. 6, 1, 2, c, 26.

, 8. SESELI ÆTHIOPICVM FRVTEX, quem Ægyptiis novos, portum, id est, Canis horrorem dici Dodonæus, nescio ex quo auctore, Pemptad. 2. 1.5. c. 18. scribit, (appellarem itaque Cynophricen Hunts-schreck) Folia Sigillatim sita Integris Marginibus profert, & Ramastris caret.

9. Æthiopicum HERBA vero Ramastros habet Triangulatos.

"10. Quemadmodum Seselia MASSILIENSIA & PELOPONNENSE Ista Marthiolo & Casp Bauhino Dioscorid, l. 3. c. 53. adpicta Triangulatis "funt Ramastris. Ast Seseli CRETICYM MAJVS & MINVS Caspar. "Bauhini ad Matthioli libri dicti c. 54. (aliis 63.) Rumastros habet Pennatos.

"quasi improbaturus eam appellationem, Tordylion, inquit, quod aliqui

"Creticum Sefeli vocant, juxta Ciliciam in Amano monte nascitur.

#### IV. grafive as Silver I Zen avide as II

1. SIDERITIDES multæ dicuntur, ut multæ Panaces, & Symphytum.

ALTERA Dioscoridis creditur, ad Bipinellam sive Pimpinellam; &

ROBERTIANA ad GERANIA. Vide Penæ & Lobelii Stirp. Adver-

far. p. 332.

"3. SIVM PRIMVM Dodonæi Pemptad. 4. 1. 5. c. 10. est Pennato "Folio: SECVNDVM ejusdem ibid. Triangulato: TERTIVM sive "Junciforme c. 11. partim Pennato, partim Triangulato: QVARTVM "c. 12. est Phellandrium.

#### V. five SO.

1. SOLANIS accensentur multa quæ eo non pertinent.

2. Caspar Bauhinus male ad Solana refert Herbam Paridem sive "Vvam Lupinam, quam Solanum BACCIFERVM QVADRIFOLIVM "vocat Pinac. l. 5. sect. 1. in Solan. Baccis. 10.

"3. At hujus Caulem Brevem suprema parte terminant Folia Quin-"que vel Sex, ut ipse quoque ibi fatetur, ex eodem quasi Caulis ter-

mino.

"4. Folio Lacinioso est Solanum POMIFERVM Lobelii Stirp. Observ. p. 135. sive Mala Æthiopica.

5. Foliatura Triangulari vel etiam Pennata POMA AMORIS.

6. Halicacabus, sive Alkekengi, sive Vesicaria, Folia habet Dizyga (gepaart;) Florem & Frustum e Pediculo suo Singutum. Ideo ad Solanum referri nequit, & perperam Solanum VESICARIVM dicitur, quia Solanum Folia habet Sigillatim ordinata, & Frustus & Flores Corymbatim (viel an einem Hauptstengel.)

"7. Foliatura Triangulari est HALICACABVM PEREGRINVM

Dodonzi Pemptad. 3.1.4. c. 25. Del 2012 de la coma acoma montante de la coma acoma a

"8. SOLIS FLOREM (Deidennsop) recte Cisti ac Ledi Speciem "five Conspeciem esse censer Dodonæus Pemptad. 2. 1. 1. c. 3124 Ve"rum inconvenienter Cisti Silvestrem Speciem esse quandam fin. cap. scribit.

9. Quasi vero vel major Siccitas, vel ipsius Plantæ Parvitas vel

etiam Odoris defectus Silvestritatem arguat.

10. Flos Solis PERVANVS tam Uniflorus quam Ramosus Sigillatim

proferunt Folia.

11. In Flore vero Solis TVBEROSO observabam anno 1623. Junio mense, inter quatuordecim Caules binos Folia Trijuga proferre, (instar Lysi.

Lysimachiæ Luteæ) & quidem jam Trina vel Quaterna in singulis Caulibus erant Genicula, reliqui Caules Bijuga proferebant Folia satis constanter.

12. SORBVS TORMINALIS merebatur aliud nomen. Nibil enim commune habet cum vera SORBO, quod Folia attinet. Est potius Mespilus.

#### VI. five SP.

"NVM BACCIFERVM five Marinum Pinac. l. 1. fect. 2. in Spargan. post 3. Sparg. cum Polygonum absque Foliis sit, uti Equisetum; Sparganium Foliis Prolixis.

"2. SPARTVM GENISTACEVM feu Dioscorideum Clusii Rar. "Plant. Histor. l. 1. c. 70. est Genista Species, a quo valde differt Spartum "GRAMINACEVM seu Plinianum ejusd. l. 6. c. 40. & Lobelii Stirp. "Observ. p. 45. Guilandino Spartum Hispanicum Dioscoridi ignotum de Papyro membri 9. sect. 17.

VII. five ST.

"STOEBE SPINOSA Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 4.c.4. po-

## CAP. XVIII.

spragmon sport of the town five derivate

## Litera T.

#### Argumentum.

Affertio que TEVCRII nomine perperam congruant.

Sectiunculas habet 4.

que TILIÆ. Sectiunc. 8.

TRIFOLII
& TRITICI. Sectiunc. 5.

que TYPHÆ.

#### I. five TE.

1. TEVERIVM FALSVM five Pseudoteucrium dico, quod Flores habet Roseos in Quatuor Folia (non Acuminata, non Sursum diplatata,

"latata, ut Clematis Daphnoides, vel Clematis Peregrina Lobelii Stîrp. Observ. p. 345. sed) Orbiculata, sed inequaliter Lata dehiscentes, qui integri cum suis Binis Staminibus defluunt, Seminis Thecula relicta Bisida instar Veronica.

" 2. Huc refero Teucria Clusio omnia Rarior. Plant. Hist. l. 3. c. 45., exceptis tribus prioribus, item Veronicam Fruticantem ejusdem c. 44. (Flore Rotundifolio) ipso Clusio non invito.

3. TEVCRII vero Flores Hiantes inferiori tantum Labio effor-

mati, Galea carent.

Vid. c. 3. affert. 3. fectiunc. 2.

4. Differunt etiam Teucrium Pratense & illi similia, que nimirum Flores gerunt in Longis Petiolis instar Becapunge, ab istis Teucrii Generibus, que Flores gerunt in extremis Ramis Spicatos sive in Spicam congestos.

II. five TI.

"1. TILIA MAS Dodonæi Pemptad. ult. l. 4. c. 16. seu Saxatilis "(Steinlinden) Casalpino sorte est Carpinus altera de Plantis l. 2. c. 7. Ulmo vel Carpino (Hagbuchen) vicinior est quam TILIÆ proprie dictæ seu Feminæ.

2. Nam Folia gerit Rugofa, Scabra, non Cordis forma ut Tilia, sed

Ovalia fere, ut ita loquar.

3. Situs & Figura Seminis sane veræ Tiliæ non convenit, sed Vlmo.

,, 4. Certe est Vlmus Latioris Samarra, quia Dodonæus comparat

, eam, Fructui Thlaspios Majoris.

"5 Accedit, quod hanc Tiliam Spelin Belgis dici ait, cum Vlmum dicant Olmen; at Vlmi qui ex Hollandia Hamburgum afferuntur, dicun-

tur Ipern.

6. Vesiculis sive Vtriculis sive Folliculis, quos in Foliis copiose gerit. (vt pingunt Matthiolus in Dioscorid. l. 1. c. 108. Lobelius Stirp. Observ. p. 606. & Tabernæmontanus part. 3. sect. 3. c. 40. p. 711. sed Priorum neuter eos describit) & nulla alia re differt ab Vlmo.

7. Atqui Folliculi accidens sunt, & Nidi Vermium sive Insectorum,

quales Folliculi etiam in Populis.

8. Ligno etiam differt a Tilia vera, quia Duriore materia, unde, & item quod Sterilis vel semper existimetur vel sæpe sit, Mas videtur dici.

III. five

## they demand and the off the TR. spent string off the

1. TRIBULUS AQUATICUS five Tribulus Marinus Officinarum, "five Nucifer (Maffernus, Stachelnus) & Tribulus AQVATICVS "MINOR PRIOR Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. ult. c. ult., five Cri-"spifolius, sive Crispula Aquatica (Breunling) & TERRESTRIS DIO-"SCORIDIS I. 4. c. 15. & TERRESTRIS THEOPHRASTI Tewis (Przcox) Histor. Plantar. 1. 6, c. 5. five Leguminosus, plane diversæ sunt Plantæ, Non itaque eodem nomine comprehendendæ.

2. Leguminosi Fructus sirmis Spinis munitus Quinquepartitus, in

fingulis divifuris quatuor Spina, ergo viginti in universum.

3. Sed Floribus discrepat a reliquis Leguminosis. Habet enim similes Potentilla Floribus Confer. Clus. Rarior. Plantar. Hift. l. ult. c. 51.

" 4. TRIFOLIVM SPINOSVM Creticum Clusii dicti libri c. 52. Flores fert instar Anagallidis & Purpureos, ergo discrepat a RELIQVIS.

5. TRITICVM VACCINVM (Ruhweigen) five Melampyrum non est TRITICVM corruptum, sed Herba suz Speciei, ut ex tota figura apparet. Folia & Ramulos Pariliter gerit.

IV. five TY. A spinould svil and the

TYPHA CEREALIS (vid. Dodon. Pemptad. 4. l. 1. c. 9.) & PA-LVSTRIS nomine perperam conveniunt.

#### CAP. WIX.

the five

## Litera

this post sale is a reason of Argumentum, and read and are

I Affertio qua VALERIANA nomine perperum conveniant. Sectiunculas habet 3.

· VERBENÆ AVOK malo V smagapan in si

& VERONICÆ. Sections.

quæ VICIÆ & VIOLÆ,

Sections. I. five VA.

I. VALERIANA CÆRVLEA five Græca Pennata quidem Foliatura est, sed non Pariliter sita. Ideo hac extra VALERIANÆ Genus seponenda. , no Martine a sep Do-

P 2

, 2. Dodonxus quoque Pemptad, 3. l. r. c. 27. hanc nullam cum Va-"lerianis veris similitudinem babere judicat, consentiente Caspare Bauhi-, no Pinac, I, 4. fect. 6. in Valerian. 7. qui tamen Foliorum similitudinent excipit.

3. Valeriana vero RVBRA non est Pennata Foliatura, quamvis Pa-

rili. Ideo a reliquis expungenda.

#### Lilear vi. v. . cox ; II. five VE. to different point (xec

" I. VERBASCA duo SALVIÆFOLIA Dodonæi Pemptad. il I. « c. 29. ex VERBASCIS eximenda. Sunt enim Foliis Parilibus & Floribus Galeatis. Potius dicendæ Salviæ Verbascifoliæ, aut Orvalæ, aut tale quid.

, 2. VERBENA NODIFLORA Caspar. Bauhini, quam describit & pingit in Matthiolo ad Diofcorid. l. 4. c. 36. non videtur Confpecialis

effe Verbenæ VVLGARI.

, 3. VERONICA non est ELATINE PRIMA Dodonar Pemptad. 1. 1. 2. c. 22. quia Folia non funt Combinata five Pariliter fita. Deinde Flos habet Calcar sive Corniculum, uti Flos Regius (Nittersporen) vel Olyris five Linaria.

### TYTHA CEREALIS IV Byin III of the CEREALIS IV BY

, I. VICIA LVTEA Foliis Convolvuli Minoris Cafpar, Bauhini Pi-"nac. l. 9. fect. 3. in Vicia ult., five Aphaca Dodonai, qui plenius pingit cum Siliquis Pemptad. 4. l. 3. c. 12. male refertur ad VICIAM.

2. Vicia enim Foliatura Sigillatim sita, Pennata Pari numero, quæ

in Capreolos definit.

3. At Aphaca hæc Capreolos ex Alis Caulis emittit (id eft, Angulis inter Folia & Caulem.)

4. VIOLÆ uno nomine complectuntur, quæ tamen uno Genere ita contineri nequeunt, Violam AQVATICAM; DENTARIAM (una Folia habet Pennatim, altera Digitatim fita, utraque Florem gerit Quatuor Foliorum;

5. LATIFOLIAM five Latifiliquam, five Lunariam; MARIANAM, quæ a Viola tam MARTIA, quam Quadrifolii Floris, cujusmodi etiam MATRONALIS est, discernenda est, Campanulis, Cervicariis & Rapunculis accensenda; ut sit Campanula Mariana; Flore est Lamina solida, Margine Denticulato. 1 4

6. Sæpius quippe eminus Convenientias in Speciebus notant Botanici auctores, ideoque Confusis Differentiis describunt, quod hactenus faris apparuisse existimo.

#### PORTIONIS II.

DE PLANTIS RELIQVIS PERPERAM HETE-RONYMIS (e)

TIVXTA ALPHABETHI ORDINEMA

Car A P.

Argumentum.

I Affertio oftendit, quanam Planta perperam discrepent nomine ab ABSINTHIO

ACONITO

APARINE ATRIPLICE : A STANDARD ON CVS

The non Sectionculas habet 4,

BLITO '

MAGNA D. OZZOJDVE valt Cuilsadirus L de Pipyr, membr. 24,

. Oak Briston Bertham Bertham

CARDVO

CEDROMAGNA Diefcoridis

CHÆREFOLIO CROCO.

contains and and of the and a completely of Sections. To be

#### I. five A.

d ABSINTHIVM pertinet ARTEMISIA.

" of the Library Contameration Do-

the spring land and the

2. Ad ACONITA Lutea Napelliformia five Napellos AN-

B and open to comment of P.3. If the of the last of the THO.

(e) Quia autor noster ipse adhuc dubius fuit in determinando certo & perperuo earastere generico, unde defumi debeat; mirum non est, eum in hujus pornionis capitibus subinde voluisse plantas cogere sub idem genus, quæ omnino disjuncta & diversa genera constituunt. V. g. quæ de Absinthia & Artenissa, it. de Napello & Anthora monet, utique vera sunt: contra vero Aperine, Asperula, Galium, Rubia, omnino seperata sunt genera, quod etiam de Carduo & Cnico, Cherefolio & Cicuta, Croco & Colchico &c. valet, ut cuivis, ex observationibus recentiorum botanicorum patebit: quæ brevibus observatie 9 Infficiant

THORA vel Zedoaria (Scilgift,) quemadmodum funt Dulces & Acres Rannoulle, and deleter delta delta delta delta delta delta della dell

- 3. Ad APARINEN (Riebekraut) referenda est ASPERVLA ODORATA sive Hepatica Stellata (Herzstreud, Sternleberkraut) etiam propter Seminum Capitula. Eodem pertinet GALIVM (Mågerkraut, Balstroh, Vettestroh, Labekraut,) MOLLVGO (Sternmägerkraut,) RVBIA.
- 4. Ad ATRIPLICES pertinet BONVS HENRICVS five Tota bona.

## II. five B.

1. BLITI Species est AMARANTVS.

"2. BVGLOSSVM HISPANICVM Tabernemontani Rrauterb. "part. 2. sect. 3. c. 11. (p. 134.) sive Semper-virens Penæ & Lobelii Stirp. Adversar. (p. 247.) convenit satis in Foliis, Floribus, Gaulibus &c. cum VVLGARI.

## The C.

- r. CARDVIS accenfendus eft CNICVS.
- "2. CEDRVM LIBANI non est probabile diversam esse a Cedro, MAGNA Dioscoridis, ut vult Guilandinus l. de Papyr. membr. 24. "sect. 14. & seq., qui maxime Vitruvii auctoritate nititur, qui Cedro Folia Cupresse Foliatura similia tribuit l. 2. Architect. c. 9.
- "3. Verum Vitruvius non adeo subtiliter Foliorum similitudinems consideraverit. Testatur autem, Cedrum in Syria & Creta crescere. Debuisset itaque Guilandinus nobis Cedrum Vitruvii in Libano, Amano, Tauro aut Ida Cretæ ostendere.
- 4. CHÆREFOLIVM Silvestre CICVTÆ simile, excepto Odore, Sapore & Nocendi Potentia, quæ Homoidiam non impediunt. Confer. Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 17. sequent., 27. sequ., 42. & sequent.
- 5. CROCO cognatæ Plantæ COLCHICVM & hinc Narcissus Au-Humnalis, de quo Portion. 1. c. 12. assert, 1.

Vid. Fragm. 1. c. 2. affert. 3. fectiunc. 36.

#### amount orill some since with C AitPost History

five

## Literæ E. H. I.

Argumentum.

1 Affertio que nomine perperant discrepent ab ESVLA.
2 que ab HORDEO.

que ab

Sectiunculas habet 4.

## LIVING MODOLDA I. five E.

ESVLA hoc habet proprium, quod Folia in Umbella Geniculis sunt Oblonga, quod tamen etiam est in LATHYRIDE, quæ recte Esula dici potest.

II. five H.

"I. HORDEVM HIBERNVM scribit Tabernæmontanus Rraus "terb. part. 1. sect. 7. c. 15. init. (p. 644.) Tetrastichum, Hexastichum & "Octastichum reperiri, esse etiam Hordeum ÆSTIVVM Tetrastichum.

2. Inde colligi potest, Æstivum illud & Polystichum Hibernum esse forte eandem Speciem. Nam Columella judice de Re Rustic. l. 2., c. 9. circa med. Trimestre Semen & Auctumnale natura non differunt, quippe idem Auctumno satum melius respondet.

3. Deinde Hordeum Hibernum & MVNDVM (Reingersten) quod in Gallia frequens ita diclum est, quia Maturum sponce ex Folliculo suo

cadit, credo eandem esse Speciem.

"4. Dubito autem, num Hexastichum Columella, de quo c. dict. ante "fin.; Nulla (forte exili) vestitum Palea Granum ejus celeriter decidit, "iisdemque de causis facilius teritur quam cetera; sit Polystichum Ta"bernamontani sive Æstivum sive Hibernum,) an vero ejusdem Tabern.
"Reingersten.

#### III. five I.

"ILEX COCCIFERA, quam in Italia observarunt Pena & Lobe-"lius Stirp, Adversar. p. 400. est Ilex FRVTICOSA Cæsalpini I. de Plant. 2. c. 2. quæ Coccum fert, sed non copiosum, ideoque neglectum. Et hinc Cæsalpinus ignoravit, suam Fruticosam esse Specie eandem cum Cocci"fera. Enzinam Hispanorum Lobelius eandem facit cum Ilice Arborea "Stirp. Observat. p. 582.

#### CAP. III.

five

## Literæ L. M. O.

Argumentum.

a Assertio quæ perperam nomine discrepent a LAMIO
LILIO CONVALLIVM
& LYCHNIDE

monffrat.

que a

Sectiunculas habet 3 MALVA & MEDICA.

Sections.

que ab

### I. five L.

"I. L AMIO vicina est CANNABINA Tabernæmontani Rrauterb.
part. 2. sect. 5. c. 11. (p. 263.)

2. LILIO CONVALLIVM accenfendæ OPHRIS five Bifolium &

HELLEBORINE.

3. LYCHNIDIS Species sunt MVSCIPVLA sive Viscaria: & VAC-, CARIA Dodonæi Pemptad. 1. 1. 4. c. 20. Muscipula Flores aliquam habent convenientiam cum Caryophylli Floribus.

#### II. five M. was a second

J. MALVÆ adnumeranda est ALCEA & ALTHÆA.

"cuntur Pemptad. 4. l. 4. c. 18. quamvis non fint Medica a Dioscoride. l. 2. c. 177. descripta, tamen ejusdem funt Generis, & idem nomen merentur.

#### III. five O.

"OLEA SILVESTRIS a SATIVA Specie non videtur differre. "Silvestris enim humilior & minor est, Ramis Aculeatis, Foliis minoribus, "Baccis minoribus sed frequentioribus, & minoris Carnis. Ceteris conveniunt fere, uti ex Dodonæi Pemptad. ult. 1.3. c. 29. colligo.

CAP.

#### .VI M CIARR HVO & a -

sfive

## Literæ Q. R. S. V.

Argumentum.

1 Affertio qua perperamnomine discrepent a QVERCV.

2 qua a RAPISTRO.

3 qua a SORBO.

4 qua a VICIA.

I. five Q.

VERCVVM Tres Species memorant Carolus Stephanus & Joannes Liebholt. Prædii Rustici (quod Sebitsius in Germanicam linguam transtulit) 1, 6, c. 20. (a)

" 2. Prima ROBUR, Magna, longe diffundens Latos Ramos & Ra-

"dices, Nodoso Ligno, Brevi Caudice (Breneiche.)

" 3. Altera QVERCVS, Minor Quercus, (Spalteiche) Altior evadit,

"Ligno non ita Duro & Nodoso, facile finditur & secatur.

"4. Tertia ILEX Erameiche) Tenui & Recto Caudice, Octo Cubitos "Alto, absque Ramis, ad adificia omnium utilissima.

" 5. Frondibus quoque & Glandibus distincta funt.

6. Sed nescio an sit Specificum, an vero Accidentarium Discrimen.

"7. Quæritur etiam, utrum Quercus quæ prope FretumHerculeum, item "in Cantabria crescunt, ideo quia FRONDES per HIEMEM retinent (teste Clusio Rarior. Plant. Hist. L. 1. c. 13.) Specie differant a nostris Quercubus.

II. five R.

"RAPISTRVM PVRPVREVM Tabernæmontani Rråuterb. par-"tis 2. fect. 3. c. 3. (p. 124.) tantum Colore differt ab ARMORACIA "c. 9. (p. 131.) Hæc vero valde accedit ad LAMPSANAM FLORE ME-"LINO c. 4. (p. 125.) descriptam.

III. five S.

SORBVS Silvestris potest ORNI nomine carere. Confer. portion 1. c. 6. assert. 2. sectionc. 1.

IV. five V.

VICIÆ cognata eft CRACCA.

FRA-

(a) Argentinæ 1592. in Fol.

#### FRAGMENTVM IV.

DE

# PARTIBUS QUARVNDAM

## PLANTARVM CONFVSE COGNITIS.

## CAP. I.

#### DEED FOOLIO. INV.

Argumentum.

Affertio hæc recenset quasdam Plantas falso APHYLLAS.
Section culas habet 3.

- 1. DENTARIA, ἄφυλι quæ dicitur, Caulem habet Foliis vesti-
- "2. JVNCVM Guilandinus opponit Matthioli & per consequens Theophrasti definitioni Herbæ l. de Papyr. membr. 1. sect. 10. At Jungus Foliis non caret, præsertim Acutus.

3. LIMODORVM quoque & OROBANCHE Caulem habent

Foliis amictum.

# mile in this con C A P. II.

Argumentum.

1 Assertio Plantas quasdam recenset falso EXCAVLES. 3. Sectiunculas haber 13.

Plantas quasdam falso CAVLIGERAS. Sectiunc.

I.

"I. A LGA male refertur inter Plantas Anavasç a Cæsalpino de Plantis l. 16. c. 1. Quoddam enim Genus satetur Cauliculum habere "Spicosum (ut Potamogeton) ejusd. libr. c. 25.

2. ALLII Caulis altero vel tertio anno surgit. Ideo Caule carere

creditur. Confer. Dodonæum Pemptad. 5, 1. 3, C. 12, init,

,, 3. ASA-

"3. ASARVM Caule caret, ait idem Pemptad. 2. l. 4. c. 26 med. Videtur tamen Cauliculum proferre Breviculum Flore unico terminatum. Cauliculo bina hærent ex eadem distinctione Folia, Petiolis Caule prolizioribus.

"4. COLOGASIAM sive Arum Ægyptium, hodie Ægyptiis instar Rapi edule, Bellonius Observat. l. 2. c. 28. Prosper Alpinus de Plantis Ægypti c. 33. Clusius Rarior, Plantar. Histor, l. 4. c. 50. & alii apud "Clusium summo consensu affirmabant Caule, Flore, Frudu carere.

5. At Fabius Columna oftendit hac omnia (pro Caule Cauliculum) Minus cognitar. Stirp. part. 2. c. 1. Confer. Prosp. Alpin. de Plantis Exotic.

1. 2. c. 17. & 18.

"6. EQVISETVM male refert inter Plantas Ακαύλες Cæsalpinus de Plantis l. 16. c. 1. cum in Caule serat Semen, imo Iulos pro Flore, imo , quædam Species etiam Flosculos, Hippuris scilicet Minor Dodonæi "Pemptad. 1. l. 3. c. 21.

"7. Item Equiseto cognata Ephedra Flores fert Muscosos apud Do-"donzum dict. libr. c. 22. Quia Ephedra est ingens & Muscosos fert Flores, verisimile est Equiseti Flosculos adhibito perspicillo saltem conspi-

cuos fore.

8. FILIX PALVSTRIS sive Osmunda videtur. Caule & Semine ,, non carere, contra ac Cæsalpinus putat de Plantis l. 16. c. 1.

" 9. MANDRAGORAS, inquit Dodonæus Pemptad. 3.1.4. c. 29. "tam Mas quam Femina Caule carent. Flores singulos gerit in Pediculis.

10. Atqui Petioli isti Caules sunt. Nec enim habent Superficiem interiorem & exteriorem. Quicquid Florem fert aut Fructum, est Caulis.

"11. NARCISSVS PERSICVS Clusio Rarior. Plantar. Histor. 1. 2. "c. 15. Ακαυλ φ plane Planta est, & Floris duntaxat Pediculo pradita welut Crocum & Colchicum.

12. Non probo. Caulis est, utut Brevis sit, cum immediate e Ra-"dice exeat. Theophrastus certe Histor. Plant. 1.7. c. 12. Caulem Flo-

ris vocat, referente ipso Clusio dicti capit. fin.

"13. VINGO Theophrastus Βλαξον Βραχον (Germen Breve) & Folia ,, Ampla Histor. Plant. l. 1. c. 11. init. tribuit. Ergo & Caulem, quem Gui-, landinus ei denegat l. de Papyro membri 1. sect. 5.

II.

#### ASARVA Cierle corres afficient Petros de la la la la la la la.

ftus Histor. Plantar. l. 7. c. 13. Viderur ex aliorum relatione sapius quam propria observatione loqui.

" 2. EPIMEDIVM, inquit Dioscorides I. 4. c. 19.

", Καυλός ες iv έτε Καρπον έτε Αύθη | Caulis est nec Fructum nec Flores

3. Hinc colligi potest, Epimedium Dioscoridis Caule carere, & "Raulov pro Mízov (Pediculo Folii) ut Theophrastus vocat Histor.

Plantar. l. 1. c. 6. positum.

4. FILICIS aliquoties meminit Theophrastus, sed quod Caule

careat nunquam addit.

" 5. FILIX FEMINA sive Ramosa Caulem dicitur habere a Dodo neo Pemptad. 3. l. 5. c. 1. sed est Costa Foliatura, quia definit in Folium.

"6. TRICHOMANI Theophrastus eodem loco, quo Adianto,

Kaulov tribuit.

#### CAP. III. DEFLORE.

Argumentum.

1 Affertio Plantas quasdam fallo FLORE CARENTES re-

censet. Section culas habet 7. FLORES quorundam LANVGINEOS & MVSCO-

SOS confiderat. Sectiunc. 20. Flores fulfo STAMINEOS. Sectiunc. 20.

Flores RELIQUOS Confuse cognitos.

to includ) Sections. 2270 is 17.000 from

I.

I. Præter Colocasiam & Equisetum, de quibus Fragmenti hujus c. 1. assert. 1. sect. 4. seq.,

"2. BECHION hoc est Tussilaginem absque Flore esse scribit Plinius l. 26. c. 6. Id ex negligente observatione provenit. Fugacissimus enim Flos Tussilaginis ante Folia erumpit initio veris. Confer. Dodonæum Pemptad. 4. l. 5. c. 19.

"3. CORYLI Rubellos Flores deprehendit Tragus (quos Theophrasto "Histor. Plantar. l. 3. c. 6. memoratos esse vult) Rrauterb. part. ult. c. 67.

& confirmat Camerarius vel Matthiolus in Dioscorid, l. 1. c. 97.

, 4. Flo-

3.4. Florere eam negarunt quidam apud Theophrastum dicto loco, & apud Ruellium de Natur. Stirp, l. 1. c. 55, & Fuchsius Plantar. Histor. C. 152.

5. FICVI denegatum ese Florem vulgo \* creditur. Latet autem in Fructus Pulpa.

\* Scalig. in Theophr. de Cauf. Plant. 1. 2. c. 23. (p. 152. a, edit. Genev.

" 6. HORDEVM non florere scribit Tragus part. 2. c. 22. Rocken, " Waisen, Spels, Dinckel, Umelkorn, Rern, und andere bluben alle "auf Johanni, mit kleinen gelben Kafelein oder Zäpflein, ausgenom-"men Gerst bringt feine Blute.

"7, At Theophrastus Hordeum florere & deflorere scribit Histor.

Plantar. I. g. c. 3. init.

1. Admodum Confusa Descriptione Florum utitur Theophrastus paulo ante finem capitis proxime dicti.

,2, Τα Ανθη τα μεν ΧΝΟΩΔΗ, Flores alii LANVGINEI, ut ωκαθάπες πε πάντων ως είπειν omnium fere Spicam gerentium (sc. ,Σταχυωδών τα δε Φυλλώδη, κα- Semina in Spicam digesta;) alii fo-3, Sanee Tov Xedeonov. - - liis constant, ut Leguminum. - -

,3. Xvowdes de Hay To TE Key-

22 X 08 HOW MEXIVE.

Flos Lanugineus etiam Milio

4. Et Histor. Plant. I. 1. c. 21. "Aνθη Χνοώδη καθάπες το της | Flores Lanuginei, quemadmo-"AUTERS HON DUNAMINS HON TE dum , KIT/8.

Vitis, atque Hedera.

5. At Flores Frumentorum sunt Stamina dependentia. De Vitis

& Mori Floribus dicemus in Speciali nostra Plantarum Historia.

6. Nunc quæritur, utrum Flos Lanugineus is fit qui MVSCOSVS dicitur Penz & Lobelio, Clusio, Dodonzo, & Dalescampio; & Mosecht Tabernæmontano.

"7. Penæ & Lobelio quidem Thyr sus LVTEOLÆ Muscosus Stirp. "Adversar. p. 149. & Flos

"PHYLLI tam Feminipari quam

"Maripari ibid. p. 99. and have a second of the

" 8. RANVNCVLI MINIMI (id ,; est Fumaria Bulbosa Minima Tabernamontani Rrauterb. part. 1. sect.

1. fin. p. 95.) Stirp. Adversar. p. 300.

"9. SAXIFRAGÆ ANGLICÆ,

"(Polygonum Minus est Gramineum Repens Casp. Bauhini Pinac. l. 7. sect. 5. in Polyg. Min. 2. Rnauel) Stirp. Adversar. p. 183.

"10. Clusio præter Phylli utriusque Florem Flos OLEÆ Rarior. Plan-

tar. Histor, l. 1. c. 11. & l. 4. c. 32. in Phyllo Feminifico.

"LENTISCI ej. l.c. 10. "LYSIMACHIÆ LV-

"TEÆ TERTIÆ 1. 4. c. 35.

"POLYGONO MA-

RINO 1. 1. c. 62.

TEREBINTHI ej. l.

C. II.

" u. Dodonzo Muscosus est Flos CHRISTOPHORIANÆ sive Aconiti Bacciseri Pemptad. 3. l. 3. c. 12.

"12. LYSIMACHII AQVATILIS

Pemptad. 4. 1. 5. c. 31.

"13. PETASITÆ ejusd.l.c.20. Hic

Spicam gerit Crassam & Obtusam ex Capitulis Florum compositam, singulis Capitulis aliquot Flosculi, & in Flosculis Stamina & Styli (ut in Jacea, Scabiosa &c.)

"14. Muscosum etiam dicit Florem RICINI Pemptad. 3.1. 2. c. 11.

Ego observavi Florem ejus constare e Ternis, Oblongis, Parvulis, Angustis & fere Teretibus, Bisidis, obscure Purpureis aut Rubellis Folio-lis ex apice Rudimenti Fructus prominentibus. Confer. Flores Purpureos Quercus.

"15. His addere licet Florem SANICVLÆ Pempt. 1. l. 5. c. 23.

"TAMARICIS Pempt. 6.1. 2. c. 5. "& THALICTRI five Thalietri Pem-

ptad. 1. l. 3. c. 3.

"16. Dalescampius Primam Speciem EVPATORII AQVATICI "five Cunigundinæ Flores Muscosos ferre scribit, quasi eminus intuitus. Vide de hoc Flore Fragm. 3. Portion. 1. c. 5. assert. 4. sectiunc. 1. sequ.

,17. Ta-

, 17. Tabernæmontano denique Flos MERCVRIALIS FEMINÆ

Mosecht dicitur Rrauterb, part, 2. sect, 5, c. 14. (p. 267.)

, 18. Sane Thalistri Flores, quos Dodonæus ob Staminum multitu-"dinem Muscosos dicit, Casalpino de Plantis I. I. c. 7. adeo exiles sunt, ut "Flocci videantur Lanuginei.

,19. Ceterum Theophrastus Hist. Plant. 1.3. c. 11. FRAXINVM ferre

, scribit olor Bova na Sawee n AAONH velut Muscos, ut LAVRVS.

,, 20. Pilulas pingit Auctor Herbarii Lugdunensis l. 1. Muscos in "Globum coactos similes Pilis (einem Bal, Sphæris) Cæsalpinus & Camerarius in Matthiol. l. s. c. 31. vocant. Non adeo bene. Vide Historiam nostram sestiunc. 5. dictam.

#### III.

1. Sunt & Flores quidam falso STAMINEI dici, qui rectius ex Flosculis Cavis sive Fistulis arce farcti sive Fistulosi dicerentur. nei dici poslunt, qui solis Staminibus constant, ut Secalis (Rogfen) &c. (f)

" 2. Ita Clusius Stamineos Flores tribuit CARDVO MOLLI PRI-"MO Rarior. Plantar. Histor. l. 5. c. 41. & CIRSIIS ejusd. l. c. 40. in Squamatis Capitulis, qui tamen videntur aliis Carduorum capitibus fimiles. hoc est, ex Fistulosis Flosculis conferti.

CENTAVRII MAJORIS "3. Eidem Villost dicuntur Flores

"l. 4. c. 5. qui Staminei Dodonæo Pemtad. 3. l. 1. c. 11.

"4. Idem Dodonæus Stamineos Flores tribuit

Pem-CNICO Pemptad. 3. 1. 2. c. 5. CONYZÆ MAJORI AL-

"TERI Pemptad. I. l. 2. c. 32.

" ptad. 5. l. 5. c. 17. &

,,&

HELENIO Pemptad. 3. l. 1.

" 5. Expressius autem de Stamineis Floribus in

JACEA five Stoebe Pemptad.

, I. l. c. c. c. fin. Aphyllanthes, inquit, non temere dici potest, absque , Foliis enim est Flos ejus, ex solis dense confarctis Staminibus constans.

<sup>(</sup>f) Inter illos ipios flores, quos recentioris etiam ætatis botanici credidere stamineos, plures esse dipetalos confirmavit Cl. Michellii industria in Novis Plantar. generibus, p. 35. Conf. Cl. Linnai Plantar. genera, p. 13.

6. Atqui, inquam ego, sicut in Foliatura (in Laubung) non fola ea sunt vere Folia, quæ Plana sunt, seu quæ Latitudinem habent Terminatam, uti pleraque, sed ea quoque quæ Latitudinem habent interminatam, uti sunt Folia Cepa &c., intus scilicet Cava; ita quoque inter Folia Florea recenseri possunt & recensentur etiam, quæ Interminatam, sive in se Recurrentem habent Latitudinem, ita ut quilibet Flos καλυκώδης (Campanisormis) aut καλαθώδης, aut κυτικώδης, uno quasi Folio constet.

8. Ita Aristolochia Flos uno Folio constat Interminata Latitudinis,

quamvis quod ad Longitudinem sit Terminatus.

9. Ita quoque Flos Cyani, Scabiofarum, Aphyllanthis.

to. Quod si nomen inter Folium & Stamen intermedium dare libeat, non repugno, verum propior est essentia hæc essentiæ Foliorum, quam Staminum.

II. Deinde Folia illa Curta & Interminate Lata, que conficiunt Vinbonem seu Pomum in Floribus Pomosis, non Stamina sunt, sed ad Folia In-

terminatim Lata pertinent.

"12. Clusius ipse in Disco Asteris tertii Flosculos Luteos multos "Quinque Foliorum (hoc est, Laciniarum) describit Rarior. Plantar. Hi"stor. l. 4. c. 7. & ex similibus Concavis Flosculis Discum Doronici tertii
"(Gembsenwurz) & quinti (hoc est Bolserley) compositum testatur, sed
"illius Quinque, hujus Quatuor Crenis Fissis, ejusdem l. c. 8.

"13. Chrysanthemi Cretici Clusi Rarior. Plant. Histor. l. 3. c. 32. Discus ex Flosculis ducentis & sexaginta circiter constat arcte farctis. Quilibet est Circinus Tubulus, cujus ora in Quinque Lacinias Acutas est Fista.

"14. Ex Tubulo prominet Stylus paulo longior, Apice in Bina Gornua Citrina Fisso. In interioribus tamen Disci Flosculis Stylus Bicornis nondum est exsertus.

15. Quot sunt Flosculi, totidem sunt Viridia Seminum Rudimenta, quibus Flosculi inhærent singulis singuli.

"16. Tabernæmontanus denique flocfichte Blumen BELLIDI FLO-

"RE PLENO (gefülleten Mahslieden.)

IMPERATO-

"RIÆ NIGRÆ (Schwarz Meisterwurz) & SCABIOSÆ tri-"buit Krauterb. part. 1. iect. 3. c. 15. (p. 245.) qui Jaceas quoque vo-"cat Flockblumen.

"Ihre

"17. Ihre Blumen, inquit part. ejusd. sect. 5, c. 11. (p. 447. & 449.) "find von vielen Faselein oder Flocken an statt der Blatlein zusammengesetzet.

18. At in Imperatoria Nigra Flos adest ex Novem vel pluribus Al-

bis nitidis Foliis Stella instar compositus.

19. Ex Centro vero Floris hujus surgunt Pediculi conferti, quorum Capitula Oblongiuscula Binis gravida sunt Seminibus. Pediculi hi Staminum quasi sunt loco. Sunt enim ex Virore Albicantes, simulque gerunt Semen, & forsan singuli suum Flosculum. Inaquales sunt, alii Breviores, alii Longiores. Observabatur anno 1651. Augusti sine.

20, Amplius & diligentius & in pluribus Individuis & diverso tem-

pore observandus hic Flos erit,

#### IV.

1. ALNI Frudum & Iulum videtur confundere Tragus Rrauterb.

part. ultim, c. 63. dum Iulum in Fructum mutari putat.

"2. Im Frühling, inquit, bringen die Erlen braune Blut oder "Getreid, schier wie die Bircken und Büchen. Doch fallen gedachte "Erlenzäpstein nicht so ab, wie an den Büchen, sondern werden gank "hart und gedrungen, anzusehen als Oliven. Gegen den Herbst sepn "sie zeitig, und fallen ab, draus werden junge Stöcklein.

"3, Hæc Bauhinus exscripsit in Matthiol. in Dioscorid.l.r. e. 93.

"4. Reclius Casalpinus de Plantis I. 2. c. 8. Hieme fert Amentum;

" Æstate autem & Auctumno Fructum ex Squamis.

"s. BALSAMITÆ MAJORI (Frauenmung, Romisch Salben) "Comam tribuit Dodonæus Pemptad, 2. l. 4. c. ult. Aurei Coloris ex mul-"tis Flosculis veluti Corymbis, Tanaceti atque Eleochrysi modo in Umbella "coharentibus, quorum singuli ex multis exiguis Staminibus Luteis simul "farctis compositi sunt,

6. Satis perplexe, obscure & confuse loquitur Dodonæus. Estne Vmbella idem quod Coma, an pars Comæ, & Corymbus idem quod Vm-

bella, an pars Vmbellæ?

7. Ego Balsamitæ Majoris Flores in Thyrsum Rarum dispositos dicerem, Balsamitæ item Minoris, sed Balsamitæ Minoris Thyrsum Vmbellæ amulum.

"8. EVPATORII AQVATICI sive Gunigundinæ PRIMAM. SPE-"CIEM Flores Valeriana similes ferre dicit Tabernæmontanus Rrauterb. part. 1. sect. 4. c. 8. (p. 343.) quasi eminus intuitus.

9. Nihil simile stabent Floribus Valerianæ, nisi quod in Vmbellas sunt dispositi. Sed Valerianæ Flores ex Foliis constant, non Flosculis.

Vide Fragment. 3. Portion. 1. c 5. assert. 4. sectiunc. 1. sequ.

"10. FILIX PALVSTRIS five Osmunda putatur Florum Ligulas "emittere Penæ & Lobelio Stirp. Adversar. p. 363.

11. Specie, non vere. Sunt enim Folia non explicata. Confer.

Cæsalpin. de Plantis l. ult. c. 4. & Dodon, Pemptad. 3. l. 5. c. 2.

"12. HYACINTHVS HISPANICVS Clusii Rarior, Plantar. Histor. "1. 2. c. 25. sive Hyacinthus non scriptus Dodonæi Pemptad. 2. l. 2. c. 17. "male Longistorus sive Oblongo Flore Caspari Bauhino Pinac. l. 2. sect. 1. "in Hyacinth (3) & Δολίγαν Θ Petro Laurembergio Apparatus Plantarii l. 1. c. 11. 5. Spec. Hyacinthi, dicitur.

13. Flores enim hujus non videntur Longiores Floribus Orientalis Hyacinthi, nifi quod Orientalis Florum Oras magis habet Reflexas, ita

ut medius fit inter Longistorum & Stellatum.

"14. MERCVRIALIS FEMINA, sive Florens Cæsalpini de Plantis "1. 8. c. 2. scribitur Racemulum ex Alis Oblongum & Tenuem ferre refer-"tum Granulis Herbaceis, qui Flosculi sint sine Fructu.

15. Quid igitur sunt ista Granula? Sunt Flos nondum explicatus,

ut Flores Capparis quibus vescimur.

"16. POLYGALÆ MAJORIS PRIMÆ, Herbæscilicet, Flores, Flo-"ribus Fumi Terræ non multum absimiles esse Clusius scribit Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 22.

17. At Polygalæ Herbæ Vulgaris Flores videntur aliquid conforme

habere cum Floribus Gladioli.

#### CAP. IV.

#### DE SEMINE.

#### Argumentum.

1 Assertio nullam Plantam ex iis quæ sponte oriri sine Semine putantur, SINE SEMINE oriri, probat. Sectiunculas habet 36.

Scho-

Scholi	ion 1, Aristotelis sententiam	de Plantis sponte or	ientibus
	proponit.	Sestiunc.	. 14.
	2. Sterilitatis falso cred	itæ CAVSAS.	
	2.000	Sections.	50.
Corol	lar. I. CVPRESSVM & TR	IBVLVM Sponte n	
	contra Cardanum p		
		Sectiunc.	8.
	2. Plantas ALIAS falfo	Steriles creditas supe	rioribus
. :	adjicit.	Sectiunc.	. 6.
2	FICVM ex Semine prop.	agari contra Sennert	um pro-
.7	bat.	Sectiunc.	3-
2	ÆGILOPIS Semen a Ti	beophrasto descriptun	
10 mg/m 11	the Stum facit.		3.
4	RICINI Pericarpium r	ectius, quam a Pen	a & Lo-
•	belio factum, descri	bit. Sectiunc.	4.
5	Plantas quasdam a CÆS	SALPINO in alienas	CLAS-
•	SES relatas enarrat	Sectiunc.	8.
6 .	COR Seminis non ver		omnibus
	Arboribus oftendit.		2.
Coroll	lar. reprehendit Cæfalpinum	, quod incipiat a Di	fferentia.
	Difficiliore.		14 1
7	SEXVM Plantarum con	nfiderat.	11 12
	r Statement entage interpresió	Sectiunc.	20.

#### I.

1. Qui Plantas SINE SEMINE nasici probare nituntur:
Primo, VBI SEMEN NVLLVM ESSE POTVIT, proge"neratam Plantam fuisle, monstrare contendunt; verbi gratia, ex Terris
"Incultis, alteque Effossis uti Joan. Baptist. Porta Villæ 1. 4. c. 2. & Phytognomon. 1. 2. c. 1.

- 2. Ex Commissuris Lapidum in Muris Violas Luteas nasci vult Tra"gus Kräuterb. part. 1. c. 191. circa init. Gal Fivlatten sindet man zu
  "Colln am Rhein allenthalben auf den Mauren wachsen aus den Fu"gen der Steine, welche chne Zweisel von Natur ohne Samen oder
  "Pflankung hervorkriechen. Confer. part. ult. c. 80.
- Vento ferri quoque possit.
- 4. De Semine Inconspicuo Theophrastus Histor. Plantar. l. 6. c. ult. init.

m iviwo Auaugov.

, Ta de etepa warta nev Av Sei na) Reliqua omnia & Florem & Se-, ΣπερμοΦορεί. δοπεί δε έπαντα, ! men ferunt. At putantur non o-"δια το μη Φαυερον είναι τινών mnia ferre, quod non manifestus , Tov Kaprov, enel nel To Avgos , fit quorundam Fructus, quia & Flos quorundam Inconspicuus est.

5. Et de Causis Plantar. 1. 4. c. 5.

, O & Egiosos opodoy suévos yeu- | Caprificus vero procul dubio ge-, va. --- revva de nay to the out nerat. -- Generat vero & Thy-, με Ανθος και άλλων, απεός την mi Flosculus & aliorum Semina, , ημετέραν αιθησιν Αφανή. το δ qua nostro Sensui Inconspicua; at ο, Ανθος μόνον Φανερόν.

Flos folus cernitur.

"6. Accedat Varronis locus de Re Rustica I. r. c. 40. circa init. ex "Theophrast. de Cauf Plantar. l. t. c. 5. Quadam ad genendum usque "adeo Parva, ut sint Obscura, ut Cupressi. Non enim Galbuli qui nascun-, tur, id est, tanguam Pila parva Corticia, id Semen; sed in iis intus Pri-"migenia Semina dedit Natura.

7. Ita Dentis Leonis & Salicis Lanugineum Semen a Vento circumquaque dispergitur, ut non inepte dixerit Anaxagoras referente Theophrasto Histor. Plantar. l. 3. c. 2.

"τον Αέρα πάνων έχειν Σπέρμαζα, | Aerem omnium continere Semina,

aut certe plerorumque.

8. Accedit huc, quo Minora Semina, ev esse Fertiliora. Vide Theophrastum de Causis Plantar. l. 2. c. 17.

9. SECVNDO Amnium Fluentis deferuntur, unde ad Ripas plena

Herbarum copia.

20. De Nesso Amne Theophrastus Histor. Plant. loc. proxime di-" do refert, quod in Abderensi agro Alveum sape mutet, & simul ac mutaverit, tantum materia in iis locis congerat, ut intra triennium , Opaca omnia reddat (συνηρεΦείν est in Græco ab έρέωω contego) scilicet Fruticibus & Herbis.

11. TERTIO potest alio casu fieri, ut Avibus aut aliis Animalibus deferantur, vel Pennis, vel etiam Ventriculo, ut e Fimo nascatur Planta. Vide Theophrastum de Causis Plantar. 1,2, c. 23. & 24. & Tabernæmontan. Rrauterb. part, 3, fect. 3, c. 23. (p. 691.) Bur Old

12. QVAR-

12. QUARTO Imber etiam idem facere potest. Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 2.

"συγκαθαφέρει (ή Επομβρία) πολ- Defert (Imber) secum pleraque

,, λά των Σπερμάτων. | Semina.

13. Ad id quod Porta scribit Villæ l. 4. c. 2. & Phytognomon., l. 2. c. 1. de Herbis natis e Terra ex antiquorum ædisciorum fundamentis, eruta, noto, per totam Terra crassitudinem dispergi Radiculas, unde potuerunt oriri.

14. Item Semina diutius posse integra perdurare, ubi causis putre-

facientibus atque immutantibus non sunt exposita.

- 15. Secundo nonnulli si quam Plantam admixta Terræ re aliqua Letiorem propullulare vident, putant statim EX MATERIA HETERO-GENEA nasci ut e Semine.
- 16. Sic quod Cornua Animalium profint Asparagis, ex iis hos enascic creditum est Didymo, Geoponicor. Constantino nuncupator. l. 12. c. 18. quibusdam apud Dioscoridem l. 2. c. 152. Plin. l. 19. c. 8. circa med. Vide etiam Tabernæmont. Rrauterb. part. 1. sect. 5. c. 1. (p. 426. fin.)

"17. Ita ex Stercore Anserino enasci Anserinam nonnulli putant apud

Tabernæmontanum part. ejusd. sect. 4. c. 20. (p. 350. fin.)

- "18. Ad id, quod de Silvis ex Pluviis & de Laserpitio ita ortis Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 2. sin. & de Causis Plant. l. 1. c. 5. init.; & ex eo Plinius l. 16. c. 33. sin. prodiderunt, respondendum, Terram Imbribus suisse adjutam, quæ forte suit siccior quam ut Semina sua quæ jam continebat, nutrire posset; vel etiam Semina Vento & IMBRE a proxima Silva esse delata.
- "19. Quod autem Pluvia Semen deseratur, vel ex Ægypto patet & "Africa (ex Columell. de Re Rust. l. 2. c. 12.) ubi Agricola post Semen, tem, ante Messem Segetem non attingit, quia vel nulli vel rari sunt "Imbres.
- quam ego, Nilus Semina invehere melius quam Pluvia:

" 21. De Laserpitio præterea opinionem Theophrastus ut alienam, non suam refert, nec approbat, quare nec nos credere necesse habemus.

"22. Ceterum Aristoteles Plantas a Putrescente vel Humo vel Par-"te aliqua Planta oriri docet Generat. Animal, l. 1. c. 1. fin.; ex Nive R 3 " de Plantis l. 2. c. 3. med.; ex Aqua crassitie c. 4. init., ubi & plura

"hujusmodi vide.

,, 23. Theophrastus ex Lacryma Equapium (1π α οσ έλινον, quod Ju-"lius Cæsar Scaliger transfert Vaapium) & Lilium & alia quadam exire docet Histor. Plantar. l. 2. c. 2. init, & de Caus. Plantar, l. 1. c. 4. circa "finem. Scammoniam præterea & Swyrnidem Fruticellum nominat Hist. dict. l. 9. c. 1. Non credo ego.

,, 24. Idem ex Ligno minutatim Conciso Stirpium Generationem sieri

"tradit dict. Histor, 1, 2. init.

, 25. Dioscorides l. 1. c. 110. fin. quosdam memoria prodidiffe refert, "Corticem Populi Alba & Nigra particulatim Casum & Sulcis Stercoratis

"mandatum omni tempore edules Fungos proferre.

26. Quod Scaliger repetit Exercit, 104. fect. 17. fin. & Porta Magiæ "Natur. l. 3. c. 1. ubi etiam ex Dioscoride docere vult, Fungos particu-"larius iis locis gigni, ubi Clavus Ferreus, in quo sit Rubigo, aut Panni "Marcor adfuerit. Nam fi juxta Serpentis Cavernam, Arboresve No-, xias, Noxios esfe.

27. Credo Portam respicere Dioscorid. l. 4. c. 83. init... ibi Dioscorides Clavum, Pannum, Serpentes dicit causas esse non Fungorum simpliciter gignendorum, sed Venenatorum Fungorum. Ejus ver-

ba funt:

"Παρά πολλαῖς δε ἀιτίαις γίνονται | Multis vero de causis gignuntur , τοι ετοι (Φθαρτικοί.) η γαρ Ηλοις tales (fc. Venenati.) Aut Clavis "Kariouévois, n Paner: Seon- Rubigine consumtis, aut Pannis Pu-, TOOH.

trefactis &c.

29. Tertio Plantam SEMINE omnino CARERE volunt. Conf. c. 2. aff. 1. fectiunc. 4, 8.

30. Communiter Semine destitui feruntur Plantæ EXCAVLES, uti funt Adiantum, Ceterach five Scolopendrium, Filix, Lonchitis, Phyllitis (Hirschrunge:) will word and

31. Seminis Rudimentum evanidum, non Semen concedunt Pena " & Lobelius in Filice & Filice Palustri sive Osmunda, & Lonchitide, Stirp.

5 Adversar. p. 362. 363. & 364.

32. Sed Phyllitis &c. Radicibus Fibrofis constant, non fatis ad propagapagationem aptis. Nullas enim Transversas emittunt Radices. Necesse igitur est Semine aliquo instructas esse.

- 23. Etiam Tuna Folio tum Florem tum Fructum gerit.
- 34. Cum vero etiam non Cauligeræ Semen in Foliis supinis ferant, minus probabile est, esse ullam Essentialem Sterilitatem hoc est, Seminis absentiam in Planta aliqua CAVLIGERA.
- , 35. Theophrastus quoque nullam esse Plantam toto Genere Sterilem, hoc est, cujus quodlibet Individuum Semine Fecundo careat, sentire videtur de Causis Plantar. 1. 4. c. 5. & alibi.
- , 36. Et l. 1. c. I. non dicit solum, Plantas qua Semen ferunt, Semine "pronasci, sed e Semine Generationem omnibus communem esse fate-"tur his verbis: ότι μει δι κοινή αασιν ή δια τε Σωέςματ . Γένεσις, Cavepor.

#### SCHOLION I

- 1. Aristoteles Generat. Animal. 1. 3. c. 9. fin. non omnes Plantas Sponte oriri posse putavit.
- "Oxeias avlav, xadanee or te Opt- per Coitum illorum ficut & Aves ,, Des non ta Zwotóna, non tan IX- & Vivipara & Piscium plurimi; ,, Jum ol nacisol ta d'Avlópara, alia vero Sponte, modo nonnullaη καθάπερ ένια των Φυομένων.

2. Plystag de ta pir (Erropa) it | Oriuntur vero alia (Infecta) rum Plantarum.

- 3. Alioqui non Erra Tar Duomerar sed Ta Duomera dixisset.
- " 4. Absque Semine autem Herbam nasci credit, quod Herba "Materia movetur motu, quem Semen moveret, Metaphys. 1. 7. t. 31. fin. (§. 25.) Vide ibi Alexandrum.

- 1. Quod quædam Herbæ putantur Sponte nasci sine Semine, sit inde, quia non fatis funt observata. Si enim diligentius inspiceremus, Semen etiam omnium & nil nisi Semine nasci videremus.
- 2. Quare etiam de Oleribus jam certa res est (fatente Theophra-" sto Histor. Plantar. 1. 7. c. 2.) ea omnia nasci posse e Semine. Hominum enim cura maxime circa illa fuit, & diligentissime observata
- 3. Idem de causis Plantar. 1. 1. c. 1. causam erroris hujus tradit his verbis:

39 4. Διά δό κί κρῆδαμ (τῷ Σπέρμαδι)
3, τῶς γεωργὰς ἐπ ἐνἰων, ὅτι πὰ ποναπ
3, Αυθομάτων παραγίνεθαι, κὸμ διά το
3, κὴ ἐνομ ῥαδίως ἐπί τινων λαυβάνειν
3) κήτε τῶν Δενδρων, κήτε τῶν Ποωδῶν
3) τὰ Σπέρματα, διὰ τῷ τὰ ἐκ διονταί
2, τινες πάντα Φύειν ἀπὸ τῷ Σπέρμα3, ἔπὶ τῶν Συκῶν.

5. Et c. 5. circa finem:

37 Ολίγα δε Ακαρπα των Ομογε37 νων οι ύλοτομομ Φασιν είναι. Ταυ37 τα ήτοι λαυθάνειν είκος, η δια το
37 καταιαλίσκειν είς άλλα την Τροφήν
37 Ακαρπα γίνεσσαι, καθάπερ τὰς
37 Αμπέλες τὰς Τραγώσας κὰ όσοις
37 άλλοις τέτο συμβαίει γινόμενον
37 έπὶ των Καρπίμων η Καρποφό38 ρων.

Quia non ntuntur (Semine) agricola in aliquibus, quod celerius Spoorte prodeant; item quia non possunt facile in quibusdam accipi tam Arboribus quam Herbis Semina, eapropter non putant quidam omnia nasci e Semina posse, quod manifestissimum in Ficis.

Pauca Sterilia ex iis qua Generis unius lignatores dicunt esse. Qua & aut latere consentaneum, aut, quod absumant ad aliu Alimentum, Sterilescere, quemadmodum Vites qua quasi Hirci funt, & quotquot aliis illud evenit inter ea qua Fructum forre apta aut Fructum ferunt.

6. Nonnunquam fieri verum est, ut Planta aliqua, cujus Species Semine alias non destituitur, OB SOLI, in quo sita est, INEPTI-TVDINEM nec Semina nec Flores, imo nec Caulem quidem ferat, quam propterea Diversa statim Speciei esse credunt, cum tamen ex Accidenti tantum id contingat;

"7. Quemadmodum Tabernæmontanus (Dioscoridem 1. 3. c. 87. "secutus) tertiam Speciem facit Libanotidis quæ sit Infrugisera, cum alias eam primæ dicat esse persimilem Kråuserb. part. 1, sect. 4.

C.7. (p.315. & 316.)

8. Imo forsan ne Sterilis quidem est, sed nondum adulta, necdum Fructui ferendo atate par. Observetur igitur Libanotidis Generatio.

"9. De Fraxino Tragus Rrauterb. part. ult. c.78. Eschernbaum ist "zwenerlen Urt, haben bende Laub wie Sperwerbaum, habe nie keine "Frucht an diesen Baumen gesehen.

19. Et tamen Fructus in Apothecis satis notus est (Linguam Avis, vocant. Fructus Arboris, quæ Hahnbuchen, non appellatur eo no-

mine, ut Tragus credidit ejusd. part. c. 73. & 79.)

Vid. Fragm. 3. port. 1. c. 6. all. 2. fectiunc. 2. 3.

11. Quod si hoc Trago contigit, quid aliis minus oculatis, minus sedulis Observatoribus?

12. De Helenio Dioscorides 1. 1. c. 27:

, Exerco Ravado ex arinos is vioi Helenium Caulem non emittit in no vivos.

, 13. Tragus

"13. Tragus de eodem Rrauterb. part. 1. c. 55: So die Blumen aus, "geblühet haben, siehen die haarichte Kopffe mit ihrem Saamen (wel. "ther sich dem Kartensaamen vergleichet) bis an den Hrbst, davon mag, man auch junge Allantstöcklein, wie von obgemeldten Rebenäugelein, "zielen, welches ich auf benden Seiten versucht, und wahr erfunden "habe.

"14. Jul. Cæs. Scaliger Jesemino Florem sine Frustu salso tribuit, Commentar. in Theophr. de Caus. Plantar. 1. 2. c. 23. (p. 152. a, Genev. , 1566.) Dodonæus Pemptad. 3. 1. 3. c. 22. Semen ejus Latum instar , Lupini, raro tamen succrescere scribit. Nimirum in hoc Climate.

"15. Non scitis, inquit Varro de Re Russica 1.2.c. 1. sin. Palmulas "Caryotas in Syria parere in Judwa, in Italia non posse? Locus vi-

detur pauxillum corruptus.

"16. Sedum Majus Vulgare, quod vulgo JOVIS BARBAM appellant, Stephanus Claveus Paradox. de Lapidibus & Gemmis (Gal"licus liber est) 1. 2. c. 12. (p. 329.) inter Plantas Semine destitutas refert, (Jombarde vocat, alias Joubarbe & Joubarde.)

17. Dodonæus de Semine ejus, ut de multarum Plantarum Seminibus, filet Pemptad. 1. 1. 5. c. 8. Cum autem Herba omnibus partibus perfecta fit, & Flores Foliis, & Staminibus, denique Perianthio instructi, (ut ex pictura apparet, nam & de hoc tacet Dodonæus.)

"18. Et Sedum Arborescens sive Fruticescens, sive Sedum Majus Dioscoridis Clusio Rarior. Plantar. Histor. 1. 4. c. 40. quod in Lusitania & Italia & Græcia crescit, Stellatis Floribus, & Staminulis eorum, & reliquis partibus a Sedo Majore Vulgari non discrepans, (Perian, thium nec describit nec pingit Clusius) Semen Exile Nigrum proferat, teste eodem;

19. Verisimile est Vulgare quoque præsertim in Gallia & Italia Semine suo non destitui. Quod forsan magis perficeretur, si propa-

gatio Radicis per Appendices inhiberetur.

20. Præterea quæ Sedo cognata funt, ut Cotyledon, Telephium, Radix Rhodia, Semen quoque Minutissimum Scobis instar ferunt.

,, 21. His adde Theophrasti Histor. Plantar. 1.3. c. 5.

22. Per Accidens etiam Semine carent, quæ carent, quia EX TALEA propagatæ, ficuti Arbores quæ ex Stolonibus fiunt, Fecundæ putantur.

23. Aristoteles Gener. Animal. 1. 1. c. 18. circa fin.

, Ενια δ' ε φέρει Σπέρμα οίον Ιτέκ | Quadam non ferunt Semen; ut Salix & Populus.

"24. Theophrastus de Caus. Plantar. 1. 4. c. 5. & alibi, de Vlmo & "Salice ait ambigi, utrum Fecundæ sint.

"25. Plinius I. 16. c. 26: Fructum Arborum solæ nullum ferunt, boc "est, ne Semen quidem Tumarix, Populus, Alnus, Vlmus Atinia, Ala-S "ternus. Et c. 17: Atinia (Vlmi) non ferunt Samaram. Ita vo-

" catur Vlmi Semen.

"26. In SALICE fane Floris vice Lanitium Amenti sequiunciam "Oblongum & Teres propendet, nec Seminiperda semper est, ut "Homerus vult Odyss. z paulo ante sin., quia alicubi Semen excipitur, & Satum oritur.

27. Idem testatur Tragus Rranterb. part. ult. c. 60: & Clusius Rarior. Plantar. Histor. 1. r. c. 54. & 55. Anno 1626. Pentecost. festo, in Salice Fragili Luteis Flagellis, in Annotinis (ejus) Surculis numerosa Thecularum sive Siliquarum Teretium Turbinatarum Series; Imum Surculi Annotini & Summum tantum Foliosum, Surculi Horni Theculis cassi.

28. In Theculis Lana; intra Lanam fingulum Semen Pufilum Nigricans. Quædam Semina deprehendi Albida, Maculofa, hæc

Immatura judico.

Vid. fectiunc. 39.

"29. Adjiciam locum Plinii ex 1.16. c. 26: Ocyssime Salix amittit, "Semen, antequam omnino Maturitatem sentiat (v. etiam Theophrast. Histor. Plant. 1.3. c. 2. init.)

,,30. Providens Natura facile nascenti & depacto Surculo Incurio"sius Semen dedit. Vna tamen proditur ad Maturitatem perferre
"solita in Creta insula &c.

31. POPVLI NIGRÆ Seminis aperte meminit Dioscorides 1.1.

c. 114. ubi dicit:

, ο Καρπος δε μετά Öξες πινόμενος | Fructus vero cum Aceto potatus

2, Επιληπίικες ωφελεί. | Comitialibus utilis est.

32. Non dubium ergo, quin & reliquæ Species Semen suum habeant, quod & in Amentis, uti in Nigra latitare puto. Confer Historiam nostram Specialem Plantarum.

"33. Plinius ipse l. 17. c. 11: Populis eadem ratio Semine, qua Vlmos,

nsferendi: transferendi quoque e Seminariis eadem & Silvis.

"34. VLMVS ATINIA non seritur e Samara. Sic ait Columella "de Re Rustica I. 5. c. 6. Et post initium ejusd. cap.: Atiniam Vl. "mum Tremellius Scrofa non ferre Samaram (quod est Semen ejus "Arberis) falso est opinatus.

"35. Nam Rariorem (Samaram) fine dubio creat, & ideirco plerisque "Sterilis videtur, Seminihus inter Frondem, quam prima Germina"tione edit, latentibus. Itaque nemo jam ferit ex Samara sed ex

, Sobolibus.

"36. Vide Matthiolum in Dioscorid. 1.1. c. 95. qui alterum ex duo-

"bus Vlmorum Generibus etiam Sterile, facit.

37. De his & reliquis fectiunc. 25. nominatis Clusii verba audire 2, operæ pretium fuerit ex Rarior. Plantar. Histor. 1. 1. c. 2. 3. Nemo, 2, inquit, rei Herbariæ adeo ignarus est, qui ALNOS ex Semine, quod

"in Globulis Adultiores ferunt, nasci non sciat, cum & ipsis Rusticis

and fit notum.

"38. TAMARIX fane ex Semine non semel mibi nata est. Popu-"los, Salices Seminibus Papposa Lanugine involutis provenire; VI-"mos item Atinias ex Samaris (ferunt enim Semen sed minus quam "Latisolia)—plerumque vidi.

"39. Et ante hæc: In ALATERNO Arborescente nullum Fructum "vidi. In Alaterno Humiliori Fructum Racematim cohærentem, Len-"tiscini Magnitudine, Rubescentem non nihil, qui Tribus Nucleis con-

"stare videtur, forsan Maturitate Nigrescentem.

Vid. fectiunc. 29.

,,40. LILIVM tam Album quam Aureum Tragus sine omni Fructu , & Semine scribit Rrauterb. part. 2. c. 84. & 85.

41. Dioscorides Seminis meminit 1, 3 c. 116. circa finem:

, Το δε Σπέρμα (Κρίνε) Ερπετῶν | Semen vero (Lilii) Serpentium , δήγμασιο ἀθιφάομακου ποθέν. | morfibus adversatur potum.

42. Videtur autem Pollinem Luteum Staminum intelligere. Pli-"nius vero 1.21, c.5: Alba Lilia iisdem omnibus modis seruntur, qui-"bus Rosa. At c. 4: Tardissima proveniunt (Rosa) Semine, quod in "ipso Cortice est sub ipso Flore opertum Lanugine. Ergo etiam Lilia

Semine proveniunt ex sententia Plinii.

"43. Îdem rursus c. 5: Candor Lilii eximius, Foliis foris striatis "& ab angustiis in latitudinem paulatim se laxantibus effigie Cala-"tbi, Resupinis per ambitum Labris, Tenuique Filo (si Stamina intel-"ligit, ea satis Robusta sunt) & Semine (forte Stamine) stantibus in "medio Crocis. Per Crocos forsan Transversa Staminum Corpuscula Polline Luteo conspersa intelligit, non ipsum Pollinem.

"45. ROSMARINO & SABINÆ idem Semen denegat 1. 17.

c. 13. fin.

"46. De Sabina Dodonæus Pemptad. ult. c. 6: Et e Semine & e "Ramo feritur. Verum e Ramo fata Fructum fert nullum. Tacite innuit (quod etiam post exprimit) e Semine satum Fructum sive Semen ferre. Vnde enim alias e Semine seri posset?

47. RVTAM etiam quidam apud Theophrastum Hist. Plantar. ,1. 7. c. 2. Semine nasci negant. Sed tarde, inquit ille, nascitur,

" quare Surculo eam serere solent.

#### COROLLARIVM I

"1. Plantarum quadam Sponte nascuntur, ait Cardanus de Re-"rum Variet. 1. 6. c. 23. (§. 5.) ut CVPRESSVS in Creta & apud nos "TRIBVLVS in agris &c.

2. Quod ex Theophrasti Histor, Plantar. 1.3. c.2. circa fin. vide-

tur sumsifie, ubi ita:

S 2

, Ενιαχέ δε αν μόνον υπερτάσων ομ η κου κινήσωσιν, έυθυς αναβλασάνειν 2) TO OLKER THE XOLOGS, ACTEL IV KON-2) รๆ Kurapirloi. - - -

,, 3. ev de rois nuispoxous ear unoη νεάση, Φάνεδαί Φασε Τρίβολεν.

'Alicubi, modo Solum sulco tenui moverint, protinus emergere familiaria Terræ illius, ut in Creta Cupressi. - -

At in semina defactis, si subnoventur, apparere ajunt Tribulum.

Confer Plin. 1. 16. c. 33. fin.

4. Sed pergit paulo post Theophrastus:

, Αυτα μεν (Γενέσεις) εν εν τη με-. η ταβολή της Χώρας είσιν, είτε κάμ η υπαρχόνων Σπερμάτων, Είτε κόμ η αυτής (Χώρας) πως διατιθεμέ- etiam ipfa (Regione) quodammo-

Hæ (Generationes) ergo ob mutationem Regionis funt, five etiam existentibus Seminibus, sive do disposita.

s. Cupressum quod attinet, Sponte nasci credita esse videtur, quia ejus Semina funt obscura, ut jam diximus affertion. hujus fectiunc. 6.

6. Quæ etiam causa fuerit, cur THYMO SQVAMIFLORO Semen denegaverint. Vid. Theophrast. Histor. dict. 1. 6. c. 7.

"7. Ex Seminibus autem propagari Cupressum, ut & ex Trunco

-auctor est Theophrastus Histor. Plantar. 1. 2. c. 2.

"8. Idem Semen ejus Membraneum & Conis adhuc pendentibus exfi-"liens, ut omnium Coniferarum, expresse ostendit de Causis Plantar. 1.1. c.23. post init., cum quibus confer 1.4.c.5. Vide etiam Plin. 1. 17. č. 10. circa fin.

#### COROLLARIVM II

"I. ACERI MAJORI seu Latifolio Tragus falso Semen denegat Rrauterb. part. ult. c. 80. & Bauhinus Pinac. I. 11. fect. 5. in Acere 1.

"2. Quod CAPRIFICVS etiam Fructum tulerit, sed insipidum & "ingratum, qui tamen interdum Ficubus intermixtus sit venditus, "ex Athenæi 1. 3. (p. 76. Commelin. edit. C. D.) constat, cui Capri-"ficus Epevos & Epeveos; Fructus "Epevov.

3. "Odou 905 vero est Grossus sive Immatura Ficus. Galenus Sim-

plic. Medicament. facult. 1. 8. in Zux.:

"Ta de tar Egirear Evna deineias | Caprificorum vero Ficus acris η ετι και διαφορητικής δυνάμεως. Sunt & digerentis facultatis.

Ficus.

4. Non itaque omnis Caprificorum Fructus in Culices abiit. 5. DICTAMNO CRETICO falso Semen denegavit Dioscorides 1.3. c. 37. Conf. Dodon. Pemptad. 1. 1. 2. c. 33. & Pemptad. 2. 1. 4. c. 13.

6.De

6. De GLYCYRRHIZA Pena & Lobelius Stirp. Adversar. p.405: "Si qua est Sterilis Glycyrrhiza, uti Matthiolus sibi revera certum nesse auditione, postrenis Commentariis (in Dioscoridis 1. 3. c. 5.) prodit, tres forent Glycyrrhizæ Species. Nobis tamen quot de fancie nota, tot Frugifera sunt. (Echinata Dioscoridea & Siliquosa.)

"I. Qui FICVM ex Semine vix aut nunquam propagari afferunt\*. eos refutant Ciceronis in Cantone Majore c. 15. (si quid ponderis habent) verba hæc:

\* Sennert. natur. scient. epit. I. 6. c. 4. (fection. 4.)

" 2. Omitto vim ipsam omnium qua generantur e Terra: qua ex "Fici tantulo Grano aut ex Acino Vinaceo, aut ex ceterarum Frugum aut "Stirpium Minutissimis Seminibus tantos Truncos Ramosque procreet.

3. Ad hæc nemo inficias ire potest, Ficum Semen ferre. Si ergo verum est, ut quidem est maxime illud Theophrasti Histor, Plantar. 1. 2.

c. 1. paulo ante finem;

η Απαντα δοα έχει Σπέρματα, και Omnia que habent Semen, etiam », ἀπο Σπέρματος γίγνεται: e Semine gignuntur: fane Ficum fuo Semine progenerari nemo negaverit.

"I. Theophrastus de Causis Plantar. I. 4. c. 7, circa initium Semen " Sinesv (ut Loci Muliebres) tribuit ÆGILOPI, ideoque ex una parte " statim nasci Stipulam unam, alteram manere Otiosam toto anno.

2. Quod non folum Julio Cæfari Scaligero commentar, in istum

locum, sed & mihi suspectum.

, 3. Theophrastus etiam ibidem posteriores Stipites Ægilopis, Lotz "& Bulbi non e Semine sed e Radice pullulare, aliorum esse sententiam refert.

#### IV.

, I. Seminis Conceptacula Ternis Costis aut Loculamentis conspicua in "RICINO effe scribunt Pena & Lobelius Stirpium Adverfar, p. 306.

2. Nescio cur Costas vocent. Ego Cuneos Spharicos dicerem. Ita " e Cuneis Sphæram materialem componit Ziglerus Geographus ille Bavarus libel. de Sphæræ constructione, quem Valderus Basileæ edidie 5 3

cum aliis opusculis titulo Sphæræ atque Astrorum Cælestium Rationis & Motus.

- 3. Sunt autem *Cunei Sphærici*, vel *Semicirculares*, quorum Superficies Sphærica duobus Circulis Maximis terminatur, hoc est, quorum planæ duæ Superficies sunt Semicirculi Maximi; vel Cunei *Quadrantales* &c.
- 4. Ita Mala Aurantia Natura divisit in Cuneos, item Limonia & Citria.

#### V.

"1. Ad CÆSALPINI l. 4. de Plantis non pertinent MAIZVM c. 54. "& LACRYMA JOBI c. 55. quia non ferunt Semen sub Flore.

" na five Bina Seminum Conceptucula, five Bipertita Conceptacula, & in " Singulis Loculis five Alveolis five Cellis Semina vel Singula, de quibus usque ad c. 14. vel Plura habent.

3. Ergo huc non pertinent, quibus Fructus sine Flore est, & Flos, sine fructu, ut MERCVRIALIS & XANTHIVM, de quibus tamen

agit c. 1. & 2.

"4. L. 14. describuntur Plantæ, quæ intra Vnum Florem Multa Se-

"mina gerunt, nullo prater Perianthium Tegmine.

"5. Male ergo huc MALVAM c. 30. & feq. refert, quæ Globulum Compressum (ad instar Casei) fert, in quo Semina. Nec excusat Cæsalpi, num, quod Globulus is in septem vel octo Loculos dehiscit. Hac ratione Malva accedit ad Abutilon.

"6. Ad l. 15. non pertinet ARISTOLOCHIA, sed ad Cucurbitas. Flos enim ejus Fructui summo insidet, si picturæ Clusii (Rarior. Plantar.

Hiftor, l. 4. 47.) & Dodonæi (Pemptad. 3. l. 1. c. 1.) credendum.

7. Deinde Aristolochia non habet ad Vnum Florem Plura Conceptacula, ut Abutilon, Helleborus, sed unum quod in Plura rursus est dividuum.

"8. DENTARIA quoque ex l. 15. excludenda. Fert enim ad Sin-, gulos Flores Singulas Siliquas, ut Casalpinus ipse fatetur c. 33.

#### VI.

"1. Cæsalpinus Cor in Arboribus extrorsum vergere scribit 1. 2. c. 1.

2. Id

2. Id verum quidem videtur in iis, quæ Singula Semina Singulis Petiolis & Singulis Floribus ferunt; at non in iis, quæ in Vno Pericarpio fub Vno Flore Plura Semina, ut Mala, Pyra.

#### COROLLARIVM.

Artificium Peripateticum hoc videtur Cæsalpini, quod orditur a Differentia quæ & Difficilis est observatu, & a Paucis observata aut notata.

#### VII.

- 1. MARIS & FEMINÆ nomine pro lubitu Botanicorum quisque uti videtur.
- 2. Prastat CANNABEM, CYNOCRAMBEN (QBaldbingelfraut.) MERCVRIALEM, PHYLLVM (Welfchbingelfraut,) SPINACIAM &c. distinguere in Prolificam five Fecundam, & Florigerum, quam in Marem & Feminam.
- "3. Ceterum Clusius Rarior. Plantar. l. 4. c. 32. prafert in Phyllo Ma-"ri & Femina sententiam Theophrasti, quia magis convenit cum Mercuriali &c.
- 4. Sed Dioscoridis sententia (vide l. 3. c. 140.) potior mihi videtur, ut id fit Femineum, quod Fructum fert, id Masculum quod tantum Florem.
  - 5. Ita & Aristoteles de Plantisl. 1. c. 2:

, έυρίσκεται έν τοις Φυτοις ότι έχει reperitur in Plantis, quod habent "τα Φυτα Γένος Αρρεν και Θηλυ. Planta Genus Masculum & Femi-

neum.

,, 6. Και πάντως το μέν Αρρεν "ότι Τραχύτερον, και Σκληρότερον, Asperius, atque Durius, & magis ημαλλου Φείσσον. το δε Θηλυ Rigidum; at Femineum Debilius. καςποφόρον | & Fecundius. , A DEVÉSECON 12 πλέου.

At omnino Masculum

"7. Plinius quoque l. 16. c. 26. ante finem: Mares non ferunt.

,8. FRAMINVM CAMPESTREM five Boushias Duplicem facit "Caspar Bauhinus ad Matthiol. in Dioscorid. l. r. c. 92. Marem sive Ste-, rilem, cui Florum Racemos five Globulos Nigros Musco similes cum aliis "auctoribus (sed non bene, ut c. 3. ass. 2. fin. diximus) tribuit, qui abs"que Fructu decidant; & Feminam sive Frugiseram, qua Fructum serat, "de quo huj. cap. assert. 1. schol. 2. sectiunc. 10.

"9. Sic LAVRVS Mas dicitur Tabernæmontano Rrauterb. part. 3. "sect. 3. c. 11. (p. 676. fin.) quæ Infrugifera est, Femina Baccifera:

"10. Ad quam fignificationem pertinet appellatio PALMÆ Maris "ejusd. sect. c. 20. (p. 687.) item SAMBVCI QVARTÆ Maris ejusd. "section. c. 62. (p. 755.) & TILIÆ Maris ejusd. section. c. 40. (p. 711.)

"11. Sed addit statim Plinius: Aliqui hoc permutantes Mares esse que, ferant tradunt.

"12. Ita de CANNABE Femina Caspar Bauhinus ad Tabernæmon-"tani part. 2. sect. 5. c. 11. (p. 263.): Bringt keinen Saamen, blühet "häuffig mit kleinen bleichgrünen treuschlichten Blümlein, welche un-"fruchtbar abfallen, und vergehen, wächst aus des Männleins "Saamen.

"13. De LVPVLO Camerarius ad Matthioli Herbarii 1.4. sive ult.
"C. 145: Es ift sich wol zu verwundern, das, welcher blühet, der trägt keis, nen Saamen; dagegen, welcher Saamen hat, bekommt keine Blüte.
"Idem in titulo capitis ejusdem: Lupulus Femina, Hopffen ohne Frucht;
"Lupulus Mas, Hopffen ohne Blüt.

"14. Sed Florens Lupulus Maris, Fecundus Feminæ nomine appel"landus esset.

"15. Similem errorem puto Lobelii, quod Mercurialem Marem cum "Semine, Feminam cum Flore pingit Stirp. Observat. p. 131. qui error

tamen etiam Dodonzo est communis Pemptad. 5. l. 1. c. 33.

"16. Apud Theophrastum quoque Histor. Plantar. l. 3. c. 6. post "init. quidam binas JVNIPEROS esse dicunt, & alteram Florere quidem "sed fructum non ferre; alteram non Florere sed protinus Fructum ostendere,

"ωσπες και τας Συκας τα Ερινεα. | ut Ficos Poma procidua.

"Caspar Bauhinus Pinac. 1. 11. sect. 5. in Popul. 3. POPVLVM NI-"GRAM quandam scribunt Florem veluti Amentum scrie Colore Ru-"bente aut Candicante, at Fructum non serre; quandam Fructum serre "Racemulum, Grana tenentem Viridia & Rotunda, in quibus Lana Can-"dida, sed non Florere.

20 18. Quem-

"18. Quemadmodum idem Cxfalpin. l. 3. c. 54. init. TAXVM, in "Alpibus crescentem Arborem, Flosculos Amentaceos ferre scribit, inter "Folia sine Fructu; que autem Fructum sert, eum Rotundum gerere.

19. Videntur Arbores hujusmodi sero Florescere, & vel uno anno Florere, altero Fructum ferre; vel ubi aliquot annos Flores tulerunt sine Fructu, deinde Fructus ferre sine Flore quodamplius observandum.

20. Sane in Phyllo Marifico Dioscoridis, id est, Feminisico Theomorphrasti, negant se Semen unquam deprehendere potuisse Pena & Lobelius "Stirp. Adversar. p. 99. At Tabernamontanus Semen valde sero ferre scribit Rrauterb. part. 2. sect. 5. c. 16. (p. 269.)

#### CAP. V. DE RADICE.

#### Argumentum.

Affertio hæc, an quædam Plantæ RADICE CAREANT, disquirit. Sectiunculas habet 6.

uædam videntur quibusdam Conatum tantum Vita habere, non Vitam, uti Corallia Corallina (Muscus) & Reliqui Musci, Fungi &c.

2. CORALLIVM innascitur Conchyliis, Cranio humano aliisque Osseis, Petrosis & Lapidosis rebus, sed hoc non impedit, quo minus Radi, ces habeat, etiamsi etiam Ferrea Anchora innasci posset, uti refert Beguinus Tyrocin. Chem. l. 2. c. 10. in Tinctur. Corall.

3. Si Corallium totum erui posset e natali solo, rectius de eo judicaremus. Jam Fragmenta ejus piscatione extrahuntur hinc inde fluitantia.

"4. JESEMINVM trienne effosum absque Radice se reperisse scribit Jul. Cæsar Scaliger. Exercitat. contra Cardan. 152. sect. 2. circa sinem. Confer. etiam ejusd. Commentar. in Theophrast. l. 1. de Causis Plant. c. 2. (p. 4. b.)

5. LENTICVLA PALVSTRIS in aversa parte Radiculas inspe-"Cantibus apertissime ostendit, quam Scaliger sine Radice esse scribit Exercit. 140. sect. 1. circa med. & Comment. in Aristot. l. 1. de Plantis (p. 19. a. Genev. edit. 1566. fol.)

6. PARASITICÆ Herbæ, ut Cassutha, Fpithymum, Viscum, fruun-

tur si non suæ, at alienæ Radicis beneficio.

Vid. Scalig. comment, in Arift. 1.2. de Plant. (p. 125. a.)

# VITA PLANDARVM

Argumentum.

1 Affertio NVTRIMENTA ATTRACTIONEM in Plantis
vel per Animam aliquam vel per solam Organisationem fieri concedit. Sectiunculas habet 5
2 Solam Organisationem in Attractione illa sufficere probat. Sectiunc. 15.
Schol. Quanam Aristoteles Excrementa Plantis deneget, indicat. Sectiunc. 4.
LONGÆ VITÆ Plantarum Causam male reddi ab Aristotele monstrat. Sectiunc. 4.
Schol. Aristotelis locum ex 1. 2. de Anima t. 20. considerat & MY OMENA non esse Cordi Analogam partem in Plantis probat. Sectiunc. 13.

Ĩ.

1. La quæ in Plantis NVTRIMENTI ATTRACTIO, vel per Animam Mundi vel per folam Organisationem fieri concedendum est.

2. Si per Animam aliquam, etiam tum Organisatione aliqua opus est. Alias omnes Plantæ essent simili forma, nisi quis alii atque alii Plantæ aliam atque aliam Animam attribuere velit.

3. Si jam Plantarum Radices attrahunt, non ea solum quæ ad suam Constitutionem requiruntur, sed quævis alia, necesse est, ut sit aliqua Excretio.

4. Sin ea solum attrahunt, quæ ad Constitutionem pertinent, opus est aliquo, quod discernat Vtile ab Inutili.

5. Jam igitur Excretio illa vel Discretio, utrum per Animam sieri debeat, an vero Organisatio sola sufficiat, videndum est.

II.

(3) Organicam vegetabilium structuram, qua vivum, i. e. nutriuntur & augentur Neb. Grewii, Marcell. Malpigbii, nec non Ant. à Leewenboech detexit industria, consimmavit recentiorum omnium observatio. Conf. L. B. de Wolff. vom Gebrauch derer Theile der Pslauzen. it. vom Leben und Tod derer Pslauzen. & Celeb. Chr. Gottl. Ludwigii Institutiones histor. phys. regni vegetabilis, Part. II. & Io. Gesnerus in dist. physic. de Vegetationis & Fructificationis struct. disser. & usu. Fluidorum vero motum, quo ad singulas partes deseruntur, ejusque rationem demonstravit Steph. Hales in Vegetab. Statica; nec non Claud. Percault, de la Circulation de seve des plantes. Oper. Physic. & Mechanic. Tom. I. p. 71. seqq. De morbis autem plantarum eorumque causis vid. Chr. Sigishu. Eisfabit dist. Phys. de-Morbis plantar. Lips. 1724. Cons. Act. Lips. Academica Part. VII. Nr. IV. p. 657.

#### II.

1. Non videntur indigere Planta fingulari Anima intelligente, qua possit Alimentum Conveniens discernere ab Inconveniente.

2. Nam primo fieri potest, ut Radicum Ora ita sint Organisata, ut

non omnis generis intromittant Succos.

3. Exempli gratia, ut barum Radicum Pori constringantur & claudantur re aliqua, illarum aperti sint & permeabiles eidem materiæ.

4. Deinde quis dixerit, peculiare id habere Plantas, ut nil nisi Conveniens suæ substantiæ attrahant? Nam & illæ non minus ac cetera Viventia sua habent Excrementa, que per Folia Flores & Fructus effundunt, "unde recte Scaliger Exerc. 140. sect. I. circa med. Florem & Fructus , Planta partes negat.

,, s. Aristoteles de partib. Animal. l. 2. c. 10. ab initio Viventibus & "Perfectis omnibus partes dicit maxime necessarias esse duas; alteram qua

"Cibum capiant, alteram, qua Excrementum emittant.

6. Pergit: ,, ειτωματος εκ έχειοπον. Εκ της crementi non babent locum. , 785 Kaen8c.

"τα μεν φυτα του μεν Αχεής η Πε- Planta quidem Supervacui Ex-, The γαρ λαμβάνει πεπεμμένην ην Terra enim accipiunt concoctum "ΤεοΦήν. Αντί δε τέτε (Περιτ]ώ- | Nutrimentum. At vice ejus (Ex-, μαζος) πεοίεται τα Σπέρμαζα και crementi) emittunt Semina & Fructus.

7. Sunt etiam quædam Arbores Resinosa & Lacrymosa nuncupatæ, quæ Refinosa sua per Rimas Excrementa continuo nonnunquam effluvio exsudant, quo in genere Abies, Acacia, Cerasus, Juniperus, Larix, Lentiscus, Picea, Populus Nigra, Terebinthus.

8. Potest etiam sieri, ut Insensili Exspiratione magna Humorum

portio absumatur, veluti in Animalibus.

- 9. Signum autem est, ab Arboribus etiam per Frudus & Semina "Excrementa emitti, quia Arbores, cum admodum copiose tulerint, exarescunt Fructissicatione, quod Aristoteles animadvertit de Generat. Animal. 1 3. c. 1. circa med. Traxerunt enim plurimum Inutilis, paucissimum Vtilis.
- 10. Hinc etiam, quod dicit paulo ante: Minores Plantas effe Fertiliores.

"11. Prioris rationem addit Aristoteles hanc:

, την γας Υροφην αναλίσα8σιν είς quippe Nutrimentum consumunt in Semen.

12. Alterius:

"ή γὰρ ἐπὶ το Σῶμα Αὐζησις, γί- id enim quo Corpus Augeretur, fit "νεται Περίτζωμα Σπερμαζικόν. Εxcrementum Seminale.

13. Et l. 1. Generat. Animal. c. 8.

"ή γαρ τε μεγέθες Αυξησις τε | nam magnitudinis Incrementum ,, πεται έπὶ το Σπέρμα τέτοις. | vertitur in Semen hifce.

14. Porro autem cum constet ex Columellæ de Arborib. libri (qui alias at 3. de Re Rustica, sed a Jucundo primum a libris ad Silvinum, distinctus) c. 27. posse omne Genus Surculi omni Generi Arboris inseri (quod & Baptista Porta docet Mag. Natur.l. 3. procem.) Arbores autem secundum Materiam varie distent; necesse est Truncum trahere quædam, quæ non conveniant suæ naturæ sed Surculi insiti;

15. Ideoque quamvis Arborem omnis Generis Materiam trabere indiscriminatim, aut saltem eam Materiam quæ Arbori alicui in Nutritionem convenit, ita ut ne opus sit Intellectu aliquo Discretivo, imo ne va-

riis quidem, fed unica Radicum omnium Organisatione.

#### SCHOLION.

1. Quæ Aristoteles de Excrementis Plantarum jam afferuit, videtur negare alibi, part. Animal. scil. l. 4. c. 5. procul a fine:

2, ουδε γάρ τῶν Φυτῶν ἐδεν ἔχει neque enim Planta ulla babet

2. Περίτουμα.

2. Etiam part. Animal. 1.2. c.3. Excrementa Plantis plane vide-

tur denegare:

η, Τὰ μὲν γὰρ Φυτὰ λαμβάνει τῆν Εtenim Plantæ attrahunt Nuη, Τροφὴν κατειργασμένην ἐκ τῆς Γῆς 
η, ταῖς Ρίζαις. Διὸ κὰμ Περίτθωμα Radicibus. Ideoque Excremenη, ἐ γίνετως τοῖς Φυτοῖς. Τῆ γὰρ Γῆ 
η, κὰμ τῆ ἐν ἀυτῆ Θερμότητι χρῆτας 
η, ωσπερ Κοιλία.

3. Sed paulo ante probat Plantas habere
3. ἀρχην Θερμέ φυσικήν | principium Caloris naturale
3. ex eo quod concoquunt Alimentum.

4. Itaque Plantis denegat primam Concotionem, quæ respondet ei, quæ in Animalium Ventriculo sit, non denegat eam quæ respondet ei quæ in Hepate sit. Atqui etiam hæc Excrementa relinquit.

#### III.

- 1. LONGÆ VITÆ Plantarum Causam male reddit Aristoteles I. de Longitud. & Brevit. Vitæ sin.
- "2. Primo enim Causa ejus esse non potest Aggeneratio, cum ea potius Breviorem reddere debeat Vitam. Brevior enim Vita redditur Frequenti Seminis profusione & Frequenti Partu.
  - " 3. Secundo neque quod Divisa vivunt & propagantur.
- , 4. Tertio principium potentia ubique esse dicit. Quæro quid est n'agxn' quid dovaues evsoa? Sunt Fumi.

#### Scholion.

1. Plantæ quare divulsæ disserve vivant, Arisioteles conatur explicare 1. de Anim. 2. t. 20. verbis ad ambiguis.

"2. Videtur autem hoc velle Animam actu esse in ea parte Planntæ, quæ Cordi analoga est & πιωμη dicitur, in reliquis autem partibus ita esse potestate, sicut in Semine potestate esse dicitur;

3. Scilicet quia ut ex Semine, ita ex Stolone, Surculo, Ramo potest fieri Planta, scilicet ubi satus fuerit &c. Et ita videtur Simplicius explicate hunc textum

plicius explicate hunc textum.

4. Ita nil dicit more suo, cum dicere aliquid insigne videatur, confugiens semper ad actum & potentiam, quasi latibulum ignorantiæ.

s. Hoc vero ipsum erat, quod mirabamur, qui siat, quod ex

partibus Plantæ avulfis possit fieri Planta.

6. Neque vero videtur inter Radicem & Stipitem peculiaris quædam pars esse sive Organica sive Similaris, quæ πυθμή dici & Cordi analogum quid haberi queat, sed ipsum Confinium Stipitis & Radicis dicitur πυθμή.

7. Aristoteles I. de Generat. Animal. 1. c, 20. paulo ante sinem:

1) ἐξ ἐνὸς Σπέρματος ἐν Σῶμα, οἶον | οκ uno Semine unum Corpus ut ex

1) πένὸς Πυροῦ εἰς Πυθμην ώσπερ ἐξ ἐνὸς | uno Tritici Grano unus Fundus, ut

1) Ωροῦ ἐν Ζῶον. | ex uno Ovo unum Animal.

Sed plures Caules ex uno Fundo.

8. Et alibi: μέπτα Στάχυες ἐν Πυθμένι ἐνὶ. | feptem Culmi ex uno Fundo.

T 3 9. Theo-

9. Theophrastus 1. de Causis Plantar. 3. c. 18. ante sinem: η την δ' Αμπελον άγων δει κύκλω περί Sed Vitem formare oportet circule η τον Πυθμένα.

10. Dioscorides l. t. c. 133. fin. de Spina Lonchitide:
η τάβδες έχεσα Ορυάς Τειπήχεις, ή Virgas babens Rectas Tricubiη τάμ μάζες πολλάς ἀπό τε Πυθη μένος.

πορογος ποιτας
η μένος.

"11. Homerus Odyst. v vers. 362. & Odyst. ψ vers. 204. & Nonnus in Joan. c. 1. com. 51. Πυθμένα pro Radice dicunt. Vide Eustathium "ad Homeri loca dicta; item ad Iliad. λ vers. 634. ubi ἀπό τε πύν

, deda id est putrefieri deducit.

12. In Fructibus est Vestigium illud, ubi affixi fuerunt Petiolo., Dioscorides Mespilo πυθμενα tribuit l. r. c. 171. Et Pollux Onomastic. l. 2. c. 4. section. 34. sin.

η τον Συκων Πυθμένω | Ficuum Pythmenem., ab Atticis Ουφαλον (Vmbilicum) nominari scribit.

13. Ceterum apud Theophrastum Histor. Plantar. I. 1. c. 4. med., quidam Medullam vocant Kapilar (Cor.)

#### ADDENDA

# PARTIS II. SECTION. III. FRAGM. I. CAPITI I.

Post Argumentum Assertionis 4. adde:

5 Ligustrum an Frutex dicendum sit, inquirit. Sectiunc.

Corrige deinde numeros affertionum sequentium.

In Argumento Assertionis 7. (quæ nunc sit 8.) augeatur numerus Sectiuncularum binario.

Assertioni 4. subjiciantur hæc:

#### V.

"1. Fruticibus adnumerat Ligustrum Dodonæus Pempt. 1. l. 1. c. 1. "& Pemptad. 6. l. 2. c. 13. Radices per obliquum spargi scribit.

2. Ego observavi raro aut nunquam Fruticare. Potest dari aliquid inter Arborem & Fruticem intermedium, scilicet Serpens Arbor.

Corrigantur deinde numeri Affertionum sequentium.

Assertionis 7. Sectiunculæ 1. post mutatum punctum in comma, hæc subjunge:

Cum

Cum tantum in illis, qua Caulem sero producunt, hujusmodi Folia appareant, ut Taraxacum, Cynoglossum, Verbascum.

3. Deinde non existimo Bina provenire in iis qua Sigillatim proferunt Folia, quod amplius observabitur.

Corrigatur deinde numerus Sectiunculæ 2. & post eam Sectiunce subjice:

4. Tertio forsan prima Bina Folia non Radicis semper, sed sæpe Caulis Folia sunt, quæ cum Caule explicato adscendunt & a fundo separantur.

Corrigantur iterum numerus Sectiunc. 3, & pro Deinde scribatur Denique.

## ADDENDA EJVSD. FRAGM. CAPITI II.

Argumento Assertionis 1. subjiciatur:

Scholion. Casalpini Ordinandi Plantas rationi quid obstet, amplius illustrat. Sectiunc. 8.

In Argumento Assertionis 3. augeatur Sectiuncularum numerus denario.

Assertioni 1. subjunge hæc:

#### SCHOLION.

1. Vbi Semina in Pulpa vel Tomento (Lantigine) hærent, non videtur discerni posse, utrum Corculum Seminis sit in inferiore sive interiore sive propiore, an superiore sive exteriore sive remotiore extremo Seminis.

2. In Pulpa latent Semina Ficus. Quomodo igitur Cæsalpinus Ficum in Ordinem suorum Generum potest redigere, cum Semen ejus quomodo situm sit, ignoret. Quomodo enim in Granis tantillis invenire potest Corculum?

3. Ego non dubito inesse Corculum. Forsan in exsecatis etiam Ficis si Grana macerentur Aqua, ita ut intumescant, apparebit Cor-

vulum adhibito Perspicillo.

4. In 1.3. c.3. de Moro agens aliquid habet ad Ficum pertinens.

5 Vtrum etiam Corculum Granorum Sambuci (quorum Terata in uno Acino) femper deorfum vergat, quæri potest.

6. Ceterum in Pulpa quoque latent Semina Berberis, Ribis, Oxyacantha (Songtorn, Spin aube.) In Oxyacantha Baccis facile differnitur Vmbilicus.

7. In Tomento Populi Nigræ Semina adeo parva, ut visum fere fugiant. Hic ergo Seminis situs respectu Floris & Corculi Seminis

respectu Petioli certus esse nequit.

8. Quemadmodum & in Syringa Cærulea ob exilitatem ægre discernitur Situs Floris respectu Fructus, ubi Perianthium Curtum & imam partem angustæ Fistulæ Floris & Rudimentum Fructus complectitur.

In Assertionis 3. Sestiuncula 1. inter voces Germinationis & NVMERO interjice: STERILITATE,

Ejusdem Assert. Sectiunculæ 18. subjunge:

"19. CYCLAMINI Species tres Dodonæi Pemptad. 3. l. t. c. 13. Spe-"cie remota conveniunt, differunt tamen Odore. Prima exiguo, secun-"da majore, tertia suavissimo Odore Flores profert.

20. LVPINI Caruleus Flos nullo: Luteus Grato Odore.

Corrigantur numeri Sectiuncularum sequentium; & Sectiunculæ quæ ibi est 28. subjice:

31. ARMENIACA MALA Nucleo funt Amaro & Dulci pro Solo &

Cultura.

32. CYPERVS alius Dulcem & Edulem habet Radicem; alius Amaricantem.

Corrigantur rursus numeri Sectiuncularum sequentium & Sectiun-

culæque ibi est 50. adjice:

55. STERILITAS non facit Differentiam Speciei. Nam ex ejusdem Plantæ Semine sæpe diversæ Plantæ enascuntur, non quidem Specie & Forma, sed Sexu;

"56. Vt scilicet una Florem Majusculum proferat & Sterilis sit, altera Semen, sed Minorem Florem, ut de SESAMOIDE SALMANTICEN-

SI MAGNO Clusius Rarior. Plantar. Histor. 1.3. c. 4.

257. Eodem quoque Semine Steriles & Fertiles ALNI oriuntur Cæ-

"falpin. de Plant. l. 2. c. 8. item TILIÆ l. 2. c. 10.

,58. Similia de CANNABE Jul. Cæs. Scaliger commentar. in l. 1. de Plantis p. 43. (2. D.) & p. 41. (2. A.) Et Bauhinus partim in Pinac. l. 8. ,sect. 5. partim in Tabernæmont. Rrauterb. part. 2. sect. 5. c. 11. Canna-, bis

, bis Mas Fructum fert, non Floret: Cannabis Femina nascitur e Semine

, Maris, Floret fed absque Fructu.

59. Specie mihi non videntur differre, sed Cultu. Nam quæ summittitur, ut ita loquar, in Ramos, Semen fert; qua ita colitur, ut absque Ramis gracili altitudine assurgat, Florem fert absque Semina & hæc ad Filificium commoda.

Corrigantur deinceps numeri Sectiuncularum sequentium & ulti-

ma hæc fiat:

"per Culturam. Caspar. Banhin. Pinac. 1, 7, sect. 2, fin. in 1. & 4.

## ADDENDA

### FRAGMENTO II.

Argumento Affertionis 1. adde:

Scholion Veterum in decribendis Plantis brevitatem exemplo ABIE-TIS, PICEÆ & PINI declarat. Sectionc.

In Argumento Assert. 2. numerum Sectiunc. muta, 10. scilicet in 14. In Argumento 3, itidem muta numerum 3, in 7. Assertioni 1. adjunge quæ sequuntur:

### SCHOLION.

411 151 161 14

" 1. ABIETIS descriptionem nusquam tradit Theophrastus. Flo-"rem Croceum ei tribuit Histor. Plantar. 1. 1. c. 21; & Conum 1.3. c. 10. circa med.

,2. Refinam Abietis & PITYOS Leviorem effe quam PEVCES; Refinam vero Peuces Graviorem & Picofiorem ( x15/wdeseeav) Scribit

1. 9. c. 2. Lib. de Causis Plantar, 2. c. 9. paulo post init.:

chieve marrell devent confide

, n wer (Exarn) xaiper Hahieritois | altera (Abies) gaudet Opa-" (Tonois') n de Heun rois Hoon- cis (Locis); at Peuce A-

pricis. - -

, 4. n wer Enarn Enper. n de Meumen Tyeov. mide eft.

Abies Sicca; verum Peuce Hu-

"5. Quod Lignum attinet, Abieti similiorem Pityn Arcadum quam "Peucem utramque tradit Histor. Plant. 1.3. c. 10.

6. Nusquam vero decidit, utrum velit ex sententia Arcadum,

an Macedonum & Idaorum loqui.

, 7. Alii enim loco proxime dicto Peucen Sativum five Vrbanam, , & Silvestrem; & hanc vel Idaam vel Maritimam ( zupahia) faciunt. Sparing O pathen and deministra.

.. 2. Ma-

"8. Macedones item Peucen Sativam & Silvestrem agnoscunt, "sed hanc Maris & Feminæ appellationibus distinguunt, ex quibus "Mas habet Συκην. Femina 'Αιγίθα; adjiciuntque "Ακαρποι (Sterilem.)

9. Vtrum autem Peuce Idaa & Maritima cum Macedoniun Mare & Femina conveniant, ex Theophrasto colligi nequit, neque ipse

Theophrastus scivisse videtur.

", 10. Arcades Pityn appellant tum Peucen Sativam, tum 'Axagnov.

", II. Quamque ante Theophrastus vocat ex Arcadum sententia "πίτυν ημερού, post νος απίτυν Κωνοφόρον; at quam primo ex sententia Arcadum vocat πίτυν Ακαρραού, eam dein simpliciter πίτυν νος at.

, 12. In Silvestri Peuce conveniunt Arcades cum Macedonibus &

"forte Idais. Hæc Picem prabet, & in Tedam vertitur.

13. Atqui nullam novimus Pityn Anagnov.

14. Dioscorides ita de Peuce & Pity loquitur, ut inde disci ne-, queat, utra earum Arborum sit PINVS vel PICEA.

"15. Vtrique tribuit Πιτυίδας, & Karss l. I. C. 88; Στροβίλες & Δαδίον

, (Tedam) c. 87.

3,16. E Siccis Refinis nervino ver Enarion prefert, quod Odorate

" 17. Sub init. huj. c. Liquidus tres tecenset netviri, nevnimi,

. & Agoina.

"18. Galenus Pityn & Peucen sumit more Dioscoridis; πιτυίδες, nait ille Simplic. Medic. Facult. 1. 8. in Πιτυίδ., sunt Fructus Pityos. Per abusum ita dicitur etiam Fructus Péuces.

,,19. Mox in Pity: Pityos Cortex valde adstringit; Peuces mode-,, ratius. At Coni (Kw's) tum Cortex tum Folia validius adstringunt,

"idque cum mordacitate molesta. Libr. 7. in Con.

"20. Fructum ejus Amarum & Acrem esse scribit, ut prius Aqua ,macerandus atque ita edulcandus st. Hunc dicit uliis vocari κό-

21. Videtur ignoraffe omnes hafce Arbores ferre Conos vel Strobilos, in quibus funt Nucelæ istæ. Vtinam harum Arborum Dif-

ferentiam nobis monstraffet!

, 22. Athenaus Πιτόινα Κάροα Fructus esse Arboris, qua a Theophrasto , Peuce appelletur scribit Deipnosophist. I. 2. (p. 57. B.edit. Commelin.)

"23. Plinius 1.15. C.10: Grandissimus (scil. Frustus) Pineis Nucibus (id est Pinis) Altissimeque suspensus, intus Exiles Nucleos (id est "Pineas Nuces) includens.

"i4. Et l. 16. e. 10. med.: Abies expetit a Navigiis. Situs in ex-

» plurimis vitæ operibus.

"25. Refina ei vitium, unde Fructus unus Piceæ &c. E diverso "Materies quæ Abieti pulcerrima, Piceæ ad Fissiles Scandulas, Cu-"pasque & pauca alia Secamenta.

, 26. Apud

26. Apud Poëtas est Pinea Teda. Teda vero fit & ex Pino sive

Pinastro, & ex Picea.

"27. Pityn Theophrasti ex eo probat esse Pinum Matthiolus in "Dioscorid. 1. r. c. 74. & Bauhinus ibi ad Matthiol. quod Pitys dicitur "alia Sativa, alia Silvestris.

"28. At Plinius 1. 15. c. 10. etiam Piceam Sativam ponit, cujus

"Nuces dicantur Sapinea.

"29. Clusius Rarior. Plantar. Hist. 1.1.c. 23. dubitat, Picea, (Roth, Bannen) utrum sit Pitys Theophrasti, an ejusdem Ελάτη Αρρην: & ,, accusat Codices Theophrasti corruptos.

"30. Dodonæus Pemptad. ult. I. ult. c. 13. Pityn esse Piceam pro-"bat ex Scribonii Largi Composition. 201; item ex Pitoycampis, qua "teste Bellonio in Picea tantum inveniantur, non Pino. Vix credo.

, 31. Solent enim Eraca Sativas Arbores potius appetere.

32. Quod fi Peucen & Pityn dicamus esse Vtramque Pinum, vel alteram Pinum, alteram Pinasstrum; & Έλάτην esse æquipollentem, Germanorum Tannen? Nam & Theophrassus Abictem Marem & "Feminam facit Histor. Plant. 1.3. c. 10. quod modo sectiunc. 29. significatum est.

33. Discrepant adhuc Auctores.

"34. Bauhinus vel Matthiolus in Dioscorid, I. I. c. 74. una cum "Tabernamontano Rranterb, I. 3. sect. 3. c. 2. (p. 662. & 663.) Strobilos

"Piceæ pingit in in Extremis Ramis, Abietis in Geniculis.

"35. At Clusius Rarior. Plantar. Histor. 1. 1. c. 23: Coni Abieti in "Extremis Ramis non Propendentes ut Picea, sed Erecti, Crassiores "& Latioribus Squamis & Obtusiore Cuspide quamin Picea. Hic etiam "Folia Abietis Superne Viridia, Aversa parte Cineracea cum Tabernamontano describit.

36. Casalpinus de Plantis I. 3. c. 53. quasi ex sua observatione, Abietem describens (Theophrasti enim & Plinii verba deinde separatim subjungit) eandem videtur Abietem agnoscere cum Clusio.

"37. At Lubelius Stirp. Observ. p. 633. Abieti appingit Conos e "Medio Ramorum etiam Inferiorum Propendentes; in Adversariis "vero cum Pena p. 450. Piceæ quidem Conos Grandiores, Ventrosse-"res-in Ramis Flexibus; Abieti autem in Summis Ramis Conos in cæ-"lum obversis Mucronibus adscribit.

,,38. Apud Dodonaum Pempt. ult. 1. ult. c. 13. & 16. eadem Figura

quæ apud Lobelium Piceæ & Abietis sed titulis permutatis.

## Assertionis 2. Sectiunculæ 1. hæc subjungantur:

J VI VI II

2. Lacryma Jobi, Gallis Maria, Hispanis Moysis, aliis Christi. Vide Clus. Rarior. Plantar. Histor. l. 6. c. 37. & Pen. & Lobel. Stirp. Adversar. p. 16. Cur itaque non potius Lacrymaria?

V 2

3. Roßhuf est melius quam Hustattichvel Brandlattich. Nam hæc Appellatio parit Specierum Confusionem.

Corrigantur numeri Sectiuncularum sequentium, & eam quæ ibi

9. est excipiat hæc:

"12. POPVLVS LIBYCA Plinii l. 16. c. 23. in Gallia, Italia & Germania sponte crescit.

14. Inepta etiam est appellatio Indianischer Pfeffer, id est Capsi-

cum, quasi Piper verum classe non indigeat.

Assertionis 3. Sectiunculæ ultimæ hæc subjice:

4. FRVMENTVM Typhinum, quod cum Semine Phalaridis (Carnariengras) ex Canariis advehitur, TVRCICVM vulgo appellatur, & "Cordo Histor. Stirp. Triticum Bactrianum dicitur. Maizium potius appellandum, uti vocant Americani.

5. Nam ex America primum translatum est in Europam, non ex

Asia vel Turcia.

- "6. Neque est Frumentum illud Bastrianum, quod Grana Oliva "magnitudine fert, cujus Theophrastus Histor. Plantar, l. 8. c. 4. sin. & Plinius l. 18. c. 7. procul a fin. (in quo pro Spicas legendum Olivas) "mentionem faciunt.
- "7. Nec est Boouco . Frumentum Tritico minus, quod ne extra "Bactrianum & Babylonium agrum, antequam coctum sit exportent, mes"sores jurejurando adiguntur, uti Strabo I. 15. (p. 476. edit. Vignon. vers.
  41.) testatur.

# CAPITI I.

In Argumento post Assertionis 6. Argumentum adde:
7 quæ ARISTOLOCHIÆ (quod ad Radices.)
Sequens numerus 7. mutetur in 8.
Assertionem 6. excipiar hæc:

## VII. five AR will and loan car

ARISTOLOCHIA LONGA, ROTVNDA, & CLEMATITIS different Specie quod ad Radices. PISTOLOCHIA etiam quod ad reliqua convenit, Radices Fibrofas habet.

Corrigatur numerus Assertionis sequentis.

ANNO-

## ANNOTATIONES GENERALES,

quæ PRÆFATIONIS loco funt,

ad

# JOACHIMI JVNGII DOXOSCOPIAS PHYSICAS

MINORES,

Auctore

## MARTINO FOGELIO Hamb.

Ĭ.

### DE EDENDI HVIVS OPERIS CAVSIS.

Ĭ.

uanquam Physici Operis aliquid edere AVCTORI bis, terve ANIMVS fuit, & de proferenda inprimis Isagoge quadam Physica, una cum Disputationum duarum de Principiis Corporum Naturalium Thesibus, jam olim quidem, cum Examini publico in Gymnasio subjicerentur, impressis, sed recensitis post, & non parum auctis, contentius ex eo tempore, cum ex lapsu æger factus esset, cogitavit: factum tamen est, nescio, quo Fato, ut modo nova cura ipsum in diversissimas Cogitationes averterint, modo oblatas Conditiones Bibliopola repudiaverit, modo Typorum, præsertim Græcorum, Forma displicuerit, sepe accuratius quædam proponendi Consilium ista, ut reliqua Opera, distulerit, denique MORTE INTERCEPTVS Spem omnem ab ipsius manu aliquid perfecte ordinati exspectandi præciderit.

2. NE igitur tanti Viri Meditata vel BLATTIS & Tineis erodenda relinaquerentur, vel in manus cujusdam Jungianarum rerum IMPERITI aliquando inciderent, EGO quoque FIDEM meam, quam edita Historia Vitæ & Mortis Auctoris obstrinxeram, quodam modo liberarem, statim post mortem Auctoris Testamenti ipsius Curatoribus Consilium meum exposui de edendo in lucem Physico aliquo Opere, meumque studium, quantum adhibere valerem, in eo

curando lubens promisio

3. Scilicet, cum Logicorum Gymnasmatum de Demonstratione, Zarabellæ oppositorum, Recensionem meæ curæ commendasset Auctor, ego vero Logicam in Physica, meis studiis convenientius, exercere mallem, Physici Operis Recensionem

Logici Recensioni pramittere volui.

4. Accessit, quod in Logicis ex parte suam Sententiam jam expresserit, quam quilibet, qui cupit, in Hamburgensi Logica legere poterit; in Physicis vero præter Exercitationes Protophysicas nihil de ipsius Scriptis impressum exstet.

5. Vt nunc nihîl dicam DE ARISTOTELE REFORMANDO præcipue EX PHYSICA. Quod ipfe in Epistola ad Andream Svarzium 1641. 11. Sept. perscripta, monuit, & in alia ad Seldenerum eodem anno 22. Sept. explicatius his verbis repetiit:

a Physica ordiendam esse Philosophia Emendationem semper existimavi, & adhuc in ea sum Sententia. Logica controversia nisi caute tra-

ctentur, in Psychologiam, & Metaphysicam elabuntur.

6. Cum igitur Confilium meum Curatoribus Testamenti probassem, confitueram Disputationum Physicarum, in Gymnasio olim habitarum, Theses, Exercitationibus Physicis hactenus non editis junctas, prælo committere, PRÆ-LECTIONES item PHYSICAS, quæ præsentis Operis maxima Pars sunt, Appendicis loco subjungere.

7. Hæc enim ex Physicis Scriptis sunt ab Auctore, ut edi possent, Conti-

nuo Stylo connexa.

8. Sed PROPTER DEFINITIONES Prælectionibus adhærentes, quas ab Affertionibus earundem Prælectionum divellere nolebam, videbantur Prælectiones Appendicis Titulum non commode mereri.

9. Quare, mutata ista Sententia, Prælectiones præmittere Exercitationibus e Lectoris commodo magis futurum putavi, quippe, in quibus Definitiones

quædam continentur ad Exercitationes intelligendas necessariæ.

10. Præterea fore, ut BREVIVS primum legere, quæ prolixius in Exercitationibus tractata funt, Intellectui etiam gratius multo accidat, non dubito.

II. Nec contra Auctoris mentem præmifero Doxofcopicas Systematicis ejus Scriptis, cum ipfe hoc Ordine se usurum promittat in Scheda, quæ adhæst Prælectionum Autographo:

Aristoteles nunquam proponit suam Sententiam, antequam refutarit Contrarias. Ego utar eadem Methodo. Propositurus sum meam Sententiam, ubi Averroem & Zabarellam destruxero.

De Causis superaddita Sectionis de Plantis suo loco dicam.

# II. DE AVCTORE HVIVS OPERIS.

I.

Cum non parum Vtilitatis ex Studiis, Vitaque Auctoris recte cognitis in Lectorem redundare possit, operæ pretium sacturum arbitror Lectorem, si de Incomparabili Auctoris tum Judicio, tum Ingenio, tum Eruditione judicare ante didicerit ex Historia Vita & Mortis ipsius, quæ secundum prodiit Argentorati, auctior quidem, quam quæ Hamburgi impressa est, sed præcipitata tamen per errorem ejus Editione, interea dum plura submittenda colligebam.

2. Hanc

2. Hanc vel Integram, vel quod ad Particulas, auctam hic exhibere Temporis præfentis ratio non patitur.

3. Exhibebo eam alias, si Deus voluerit, justa Magnitudinis Volumine

comprehensam.

4. Nunc sufficiat ex Schedis meis JVDICIA duorum Clarissimorum Vi-

rorum huc inprimis pertinentia appofuisse.

5. Quorum alter est JO. PELLIVS, Anglus, Professor Matheseos in Amstelodamensi Gymnasio primum, deinde Bredano, quem Gerardus Joannes Vossius, (sive potius Fossius,) libro de Scientiis Mathematicis c. 10. S. 2. a Varia Eruditione, & Summo Ingenii Acumine non vulgariter commendat.

6. Alter est Joannes Amos COMENIVS, Conatibus Didacticis celeber-

rimus.

7. Ille (*Pellius*) in Epistola ad *Joannem Adolfum Tassium*, Mathematicum olim Hamburgensem, Virum Summum, 1645. Amstelodami pridie Cal. Maji scripta:

"Cordatus Juvenis Bernhardus Varenius, quanti te, (Tassi,) atque "OMNIVM MORTALIVM AOFIKOTATON, Collegam illum tuum, "D. JVNGIVM, facere viderer, aliquando fortasse in suis ad te describere conabitur. Quod si ullis verbis assequi poterit, Incomparabili illum, Eloquentia praditum arbitrabor.

8. Et paulo post:

"Ego rigidissimam Censuram etiam Accuratissimi vestri Apodi-"Etici expeto. Quam si impetravero, summo me beneficio affectum ar-"bitrabor.

9. In Epistola ad Jungium 1645. Amstelodami Id. Maj. scripta:

"Etst tuam, Vir Eximie, Sententiam de nostra Refutatiuncula "valde scire aveo, quippe qui te Incomparabilem demonstrative docendi, "S dedocendi Artificem esse probe sciam; tamen, quum piaculum puta-, rem, Heroicos tuos labores vel tantillum interpellare, — — decrevi a "scribendo abstinere.

10. In alia Epistola ad *Jungium* 1645. Amstelodami 6. Calend. Septembr.

"Postquam vero tam Incomparabilem Apodeicten viderem ali"quantulum avlapseias ibi (in Demonstratione mea) desiderare; ego"met continuo mecum; Oportet aliquid subesse, quod meos oculos sugerit,
"Non temere est, quod Jungius aliquid in Pellii Apodixi desiderat, quo"rum ille supra omnes mortales optime potest, hic ardentissime cupit omnia
"plenissime & avlagnos demonstrare.

M. Hic

- 11. Hic (Comenius) in Panfophiæ Prodromo, (Præludiorum titulo Oxon. 1637. edito) p. 45. & 46. edit. Londin. 1639; five Didacticor. Oper. Part. 1. Panfophici libri delineation. fection. 47. col. 426.
- "12. Deus, quia Æterna, & Immutabilis Veritatis Basis est, non pot"est non eo rem dirigere, ut Veritati indies planius detegenda, ac robo"randa ipsi Errores etiam servire tandem babeant necesse. Et IVNGIVS
  "Saxo Logica nunc Arti ad eam Perfectionem deducenda insudans, ut
  "Propositionum Veritas adstrui, Sophismatum Deceptiones destrui que"ant ea Certitudine, qua Euclideum quodvis Problema Apodeictice de"ducitur.

#### The section of the Relation of M. The West Committee of the Walter of the State of

### DE INSCRIPTIONE HVJVS OPERIS.

Quoniam Opiniones passim receptas hic considerari, Lector Benevole, reperies, DOXOSCOPIAS Opus volui inscribere.

2. Auctor ipse Opinatorum meminit Partis 2. section. 1. c. 12. ass. 12.

3. Opinionum Portenta accumulari notat ejusd. fection. c. 12. affert. 13. fectiunc. 2. fin.

4. Et ad similis Schedæ, quæ ejusd. Capitis Affertionem 26. & partem Af-

sertionis 27. complectitur, extremum hæc reperi;

5. Opiniones Somniis similiores, quam Scientiæ, ex Naturæ Observatione elicitas, ejusd. C. Assertio 12. affert, Thesis contra Burgersdicii Disputationem de Putredine.

6. Placuit hic Titulus, Specialior, quam Prælectionum Physicarum, quem Apographum Poltsianum, (de quo vide ad Part. 1. Annot. 1. sectiunc. 6.) præ-

fixum habet.

7. Ceterum Doxoscopiarum Titulus Auctori non est INFREQVENS, qui Doxoscopica opponit Systematicis in Logicæ Physicæ Fasciculo; sub Titulo

Hypotheleos.

8. Adfunt enim inter Manuscripta Doxoscopia Zarabella Physica Generalis, & Edini sive Specialis, item Doxoscopia Zarabella ad l. 8. Physic. Mercenarii Doxoscopia, Fernelii, & Sennerti Doxoscopia, Galeni Doxoscopia, Doxoscopia Sporadica &c. Sed vel maxime huc pertinet Scheda anni 1624. mox producenda.

9. Brauno, Anglo, (Auctor is effe dicitur Religionis Medici,) Pseudodoxia Epidemica Inscriptionem, libro suo Anglico, non absimilis argumenti, dare

placuit.

10. Non tamen omnes hujus Operis Propositiones Doxoscopica funt, sed

pleræque.

II. Plurima enim in Isagoge Systematica aptius legerentur. Verbi gratia ex Definitionibus de Motu Locali quadam, ex Section. 2. Assentionibus plurima.

12. Quædam vel integræ, vel ex parte & hoc in Opere legi, & in Ifagoge Sy-

Rematica repeti debent, Instituto Doxoscopico inservientes.

Procemii 3. 4.5. 8. 9. 10. 11. cap. 12. aff. 17. 18. 19. 20. & cap. 13. aff. 2. & 5. & cap. 22. affert. 9. &c.

14. Item ex Sectione 2. plurimæ. Item ex Sectione 3. Fragm. 3. Port. 1. C. 5.

aff. 4. & aliæ ad Historiam Plantarum referri debent.

15. Ex parte ad Isagogen Systematicam pertinet, verbi gratia, ex Assertionibus Sectionis 1. Procemii 7. sections 5. 617.13. &c. &c. 9. ass. 11. sections 5. &c.

16. Crediderim, Auctorem interdum, amænitate intertexta, fastidium Do-

xoscopicum Lectori minuere voluisse.

Schedis, quas ego in hoc Opus transtuli, Propositiones Systematicas parcius adnjecerim, & Plinii Moniti (quod habet Epist. 1.5. ep. 6. circa sin.) memor, ad Tintulum identidem respexerim.

18. Interim, que Confusa adhuc videri possint, distinguet olim, si Fautores Opus hoc invenerit, Index, Doxoscopica a Systematicis accuratius separatu-

rus, cum reliqua etiam Auctoris Opera lucem adspexerint.

19. Porro autem PHYSICÆ hæ Doxofcopiæ dicuntur, ab Objecto fuo. Nam & Metaphysicæ, & Logicæ adfunt Doxofcopiæ, quæ has aliquando, si Deus volue-

rit, fequi poterunt.

20. Denique cum Opiniones Physica in hac Opere breviter; in Exercitationibus vero, partim in Gymnasio ad disputandum propositis, & dudum impressis, partim non propositis, certe non impressis, prolixius ab Auctore consideratæ fuerint; Doxoscopias MINORES vocavi cum Scheda, anni 1624. Septembris, Oct. & Nov. hæc exhibente sub Titulo, Doxoscopica:

Vide Fernelium de Forma Pæoniæ.

21. Quæ maxime spectant ad Antidoxa Minora, sive Antidoxorum Theses Prodromas, sive potius ad Introductionem Praservativam, sive Doxoscopiam.

MONITA

ASSERT.

DEFINIT.

MINGE

EXPOSITIONES DOGMATVM.

22. Adeft etiam Titulus

ANTIDOXA PHYSICA, hoc eff, DIEXODORVM PERIPATE-TICARVM IN APODIXES LIQVIDAS TRANSFORMATARVM EXAMEN.

23. In Fasciculo Protonoctico sub Titulo Isagoges Doxoscopicæ, in Scheda anni 1624. Octobr.:

X

Ideo hæc Antidoxa Minora edo, ut aliquem eliciam confidentem Peripateticum, qui mihi Zabarellæ Dogmata compleat, ut eo certius Procheremata conficere queam.

24. Scilicet, cum grande illud Protonoetici, five Ereunetici Collegii Institutum promovere agitaret, de quo in Historia Auctoris pluribus, Physicorum etiam Dogmatum receptorum, tum Falsitates, tum Absurditates breviter, & m fallor, Dialogi modo proponere, in animo habuit.

25. Superfunt enim adhuc Fragmenta istius Dialogi, in quo AS Auditorem,

& P. Praceptorem, colloquentes, fignificat.

26. Et præterea exstat Titulus: Dialogus 3. de Qualitatibus Primis.

27. Quamvis vero quadam Assertiones hic compareant, qua proprer Prolixitatem suam ad Majores Doxoscopias referenda esse videri possimit, quales sunt Section. 1. Proæm. 7. & Section. 3. Fragm. 4. c. 3. ass. 2. &c.; & esusd. Fragm. c. 4. 1.; tamen ha Exemplis suis tantum ita extenduntur, non, ut in Majoribus Doxoscopiis sapissime sit, Excursionibus, aut Diexodorum plurixnaram Solutionibus se diffundunt.

28. Quod si quibusdam forte, propter omissas interdum Catisas, & Declarationes Vberiores, Minima potius, quam Minores appellandze videantur, hi

Thefes plurimas accessisse meninerint.

In Thesibus enim quædam Obscura ponenda sunt, ut quærant ii,

qui opponere non didicerunt, ex Auctoris Scheda.

29. Alterum Titulum ISAGOGES PHYSICÆ DOXOSCOPICÆ, (Platonis enim more geminum præfixi, ut Lector eligat, quem cupit,) inveni in Scheda Auctoris, & in ea, que hic fectiunc. 21. adducta est, asiis verbis continetur.

30. In Fasciculo Protonoetico, modo dicto, sub Titulo Paraneseos, mentio

off Operis Antifagogici:

Proximo Augusto, aut Septembri, habebit non Sciagraphiam modo, sed & Specimen, sive Partem totius Operis Antisagogici in Protophys.

31. Quod superest, omnium Opinionum Physicarum Examen hic ne requise-

ris. Recte enim Aristoteles Ethic. 1. c. 2. Zvingeri:

η άπάσας μὲν ἐν ἐξετάζειν τὰς Δόξας, tomnes quidem exquirère Opiniones, η ματαιότερον εσως εςίν. Ίκανον δε τὰς vanius forse fuerit. Satius vera mannahisa inimoλαζάσας, ε δοκάσας έχειν χίπε infignes, aut qua videntur niti ntina λόγον.

Hæc ex Annotationibus generalibus ad scopum præsentem sufficiant.

ANNOT.

# SECULDADA SANOTA LACE SECTION OF THE SECTION OF THE

## JOACHIMI JUNGII DOXOSCOPIAS PHYSICAS MINORES

# DE PLANTIS.

MARTINO FOGELIO Hamb.

DE CAVSIS, OB OVAS PRIORIBVS SVPERADDITA FVERIT HÆC SECTIO.

uamvis, impressa fere Partis secundæ Sectione secunda, mecum constitutissem, paucas tantum Phytoscopicas ASSERTIONES jam IM-PRESSAS, & in Disputatione de Axiomatibus Physicis, in Gymnasio no so 1652 proposita, COROLLARIORVM vicem functas, Appendicis loco Parti secundæ annectere, quod, in Auctoris SCHEDIS de Plantis Doxoscopici argumenti parum aut nihil repertum iri sperabam;

2. Accidit tamen, postquam Experientissimo Bunkio, Amico optimo, in ipsis curis & conatibus proferendi in publicum, quicquid Auctor de Plantis conscripsit, vita præclare quidem, sed mature nimis, ponenda suit, ut, capessita a me parte istarum curarum, cum excuterem hasce Schedas, plurima offenderim, quæ a Prælectionum Physicarum opere haud aliena sutura videbantur, unde integra fere hæc Sectio nata est.

3. Cum enim proxime PRÆCEDENS SECTIO de Speciebus Similarium Opiniones examinaverit, Argumento Operis convenienter junguntur cum Sectione priore, quæ in hac tertia de Plantarum, Dissimilarium Corporum,

Speciebus digesta reperiuntur.

4. Quibus pauca quædam de Plantis alterius Argumenti accesserunt.

5. Neque vero existimo, hanc Sectionem prioribus superadditam prater AVCTORIS CONSILIVM, quod celare haud possum tum Corollaria, que modo dicebam, tum Inscriptiones ha in diversis Schedis occurrentes: Disputationes Botanica, Disputationes Phytoscopica, Theses Botanica, 1648. Maji mensis, (vide ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 18. Ass. 2. annotationem,) Corollaria Phytoscopica, (v. ad Fragm. 1. C. 1. Ass. 1. annotationem,) Disp. de Speciebus Plantarum, (v. ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 9. Ass. 1. annotationem,) Correctiones Specierum, & similes.

# ANNOTATIONES STEEDATE.

Præter Auctoris SCHEDAS AVTOGRAPHAS Inerdinatas, APOGRA-PHÆ hic descriptæ sunt, quas item Inconditas majori ex parte reperi, Intertæ, Velandíæ, & Bunkianæ. Singulæ non magno arctantur numero.

2: INCERT Æ descriptæ sunt ex Schedis, ut conjicio, Vetustissimis, nec amplius comparentibus, ab eadem indocta munu, cujus Collecta quædam Apo-

grapha Physica ex Quercetano, aliisque servamus.

- 3. VELANDIÆ circa annum forte 1632. a Voldeko Velando, Ferdensi Vestalo, descriptæ sunt, inter omnes Jungii Discipulos pracipui nominis, qui si superfuisset, (quod ipse Jungius sateri cogebatur.) in Mathematicis facile tanta Doctoris sui Doctor sucurus suisset. Sed lento ac pertinaci Phthiseos malo paulatim consumtus, cum ab anno 1633. in aliquot Academiis non sine summa laude vixisset, anno ætatis 28. nondum exacto, Hamburgi 1641. diem supremum obiir.
- 4. Expresse autem sunt, (trinæ quandoque eodem exemplo,) vel ex Schedis Patavii ab Auctore collectis, (ut sidem faciunt Autographæ superstites, de Nasturtio Indico non recte Nasturtio dicto; de Ricini Flore non Muscoso; de Jacea Flore non Aphyllo; & de Arboribus Semine carere creditis:) vel ex alis non multo Junioribus.

5. Auctor unam & alteram relegendam, & emendandam duxit. ol ich

6. BVNKIANARVM, que plurimam hujus Sectionis partem a Doctore Bunkio ruditer, &, mortuo jam Auctore, digestam continent, mentionem facere opus non haberem, si Scheda, unde Fragmenti 1. C.1 Assertio 9. & C. 2. Assertio 1. Sectiuncula 2. pars, & 3. pars transscriptæ sunt, in manus meas, quamvis sedulo quæsita, venire potuisset.

7. De cetero, si Autographas Schedas Papyro sua affigere maluisset Bunkius quam describere, valde mihi levasset laborem, quem recensitæ & cuni Au-

tographis collatie omnino duplicarunt.

8. Ex IMPRESSIS olim Disputationibus COROLLARIA adjeci PHY-TOSCOPICA, quarum Annotationis 1. sectiuncula 1. & ς. jam meminit.

9. In fui TABERNÆMONTANI MARGINE quæ de hoc argumento

adscripserat, huc quoque transtuli. Paucissima tamen sunt.

10. Paucissima item inserui ex MEIS ANNOTATIS in Collegio Phyto-

scopico 1651. privatim habito.

us. Denique cum Bunkius noster VELANDI AVTOGRAPHAS Schedas cum ipsius Apographis jam miscuisset, neque reperirem Apographarum omnium Autographas, ut de quibusdam dubitare necesse haberem, utrum Velandus earum Auctor esset, an Jungius; Velandi forte Autographas aliquas operi huic additas crediderim.

12. Quoniam enim Velandus Medicinæ operam dabat, annotaverat quæ-

dam, cum in Academia Rostochiensi & Lugdunienst vive et, de Plantis, que post

tior; tum non infrequentes Velandi Quaftiones five Addubitata, tum Propofitum Notandi, tum Excerpti Auctores, discriminarunt fere ipsas ab Apographis, ubi vel Rostochii vel Lugduni nulla erat facta mentio.

14. Quibus adde quæ Auctori adversantia in iisdem Autographis le-

guntur.

14. Het.

15. Verbi gratia illa, cui Titulus: SPINÆ PI. ANTAR VM, Fragm. 3. Port. 3. C. r. Affertioni 5. repugnat:

Ononis Spinosa cum Non spinosa videtur ejusdem Speciei.

16. Ejusd. Portionis C. 18. Affertioni 2. adversantur hæc:

, Tilias Marem & Feminam Speciei differre non puto. Lautem Tiha sit Infrugifera, per Accidens sieri, tumque Marem dici. 17. Sed corrigit deinde Sententiam?

"Verum Tilias Marem & Feminam omnimodo inter se differre

Plinius ait 1. 16. C. 14.

18. Quæcunque autem ex Velandi Autographis Operi huic accesserunt, in Exemplis fere Affertionum quærenda funt, cui usui, ni fallor, nec ab Auctore, fi digeffisset, fuissent subtracta.

19. Atque hæc sint dicta de iis, quæ Sectionem hanc efficiunt. Singula

fuo loco in sequentibus Annotationibus expressius erunt indicanda.

## Vide Perform C. c. A Herr. in Course a. S. p. & Albert n. From C. c.

## DE DISTINCTIONE HVJVS SECTIONIS.

Cectionem integram partitus fum in FRAGMENTA QVINQVE, quomodo appellare volui, partim, quia Schedæ non erant Continuæ, partim ne Fragmenti tertii Subpartitiones Inconcinniores effe viderentur, fi Fragmenti vocabulo substituissem vocem Portionis, qua jam ante Partis 1. Sectionem 2. partitus fueram. Commodius enim Vocabulum, quam est Portionis, vix

2. Involucrorum autem Inscriptiones reperi septem:

3. 1) SPECIES PLANTARVM VT CONSTITUENDÆ.

4. 2) DIFFERENTIÆ A SPINIS, VILLIS. Item Indifferens ad / Spinas

5. 3) FLORVM DIFFERENTIÆ CONFVSE COGNITÆ. Flos STAMINEVS LANVGINEVS, MVSCOSL

6. 4) DE GENERATIONIBVS, VBI SEMEN NON ADEVISSE PV-TATVR.

7. 5) GENERATIONES PLANTARVM EX HETEROGENEIS.

- dom. rem in Level of Roll will of Le Arthana Carena, mis
  - 9. 7) ARISTOTELIS DE PLANTIS DOGMATA! LE RUE ME TON

10. Quibus adjicere poteris Schedarum Inferiptiones [uo loco deinceps memorandas.

ir. Cum vero Sectio hæc potissimum doceat, quantum in Plantis digerendis hactenus peccaverint Phytoscopi, pramisi Generalia DE RLANTAE SPECIE-BVS CONSTITUENDIS, que Fragmentum 1. exhibet, Specialioribus, ut Lex Didactica quoad ejus fieri potest, nos progredi jubet.

12. Et quoniam usus nominum apud Philosophos tantum secundarius est, Fragmentum DE PLANTARVM NOMINIBVS secundum merito locum

tenuerit.

13. Dehine illustribus Exemplis commodum videbatur ob oculos ponere, quam, vel Plantas conferre cum Plantis, cum quibus debebant, neglexerint, vel feparatim spectatarum Partes tum falso negarint, tum confuse congnuerint.

14. Dum Plantas cum Plantis, cum quibus debebant, conferre negligunt, vel ad Eandem Specierum Classem Diversas Species referre, vel Easdem Nova

Classe excogitata a se divellere consueverunt.

15. Itaque Fragmenti II. duas feci Portiones. Ac I. quidem DE PLAN-TIS HOMONYMIS, II. de RELIQVIS PERPERAM HETERONYMIS inscribere volui.

16. Reliquis, inquam, quia jam ante in Portione t. quarundam ad 2. Portionem quoque referendarum in transcurfu quafi facta erat mentio, quas bis 

17. Vide Portion. 1. C. 1. Affert. 1. fectiunc. 2. & 3. & Affert. 7. Item C. 3. Affert. 1. fectiunc. 2; Affert. 3. fectiunc. 1. Iterum C. 4. Affert. 1. fectiunc. 1. &c.

18. Titulus Generalis hujus Fragmenti exstat in ora Schedæ, unde Portionis 1. C. 16. Affert. 3. fectiunculæ 4. & 5. expressæ sunt: SPECIEI VNITAS. CMOEIAIA NEGLECTA, quo nullum inveni alium aptiorem continendo utramque Portionem.

19. Portionis I. Titulum, commodum præistis: Falfæ Species; Corrigenda in Speciebus; Specie Falfa Convenientia &c. suppeditarunt tum Titulus Schedæ de Tribulis: HOMONYMIA PLANTARVM, tum Coroll. Phytofcop. 7. 8.9. quæ vide ad C. 8. Affert. 1. C. 10. Affert. ult. it. C. 3. Aff. 3. fectiunc. 3. 4. 5.

20. Quem confirmavit Scheda de Malo Persica, cui Titulus: SPECIES CORRIGENDÆ, five NOMINA POTIVS, cum ante ibidem Specierum Correctionem definivisser his yerbis: Specierum Correctio intelligitur, cum ad Genera debita referuntur,

21. Portionis II. Titulus ex C.3. Affert. 2. sectiuncula 2. acceptus est.

22. Vtriusque vero Portionis Capita Alphabeti Ordine digeffi, quo nullas.

bac quidem Specierum Confusione, poterat magis idoneus excogitari.

23. Nomina autem, quibus vel Diverfissimæ Plantæ conveniunt, vel Eædem Species discrepant, potissimum ad Casparis Baubini Pinacis Titulos accommodavi.

24. Hoc

24. Hoc infigni enim opere in aptiores quoque quam hactenus factæ fuerant, Classes, non raro tamen hallucinatus, Plantas voluit digerere.

25. Et hæc de Fragmenti III. Dictinctione dicenda habui.

26. Accedo ad Fragmentum IV. PARTES QVARVNDAM PLANTA-RVM, tum FALSO NEGATAS, tum CONFVSE COGNITAS, confideratione fua complectens, legendum omnino post Fragmentum III. quod Integras Plantas, certe plerarumque maxime Conspicuas Partes junctim spectatas propositit.

27. Ordior a FOLIO, quod ab Auctore potissimum respici Fragmenti L. C. L.

Affert, 1. fectiuncula 2, docuit.

28. Folium CAVLIS, bunc FLOS, & Florem denique SEMEN, ut Natura fere, ita hic Doctrina Ordine excipit.

29. Etiam in Isagoge Phytoscopica olim edenda servato.

30. RADICEM ultimo loco locavi, tanquam Partem semper abditam.

Vide iterum Fragm. t. C. 2. Affert. t. fectiunc. 3.

31. Fragmentum denique DE VITA PLANTARVM a me inscriptum, V. & postremum locum abstrusa sua doctrina merito sortitum est.

#### IV.

### DE FRAGM. I. PROQEM.

. . . .

Dars prior Scheda debetur:

Nisi in c. G. & S. c. r. redig. non pro l. h. v. i. inf. erit studium. Botanicum. Int. a. i. abhorret.

- 2. Reliqua Corollariis Phytoscopicis, initio harum Annotationum dictis 1. scilicet 2. & 3.
- 3. 1) Difficile adm. r. Phytoscopiæstud. v. a. d. P. a.

2. 4. 2) Ejus discrep. &c. while you allow the property and the second

fugit &c. Hinc infinitum quasi red hoc stud. Int. a hum infin-

## DE FRAGM. I. CAP. L

I.

A ffertio 1. ex duabus Schedis concinnata eff. 21 0 0 11 0 11

Scaligerum.

3. Sectiuncula 2. ex Scheda, que hec continebat:

n. S. & C. a. & d.

as ilocarligationica spere in cofferes q multicaulem present at each coincide in the contract of the contract Herbam ab imo Rambfam & Perennis. .... Or 1 Herbam Vnicaulem es Tall V. r. mangard in country

4. Ita Frutex erit Athor Multicaulis, & Arbor erit Planta Vnic. Per.

5. His adhærebant quædam contra Theophrastum notata, quæalias rectius producentur.

6. Mutanda autem quædam hic fuerunt, si verba per festinantem Cala-

mum Contradictione implicita Operi inferenda non funt.

7. Ergo pro illis: Frutex erit Arbor Multic., fubstituo: Fr. e. Planta Multic., Perennis, & pro Herba reposui generalius vocabulum Planta, Ilagoges Phytoscopica capitis 10. paragrapho ultimo congruenter.

3. Ibi enim Auctor ita:

Planta Perennis solo Stipite Folia gerens, fi singulari sit Stipide, Arbor; fi Multicaulis, five Multiflipes fir, Frutex dicitur.

9. Affertio 2. est ex Scheda, cui Titulus CREMIVM, ejusdem, credo, propter Scripturæ fimilitudinem cum illis, unde est Assertio I. atatis.

10. Principium Affertionis legitur ita locarum:

- " CREMIVM Scaliger. Exerc. 139. cum Arbore convenire ait p. , 465. quod Trunco est Singulare, sive Vnicaule. Item p. 464. Stipite "Singularem Naturam Cremio tribuit. Cremia ait esse ALTHÆAM "p. 464. AGRIMONIAM p. 465. Vtraque autem est Multic.
  - Seinar Corolleris Ply. Gopiets, isitio borne Anna: abnin

Tab. expref. &c.

12. Ad marginem finistrum ab imo versus summum leguntur ista: ab imo Caule Ramosa, non tamen Fruticosa videtur dici posse. Que forte de Althea capienda funt, de qua jant idem dixit sectiuneule 4. Parenthesi.

13. Affertio III. in Scheda paulo aliter formatur.

14. Vtr. pl. C. ex eod. O. R., an ex vic. tantum.

15. Si ex v., tum F. ab A. non d., n. f. m. & m. N. & A. e. R. S. e.

16. Hæc ergo ulterius observanda sunt.

17. Assertio IV. ex quaruor diversa, ni fallor etatis Schedis compsita est.

18. Prime Tirulus: ARBOR, FRVTEX. Cui subjiciuntur ista:

Magna solum ex parte fruticat LENTISC. multis ab una R. Stol. (ergo Πολύκαυλ 6) & Virg. &c. Clus, item Lob. Adv. p. 412. Fallitur E f. &c. 8. 5. & C. a. & d.

NB. Sto-

100 31900

19. (NB. Stolones recisi promovent Arboream Magnitudinem ejus Caudicis, qui relinquitur. Sed Cymæ, h. e. Cacumina Caudicum majorum & adultiorum, resectæ promovent Multitudinem Stolonum, & inhibent ab Altitudine Arborea.

20. Ad marginem dextrum aliud NB. e regione hujus Theorematis fignabatur, in quo item recentius (cripta sectiuncula 1. & 2. (excepta tamen 12 Pa-At 3. eodem calamo in fine ejusdem paginæ, voce renthesi,) reperiuntur. Plantæ tantum a me inferta.

, 21. Secunda ex Incertarum aliqua est. Ó စိန် Μύρρ. u. a. e. ibid. Ergo &c. Ad marginem erat Titulus: GENERA IV. SVMMA PLANTARVM.

22. Exstat autem illud de Myrto in Theophrasti I, expresso.

23. Tertia ex Scheda, quæ inscribitur: SPECIES PLANTARVM.

24. Ilex Coc. c. c. in F. o.

"25. RVTA Cult. elev. ad A.d., sifc. R. &c. & Fl. c. defringantur, uti Tabernæmontanus tradit.

26. Quarta inscribitur: contra SPECIES PLANTARVM.


27. Non Ruta tantum, fed & SALVIA c. in A.g. &c.

23. Cui gemina fere bæc est, quæ Assertionem hanc augere potest:

[ Natura Arbor Arte. Planta hic annua, alibi perennis & Arbor esse potest, ut ROSMARINVS, Ruta Herodis.

Si sit annua, non est Arbor, ut Musa.

29. Assertio V. ex Scheda est, quæ inscribitur: FRVTEX. Addiderat tales fere Icones Arboris, Serpentis Arboris, Fruticis.



30. Affertio VI. variis debetur Schedis.

31. Sectiuncula 1. & 2. ex Scheda, quæ inscribitur: Planta Divisio in ARBOREM, HERBAM an Specifica. Cui subjiciuntur ista: MELONES in Peruv. &c. Lauremb. p. 73. Quæ ibidem de Thure, Myrrha, Pipere ex Lauremb. p. 72. Auctor adjecit, buc non pertinent.

32. Male autem Lectoris fui commodis confuluit Laurembergius, quod

Acostam, unde ista hausta deprehendo, nominare neglexerit.

33. Sectiunculas 3.4.5. de RICINO tres Schedæ Autographæ & una Apographa stabiliunt.

34. Prima, quæ infcribitur: Eadem *Planta* hic *Arbor*, illic *Herba*, id est Annua, hæc est:

κίνι η κρότων, Ricinus, Dioscoridi Δένδεον dicitur, μικράς Συκής μέγεθ 🗇 έχων.

- 35. Lobel. Advers. vix alibi quam in Hortis videre est. Ann. est nec rediv. (h. e. ne R. q. &c.) At Clus. in mar. Bat. &c. Bellonius item in Creta magnas Ricini Arbores se observasse scribit.
- 36. Item Curcas Arbor in America, nimirum in Nova Hispania, Species Ricini videtur tum Monardi, tum Clusio. Nam & Semen & Oleum &c. respondent.
- 37. Secunda Patavina, cujus exemplum Velandia quoque Titulo Vivacitas exhibet, sub Titulis: Generalia Botanica, Vivacitas, Arbor, Herba, hæc complectitur:

An nec rediv. in Germania stirps est Ric. persicitur eodem, quo sata est, anno. Semen Austumno maturatur.

- 38. In calidis regionibus multos testat annos, atque in tant. excr. alt. ut ad consc. eam scalis opus quandoque sit, uti tradit P. Bellon. l. I. Sing. Dod. Lobel. adv.
- 39. Tertia Titulo: Differentia Annua & Restibilis secundum regionum temperamenta variat, eadem repetit.

40. Reliquas Instantias in Schedis confusas Alphabeti ordine digessi.

41. Sectiuncula 7. ex parte, 10. & 12. integræ debentur Schedæ quæ inscribitur: Instantiæ contra Species, recentioris ætatis, hæc exhibenti:

Herbæ

Herbæ cum Arboribus vel Fruticibus.

42. Onagra - - - - NERION, alibi Frut. alibi trab. ed. s.

f. Anton. CHAMÆNER. Epilob.

43. EBVL. - - - SAMB.

Gr. Xau. Anin.

differt.

an Caulis Singularis? Virga m. a R.

"Caul. Simpl. tr. Cæf.

Bijug. Fr. in utr.

In Vtr. Fr. Fl. i.

- 44. De Sambuco & Ebulo dua alia etiam.
- 45. Vna habet hæc: PRÆDICAMENTIS BOTANICIS obstant Musa Arbor annua, Sambucus Ebulus.
- 46. Altera quæ inscribitur Species Plantarum, ista: Ebulus per omnia Sambuco similis, nisi quod annua Planta est.
- 47. Sectiunculæ 7. ex parte, 9.11.18. & 19. integræ, formatæ funt ex alia, cui Tituli: Arbor, Herba: Magna diversitas magnitudinis in Plantis ejusdem Speciei.
  - 48. Tithymalus Helioscop, Herba.

TITHYM. Arbor. &c.

"ANCHVSAM Arbor. P. Alpin. Anchusam esse &c.

"Car. Arboreus. CYAN. &c.

49. Sectiunculam & repræsentat tertia sub Titulo: Herbæ Arborescentes.

50. Sectiuncula 13. & 16. funt ex Scheda quarta, subnexe iis, que hic sectiunc. 27. ex eadem produxi.

51. Sectiuncula 14. debetur Schedæ, de qua hic fectiunc. 45. dixi.

52. Sectiunculam 15. partim ex eadem, partim ex hac Apographa Incerta expressi, unde Assertio una & altera sectiuncula augeri poterit:

53. Scripsic Theophrastus LACTVCAM grandescere in Arboris ADDENDA. amulationem. Jul. Cæs. Scalig. (Exercit. 139. sin.)

Y 2

"54. Theophrastus haber id. Μαλάχη MALVA, Τεῦτλου ΒΕΤΑ, "Αγιω AMERINA, ΠΑΛΙΌΤΡΟΣ, Κίτλος HEDERA ομολογεμινύως , ταῦτα γίνεται Δένδεα, καὶ τοι Θαμνώδη ές iv l. I. C. 5.

55. Scaligero credo obvium fe dedit, cum illa scriberet, locus ex Hist.

Plant. 1.7. c. 4. qui Auctori non succurrit:

"Τῶν δε πλατέων (Θριδακινών) έτω | Inter Latas (Lactucas) adeo quaη, τινές πλατύκαυλοι γίνονται, ως τ' ένίες dam Laticaules frunt, ut aliquos dicant & pro Oftiis uti Hortorum. η φασι κομ Θυεαις χρησωμ Κηπωρικαίς.

- 56. Plinius Nat. Hist. 1. 19. c. 8. circa initium ita ex Græco convertit. "Lactuca, inquit, Genus Vnum Laticaulis, adeo, ut Oftiola Olitoria ex his faetitari prodiderint.
- 57. Ceterum & alia Incerta, quæ inscribitur, Speciei Vnitati non obstant, hæc exhibet Germanica:

Baummäßige Groffe, und Krautmäßige Kleinheit hindert nicht die Gemeinschafft der Urt in Rauten, Baum-Wiesenklee oder Barrauten, Geiß-Weinflee, Pappeln.

58. Sectiuncula 17. in Scheda ejusdem cum ea, de qua hic sectiuncula 41. ætatis, sic exhibetur:

Herba

Frutex PORTVLACA Hortenfis Portulaca Marina, HALIMVS, Ramis, Lignof. Radix, imo t. &c.

59. Affertionis VII. sectiunculæ 1. pars unde sit, ex Annotationis hujus fectiunc. 45 repetendum. In eadem & fectiuncula 2. continetur, & 3. exceptis

quatuor ultimis vocibus a me adjectis.

- 60. In vetustiore Scheda, cui Titulus, Genera Plantarum, sectiunculæ 1. reliquum legitur, non indicato tamen Oviedi loco, Muzæ, (fic Arabica vox re-Etius exprimitur, evitata simul quæ per f introduceretur Homonymia,) quamvis fub Platani nomine, descriptionem exhibente pleniorem ceteris, Auctori lectis. (Guilielm. Piso enim nominari potuisset, non minus diligenter describens Muzas Hist. Nat. & Medic. 1. 4. c. 21.)
- 6. MVSA five Ficus Indica (crescit in India, Ægypto, Gvinea, ADDENDA. Brasilia, Canaria) annua est Planta, h. e. Caule an. & s. t. f. Radice tamen perenni, Punica tamen attingit magnitudinem.
  - 62. Ficus Indica nomen omisi propter sectiunculam 2. Natalia Muza locă addat qui volet. Quod de magnitudine ad Punicam comparața Auctor addit, ex incerta Theophrasti descriptione apud Clusium hauserit.

63. Alia vetusta inscribitur: Arbor non est Species, cujus ista sunt:

Arbores non Arboribus valde cognata, ut Pithaja, Tuna. Lobel. adv. 454.

64. Affertionis VIII. Sectiuncula 1. est ex Scheda, si non anno 1634. certo post hunc scripta. Continet enim Scheda simul partem exercitii styli, a discipulo quodam, eo anno exhibiti.

65. Item ex hac, unde & 2. & 4. ejusdem credo ætatis, cujus hic fectiunc. 9. memini:

Observandum, an omnes HERBÆ ante Caulem prater prima Bina Folia, proferant plura Folia.

- 1. forsan prima Bina Folia non Rad. s. &c.
- 2. in Alsine & multis aliis nulla apparent hujusmodi Folia, sed tantum in illis, qua Caulem sero prod. ut T. &c.
- 3. non existimo in omnib. Bina provenire, sc. iis quæ Sigil. prof. F.
  - 66. Sectiunculæ 3. Scheda inscribitur Herba Notio.
  - 67. Sectiuncula 4. ex duabus est transcripta.
  - 68. Vna ανεπίγεαφος:

Caules Herbarum qui antic. F. op. D. H. Scaligeri, ut Tussil.

69. Altera ἐπιγραφήν habet hanc: Herba Notio sec. Scaligerum.

Caulis interd. ant F. ut in Tus. Obs. &c.

70. Ceterum in Incerta Apographa, adversus Guilandinum, hæc leguntur; quæ cum ex parte obscurius proposita videri possint, contextui ingerere non ausus sum:

An falsum est, quod air Jul. Cæs. Scaliger, Stirpes quasdam emittere Bina Folia, priusquam Caulem, quia Folia illa Caudici adhærere videntur? A. O. Non negandum tamen, Folia Radicalia emitti ante Caulem vel Caules.

71. Ipse Guilandinus fatetur implicite, Herbarum quarundam Radices emittere prius Folia quam Caulem. Ergo per aliquod tempus

pus confistet Stirps illa in fola Radice, ideoque erit κύημα eadem ratione, qua Alternans κύημα est κύημα.

- 72. De Tritico testatur Experientia, si Culmi atterantur, vel resecentur, Radicem denuo novos Culmos fruticare.
  - 73. Deinde Triticum surgit Culmo multiplici, ergo.
- 74. Autographa quoque sed recentior sub Titulo Thesium habet ista ad hanc Affertionem facientia:
- "Herbam ab Arbore, Cremio, Frutice distinguit Scaliger, eo di-"scrimine, quod prater Bina prima Folia e Seminis Pulpa prodeuntia "(quid si e Bulbo vel Talea?) plura immediate e Radice producit Folia "(non mediante Stipite) p. 465.
- 75. Tribuatur itaque nomen aliquod commune tribus istis, verbi gr. Planta Radice non Foliosa sive ΑΦυλλόριζΟ, ut Herba sit ΡιζόφυλΟ, sive ante Caulem Foliosa.
  - 76. Affertio IX. expressa est ex Bunkiana.
- 77. Affertio X. in Scheda proxime ante Bunkianam nominata sequitur ea quæ inde producta sunt.

At ea qua C. &c.

78. Herba proprie dicta, quæ Stipitem post anno sequenti
Folia, Stipitem vel Stipites admodum sero, ut Vmbilicus Veneris.

ADDENDA. Affert. 8.

79. Assertio XI. debetur Schedæ Apographæ Incertæ, quam modo dixi.

Verum hoc potissimum objici Guilandino potest, si Simplicitas & Mult. &c.

- 80. Affertio XII. effecta est ex duabus Autographis, quarum una sub Inferiptione hac: Corollaria Phytoscopica, continet sectiunculam 1. usque ad Δειπν. & 3; altera Patavina ἀνεπίγραφος 2dam inter hæc:
- 81. Ruellius tribus tantum Summis Generibus Plantarum Naturam comprehendit, Arboribus, Fruticibus, Herbis.

Arist. l. de Pl. hisce 4. Arborib. Fruticib. H. O. Theophrastus Arb. Frut. Suffrut. & Herbis.

82. OR-

- 82. ORDINEM harum Assertionum quod attinet, a Vocabulis abjiciendis orsus, progredior ad Arborem & Fruticem, ab his ad Herham, id est a Plantis Perennibus ad non Perennes, sive a magis apparentibus ad minus apparentes. Quomodo Auctor Folia, tanquam Partes magis apparentes, prafert ceteris Planta Partibus, Fragm. hujus c.2. ass. 1. sectiunc.2.
- 83. Accedit, quod Arborum non ita multæ Species sint, uti Herbarum. Qualis ratio Auctori etiam in Ordine Similarium placuit Part. 2. sect. 2. c. 4. ass. 1. sectiunc. 3.
- 84. Multitudinis fingularum Partium & Magnitudinis argumenta in præfens non tangam.

### VI. DE FRAGMENTI I. CAP. II.

A ssectionis I. sectioncula 1. ex Autographa, mediæ credo ætatis.
2. Sectioncula 2. si excipias comma ultimum, est ex Patavina, quæ ex

Spigelii Methodi Herbariæ 1. 1. c. 55. & 56. has Propositiones collegit, nonnihil ab Auctore interpolatas:

- "3. Species, quæ inter multas Genere participantes media est, prius "ostendenda (vel quæ est frequentior iis in locis.)
- "4. Planta perfecta prius quam imperfecta ostendenda sunt, quia "ob Partium Varietatem facilius discernuntur.
- "5. Eædem Florentes ostendendæ sunt, quia Superiora Plantarum "Genera ex Flore & Fructu pulcre constituuntur secundum Cæsalpinum. "(Ego autem potius Fol. &c.
- "6. Hortos Hiemales voco Libros, in quibus Planta sicca Chartis ag-
- 7. Comma vero ultimum & fectiunculæ 3. pars unde fint, jam dixi annot. 2. fectiunc. 6. Pars vero, quæ de Seminibus est, a me formata fuit, ex Scholii subjecti sectiunc. 2. Generalior nempe Propositio ex Specialiore.
  - 8. Autographam tamen hanc reperio:

Quæritur, utrum, Folia (Laub,) an Flores sint priores in Planta. Illa Durabiliora, Hi Pulcriores, Teneriores.

9. Nam Semen non potest esse Finis, nisi petamus Principium.

- 10. Quædam Plantæ Semen habent sine Flore. Ita quidam toti dediti.
  - 11. Quædam Florem habent sine Semine. Naturaliter nulla.
- 12. Quædam Florom sejunctum a Semine ut in Corylis, ne quis putet, gaudium Venerium esse potissimum.
  - 13. Sectiuncula 4. & 5. exceptis Parenthefibus debentur buic Autographa s. Floris & Semin, s. magis cogn. arguit S. &c.
- 14. Parentheses vero istas, ut Auctor intelligeretur, accepi ex duabus Schedis Observationem de Potamogetone continentibus, quas circa idem tempus, quo proxima, scriptas tum literarum similes ductus, tum atramentum idem significant.

15. Hoc autem admonendus es, Lector, Potamogetonem Dodonzi in-

telligi, quæ altera est ineditione Latina vetustiore anni 1583.

- 16. Quæ enim 1616. auctior prodiit, ejus Potamogeton altera Augusti foliæ Auctoris videtur respondere, quemadmodum Incubans respondet prima utriusque editionis.
  - 17. SCHOLION est ex quatuor Autographis diversa, ut videtur, atatis.

18. Sectiuncula 1. ex qua accepta est, Corculum Seminis inscribitur.

19. Sectiuncularum 2.3.4. 5. Scheda ανεπίγεαφος hæc est:

Quom. Cæfalpin. Fic. in Ord. &c. Vtrum etiam Corc. G. Samb. (q. T. in uno Ac.) f.d. vergat.

20. Sectiunctula 6. excipit 1 mam in eadem ( Corcul. Sem.) In Pulpa lat. Sem. Berb. &c.

21. Sectiunculæ 7. initium ex eadem:

In Tomento Pop. Nigræ.

Sed reliquum ex alia, vel anno 1635. vel certe post id tempus scripta (impressa enim Thes. aliquas Hagemeieri continet.) Titulus ei: Planta Mas, Femina, ubi de Populo Nigra:

22. Seminibus adeo parvis, ut vis. &c. Confer quæ infra dicemus ad

Fragm. 4. C. 4. affert. 7. fectiunc. 16. & 17.

Sectiuncula 8. ex alia anni 1648. mens. Junii, ubi hæc:

In nonnullis ob Exilitatem ægre difcernitur Sit. Fl. r. Fr. ut in Syr. Cer. ubi Per. &c.

23. Affertio II. in Autographa paulo aliter formata est:

Dum Medici in Pl. u. & fub Gen. digerend. modo F. c. ut in Moly V. Bauh.

modo præf. Od. & S. ut in Botry M. &c.

est Soph. &c.

Inter Valerianas refert. C. Bauh. aliquot Sp. Inod.

24. Affer-

24. Affertio III. ex variis Schedis coaluit. Sed abrumpendæ & hic func Annorationes.

25. Pauca tantum dicam de Fragmentis Reliquis.

#### VII.

### DE FRAGMENTO II.

Pleraque Schedæ funt Autographæ hic, Velandiæ tamen duæ etiam ad-

#### VIII.

#### DE FRAGMENTO III.

V furpatæ hic fuerunt pleræque Autographæ, Patavinæ & aliæ, paucissima ex iis, quæ in Collegio Phytoscopico excepi.

#### IX.

#### DE FRAGMENTO IV.

Plurima Scheda hic funt Autographa, multa Velandia.

#### X.

#### DE FRAGMENTO V.

1

Affertio I. est ex Velandia Scheda Apographa.

2. Affertio II. ex duabus itidem Velandiis Apographis, quarum una inforibitur de Plantarum vi discretiva in Attractione, & continet sectiunculum 1.2.3.4. excepto ultimo commate, 6.7. si excipias exempla, 14. præter Parenthesin primam a me factam, cum in Scheda 1.3. simpliciter indicaretur, & denique sectiunc. 15.

3. Altera, sub Titulo de Plantarum Excrementis una cum Signo manus, sectiunculam 5. & 4tæ comma ultimum, & repetita sectiuncula 6. & 7mæ

parte, fectiunculam 8.9.10.11.12. & 13. exhibet.

4. SCHOLII sectiuncula 1. & 2. in Apographa proxime dicta annectuntue

Affertionis præcedentis sectiunculæ 13.

5. Autographa, cui Titulus: Plantarum meminit Aristoteles in lib. de Animalibus, atatis, ut videtur, recentioris, locum ex 1.2. Part. An. repetit, & sectionculis reliquis absolvitur.

6. Involucrum autem ejus & sequentium inscribitur: ARISTOTELIS

DE PLANTIS DOGMATA.

7. Affertio III. ex Autographa ejusdem cum præcedente ætatis, quæ Titulo: Plantarum in parvis Naturalib. meminit Aristoteles, subjungit hæc:

"L. de Vita c. 1. (551. C.) Radices Plantis sunt Oris loco. C. 2. de "Apophyteus, ut & l. Long. Vitæ c. ult.

8. L. Long. Vitæ in fin. ubi male red. Cauf. LONG. &c.

9. SCHO-

- 9. SCHOLII sectiuncula 1. 2. 3. 4. 5. est ex æquali prioribus Autographa, eui Titulus: Plantarum Vita.
- 10. Sectiuncula 6. in aqualis Autographa fine infcriptæ: πυθμήν, Cordi analoga in Plantis.
- 11. Sectiuncula 7. 8. 9. 10. 11. excepta Periodo posteriore, fere integra ex eadem, sed Philosophorum ætatibus non distinctis, Dioscoridem Aristoteli & Theophrasto pramittit.
  - 12. Alia æqualis omnia fere repetit.

πυθμήν (ἀπὸ τῶ πύβ. i.e. putr, Eustath.) fundus.

Diofc. l. r. c. 133.

Theophr. Cauf. 1. 3. c. 18.

- ,, 13. Arist. Gen. An. l. 1. c. 20. έξ ένδς &c. είς πυθ. (sed plures Caules ex
  - 14. Sectiuncula 12. ex alia æquali.
  - 15. Sectiunc. 13. in fine proxima al antecedente.
  - 36. De Ordine nibil attinet monere.

#### III.

# DE CAVSIS NON CONTINVATARVM ANNOTATIONVM AD HANC SECTIONEM.

Cum Lectorem satis cognovisse existimem, quomodo in Schedis versatus fuerim, & præterea nimis extenderentur Annotationes, præsertim cum parum illarum tædium aliis jucundioribus Observationibus vel Correctionibus minui possit, quam forte in Annotationibus ad Sectionem II. sactum est, malui hic abrumpere, quam nimis in hujusmodi scrupulosus sieri.

### FINIS.

IOSEPHI DE AROMATARIIS,

ASSISINATIS,

FAVORINI FIL.

# EPISTOLA


BARTHOLOMEVM NANTI

DE

# GENERATIONE PLANTARVM

EX

SEMINIBVS.



## **PRÆSTANTISSIMO**

## ORATORI,

## BARTHOLOMEO NANTI,

Philof. et I. V.D.

## IOSEPHUS DE AROMATARIIS FAVORINI F. S. P. D.

RVDITISSIME Nanti, libros de generatione, quos multis abhinc annis moliebar, non conscripsi; nimium distractus ob affluentem numerum ægrotantium nobilium, curæ meæ commissorum; & ob nimiam corpufculi mei imbecillitatem, quæ longas vigilias & labores, renuit. Adnotabo nihilominus breuissime per capita quædam potiora attinentia ad plantarum Semina; vt nisi satisfaciam, paream saltem tibi. Et crant ea ipfiffima, que sepius ore alias explicavi. Addam & ea duo, quæ de ovis quæsivisti, Poterunt forsitan quæ narrabo, nimium prorfus nova videri multis, & ab humano conceptu aliena nimium: verum non quidem tibi, qui nonsolum alias benigne audivisti; sed optime nosti, hominum ingenia rebus accommodanda esse, non quidem contra; & antiquissima extare quæcunque semper eodem prorsus modo natura præstitit, cognoverintne homines vel non. Conscribamalias conceptos de generatione libros, in quibus multa forfitan ultra communem opinionem enarrabo, non discrepantia (vt credo) a rei natura. Nec forsitan longum valde tempus ab hac epistola distabunt. Hoc interim sat erit hæc pauca fignare:

Plantarum vocata semina non esse semina.

Et non habere vim, actu (vt dicunt) vel potentia generandi plantam.

Sed cum possint haec obscura nimium existimari multis, aperiam rem clarius;

1. Plan-

- r. Plantæ determinatis temporibus prolificum semen generant; animalium seminibus proportione respondens; ex materia quadam spiritibus commixta.
- 2. Illud autem excernunt in vocatis seminibus; veluti in parvis uteris, vel (si cum Empedocte loquaris) in ovis arborum. (a)
- 3. In locis spiritus conclusus subditam materiam fortius aggreditur, & novo semper affluente spiritu vivisico domat adeo, ut ex ejus potiori parte parvissimam plantam revera generet, determinationis organis distinctam & conformatam & vera vivisicet plantali vita: Reliquam vero partem releget in alimendum assumendum ab ipsa effigiata & conformata planta, &c.
- 4. Parva, quæ gignitur planta in cognominatis seminibus, vel gignitur qua parte pediculus adhæret: vel prorsus contra: vel alio quodam modo.
- 5. Quæ gignitur qua parte pediculus adhæret, exporrigit ad pediculum radices, folia autem ad apicem.
- 6. Quæ vero gignitur in apice: folia extendit pediculum versus: radices autem ad apicem.
  - 7. Nec defunt alii modi.
- §. Parva hæc planta, ex quo die gignitur, vivit, nutritur, augetur;
  & determinato tempore decrescit, non aliter ac animal senectute laborans: ac tandem moritur, nisi determinato loco & tempore seratur.
- 9. Plurimæ harum plantarum, quousque extant in vocatis seminibus latentes, nutriuntur per adnatas quasdam (ut ita dicam) umbilicales vias.
- 10. Vnde plantarum vocata semina quæcunque jam genitam & conformatam plantam obtinent, sunt sæcunda.
- 11. Quæ vero non habent, infœcunda prorsus extant: nec ullo amplius remedio fœcundari possiunt, si deciderint a planta.
- 12. A vocatis igitur seminibus debito loco satis nascitur planta, non gignitur.

13. Ge-

<sup>(</sup>a) Confirmata hæc, uti alibi, fic etiam in Experimentis de Plantar. Generat. legimus, quæ edidit Iacob. Logan. Lugd. Bat. 1739. in 8tav.

- 13. Generatio fit ope vocatæ concoctionis.
- 14. Ortus fit cum recrudatione plantæ, & concoctione assumti nutrimenti.
- 15. Pro plantarum ortu, vocata semina lac generant, ut ita dicam, ex ea parte, que ad nutriendum destinata fuerat, & congeneo attracto humore; ad faciliorem inde nutritionem & auctionem.
- 16. Orta planta, non amplius a vocato semine recipit præparatum alimentum nisi parum: sed a terra alioue proportionato loco.
- 17. Nec amplius per adnatas vias, nifi ut diximus parum: fed per radicem fugit, non aliter ac animal, quod primo per umbilicales venas creditur nutrimentum capere, exortum vero per os affumit.

Hæc funt pauca veluti femina dicendorum in libr, de generatione, quatenus ad plantas ex seminibus ortas attinet. Ex quibus facillime colligitur (fi vera funt ut credimus) quam vane agitentur quæstiones quotidie, dum quæritur. Quomodo vocata femina, ab arbore aliisve plantis jam excerpta, debito loco fata novam plantam generent. Anque adsit in ipsis forma plantæ nec ne? Asserentibus nonnullis formam ibi esse in potentia tantum: nonnullis vero affirmantibus, non adhuc extante organizatione, vere adesse formam, ut dicunt, actu; quæ sibi ipsi domicilium paret; Non aliter, ac si forma plantarum esset quid vere separatum, ut dicunt existentia, utens materia, tanquam lignis ad nauem fabricandam. Essetque-forma existens realiter, rei tamen realiter non formatæ; magis quam nauta non navigii nauta. Nec non aliæinextricabiles petitiones, excitatæ ad humanum ingenium labefacttndum, & e recta philosopandi via deturbandum. Quod autem attinet ad ova gallinarum; existimamus equidem, pullum in ovo delineatum esse antequam foveatur a gallina. Et credimus augeri calido materno, non folum tanquam a fouente, verum partim etiam tanquam a materia nutriente; quod & aliis quibusdam animantibus ab aëre commune contingere putamus; veluti in libr. de generatione animalium, Deo dante,

enarabimus. Vale, meque ut soles ama. Dabam Venetiis Pridie

Calend. Octobr. Clo locxxv.

## ERRATA,

## Serius observata, & si quæ alia B. L.

corriget.

p. 5. lin. 4. φυλόν, lege συλόν.

p. 6. lin. 10. in: lege in)

ibid. in not. lin. 5. dissertatione adde de fungis.

lin. 6. 8vo lege 4to ibid. Aborrtus, lege Abortus.

lin. 7. formalis lege formulis.

p. 12. lin. 9. quosdam lege quasdam. lin. 30. AC lege AB.

p. 22. not. lin. 3. copiosis lege copiosius.

p. 31. lin. 14. Llii lege Lilii.

p. 35. not. (\*\*\*) lin. 1. variegalo, lege variegate.

p. 44. lin. 5. uti lege (uti,

p. 45. lin. 14. quolihet lege quolibet. p. 50. lin. 4. Juugius lege Jungius.

ibid. lin. 9. litreis lege litteris.

ibid, lin. 17. foliacci lege foliacei.

p. 54. lin. i6. conjuugat lege conjungat.

ibid. lin. 23. occapat lege occupat.

p. 55. MONENDTM lege MONENDVM.

ibid. lin. 37. invidubit lege invidebit.

p. 74. lin. 22. fructifero adde radice tamen perenni.

ibid. lin. 24. Epitom. adde Libr. 2.

p. 75. lin. 24. foret, lege foret?

p. 76. lin. 21. pulchritudiue lege pulchritudine.

p. 77. l. 18. fuut lege funt.

p. 79. lin. 28. & 29. ducles lege dulces.

p. 80. lin. 8. c. 1. affert. 1. lege Part. 1. c. 3. affert. 1.

p. 84. lin 10. IVXTA lege SECVNDVM.

p. 91. lin. 17. hahent lege habent.

p. 99. lin. 12. Lanuguine lege Lanugine.

p. 117. lin. 7. IVXTA lege SECVNDVM.

p. 141. lin 7. Cantone lege Catone.

p. 142. lin. 12. conceptocula, conceptaçula.

p. 146. lin. 2. PLANDARVM lege PLANTARVM. lin. 4. NVTRIMFNTA leg. NVTRIMENTI.

p. 148. lin. 2. Υεοφήν lege Τεοφήν.

p. 149. Sch. 3. lin. 3. explicate lege explicare.

p. 150. lin. 5. mojores lege majores.

p. 153. lin. 5. Semiua lege semine.

p. 156. Aff. 7. lin. 1. qaod lege quod.

p. 176. lin. 4. florom. leg. florem.





